

# Rasprostranjenost vrste *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771) u Hrvatskoj

---

Šarić, Ivana

Undergraduate thesis / Završni rad

2011

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:* **University of Zagreb, Faculty of Science / Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet**

*Permanent link / Trajna poveznica:* <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:217:704313>

*Rights / Prava:* [In copyright](#)/[Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja:* **2025-04-02**



*Repository / Repozitorij:*

[Repository of the Faculty of Science - University of Zagreb](#)



SVEU ILIŠTE U ZAGREBU  
PRIRODOSLOVNO – MATEMATI KI FAKULTET  
BIOLOŠKI ODSJEK

RASPROSTRANJENOST VRSTE *Dreissena polymorpha* (Pallas,  
1771) U HRVATSKOJ

DISTRIBUTION OF SPECIES *Dreissena polymorpha* (Pallas,  
1771) IN CROATIA

SEMINARSKI RAD

Ivana Šari

Preddiplomski studij biologije  
(Undergraduate Study of Biology)

Mentor: doc. dr. sc. Jasna Lajtner

Zagreb, 2011.

## SADRŽAJ

1. UVOD .....	1
2. ZNAČAJKE VRSTE <i>D. polymorpha</i> KAO INVAZIVNE VRSTE.....	2
2.1. BIOLOŠKE ZNAČAJKE VRSTE <i>D. polymorpha</i> .....	3
2.1.1. BISUSNE NITI .....	3
2.1.2. VELIKA REPRODUKTIVNA SPOSOBNOST I VELIGER LIČINKA.....	4
2.2. UČINCI VRSTE <i>D. polymorpha</i> .....	4
2.2.1. EKOLOŠKI UČINCI .....	4
2.2.2. SOCIO-EKONOMSKI UČINCI.....	5
2.3. METODE KONTROLE .....	6
3. RASPROSTRANJENOST VRSTE <i>D. polymorpha</i> .....	7
3.1. VEKTORI ŠIRENJA VRSTE <i>D. polymorpha</i> .....	7
3.2. RASPROSTRANJENOST VRSTE <i>D. polymorpha</i> U HRVATSKOJ.....	8
4. LITERATURA .....	10
5. SAŽETAK .....	12
6. SUMMARY .....	12

## 1. UVOD

Kako bismo shvatili zbog čega određena vrsta živi na nekom geografskom području, a drugdje ne, moramo proučiti gdje je ta vrsta evoluirala i je li došlo do disperzije iste. Pod pojmom disperzije smatra se kretanje određene vrste s mjesta gdje je evoluirala na neko novo područje. No, ponekada „osvajanje novih područja“ nije moguće zbog brojnih prepreka. Primjerice, postoje ekološke i geografske barijere koje onemogućuju kretanje jedinki. Dvije različite vrste mogu biti izolirane planinskim masivom te izmeću njih ne do i do genetičke izmjene ili bilo kakve druge interakcije (Kalafatis, 1998).

Tek kada je uvijek potrebno putovati na veće udaljenosti, tj. kada je potrebno graditi avione, brodove, automobile, prokopavati kanale, za neke vrste geografske barijere više nisu postojale. Tako je uvijek, ponekada namjerno ponekada slučajno, pomogao u disperziji brojnih biljaka, životinja i drugih organizama. Vrste koje se nalaze na području izvan svoje prirodne rasprostranjenosti evoluirale su negdje drugdje, a slučajno ili namjerno su prenesene na novo područje, nazivamo alohtonim vrstama. Ponekad alohtone vrste svojim unošenjem i daljnim širenjem ugrožavaju ekosistem, stanište i autohtone vrste te takve vrste nazivamo invazivnim vrstama. Osim što invazivne vrste mogu narušiti bioraznolikost na području introdukcije, također mogu uzrokovati i brojne negativne socio-ekonomske učinke (Freeman, 2008).

No, statistike pokazuju kako samo 10 % unesenih vrsta opstane na novom području, a još manji postotak postane invazivno (Freeman, 2008). Koji su ishodi mogući kod unosa nove vrste? Alohtona vrsta može nestati ili zbog nedostatka slobodne niše ili zbog istrebljenja od strane predatora. Ako unesena vrsta ipak opstane onda za nju postoji slobodna niša unutar postojećih zajednica ili na tom području nema prirodnih predatora. Što se tiče odnosa alohtone i autohtone vrste, one se ponekada mogu međusobno križati. Ova pojava dovodi do smanjenja genetičke raznolikosti između autohtone i alohtone vrste. Unesena vrsta također može smanjiti ili uništiti autohtonu populaciju, posebice ako je nova vrsta predator ili ako je prenositelj novih bolesti ([www.invasivespecies.gov](http://www.invasivespecies.gov)).

Vrsta *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771) je slatkovodni školjkaš čiji je hrvatski naziv raznolika trokutnja a, zbog ljušture koja ima oblik trokuta izvedenog na različite načine (sl. 1). Vrsta je autohtona na području Crnog mora i Kaspijskog jezera. Ovaj školjkaš posjeduje sve karakteristike invazivne vrste: na područjima introdukcije ugrožava autohtone vrste te uzrokuje negativne socio-ekonomske učinke. Mnoge biološke osobine pomažu ovoj vrsti pri disperziji.

Danas je vrsta *D. polymorpha* rasprostranjena u brojnim rijekama i jezerima Europe (Stanczykowska, 1977). Vrsta je također introducirana na područje Republike Hrvatske, a prvi zapisi o njenoj prisutnosti datiraju još iz 19. stoljeća. Ovog školjkaša osim u Europi, nalazimo i u Sjevernoj Americi. Proces širenja ove vrste traje i dalje te se zbog toga radi na daljnjem razvoju novih metoda kontrole.



**Slika 1.** Vrsta *Dreissena polymorpha*  
([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com))

## 2. ZNAČAJKE VRSTE *D. polymorpha* KAO INVAZIVNE VRSTE

Hoće li unesena vrsta preživjeti na nekom području ovisi o biotičkim čimbenicima na novom staništu, prvenstveno se misli na kompeticiju. Sve jedinke unutar nekog staništa su u direktnoj ili indirektnoj kompeticiji, bilo za prostor ili hranu. No, invazivne vrste u pravilu nadvladaju autohtone.

Školjkaš *D. polymorpha* kao invazivna vrsta ima mnogo karakteristika koje joj omogućuju brzo širenje te prilagodbu na novo stanište. Proučavanje upravo ovih osobina je važno za osmišljavanje metoda kontrole vrste *D. polymorpha*. U narednom tekstu ćemo opisati neke od tih osobina te ekološke i socio-ekonomske učinke koje ovaj školjkaš uzrokuje.

## 2.1. BIOLOŠKE OSOBINE VRSTE *D. polymorpha*

### 2.1.1. BISUSNE NITI

Odrasle jedinke vrste *D. polymorpha* se pri vršuju na različite podloge pomoću bisusnih niti (sl. 2). Ove niti bjelanevinastog sastava proizvode bisusna žlijezda, koja se nalazi na bazi stopala školjkaša (Matonkin i sur., 1999).

Upravo pomoću bisusa ovaj školjkaš se može priristiti na bilo koji supstrat u stupcu vode ili na bentosu te tako tvoriti kolonije koje sadrže i do 750 000 jedinki na m<sup>2</sup> (www.issg.org). Ovakvim zauzimanjem staništa vrsta *D. polymorpha* može smanjiti ili potpuno eliminirati autohtone vrste. Bisusne niti pridonose i disperziji ove vrste. Primjerice, školjkaš *D. polymorpha* se pomoću njih može priristiti na druge životinje (sl. 3), kamenje, brodove, plutajuću vegetaciju, itd.



**Slika 2.** Bisusne niti  
(www.water.ca.gov)



**Slika 3.** Obraštaj na drugoj vrsti školjkaša  
(www.wjon.com)

### 2.1.2. VELIKA REPRODUKTIVNA SPOSOBNOST I VELIGER LIINKA

Jedinke vrste *D. polymorpha* imaju životni vijek oko četiri do pet godina. Spolnu zrelost dostižu kada su veličine od oko 8 mm, što je otprilike u drugoj godini života (Mackie i sur., 1989). Jedinke su odvojena spola te je oplodnja vanjska (www.issg.org).

Jedan od razloga zašto je ova vrsta toliko invazivna je definitivno velika reproduktivna sposobnost. Ženka može proizvesti do milijun jaja u godinu dana, koja se

naj eš e oplo uju u prolje e (Borcherding, 1991). Iz oplo ene jajne stanice nakon otprilike 2 dana se razvija li inka trohofora iz koje se kasnije razvija slobodno plivaju a veliger li inka (sl. 4). Rod *Dreissena* je jedini rod slatkovodnih školjkaša koji ima ovaj tip li inke (Matoni kin i sur., 1999). Veliger li inka živi planktonski pa ju vodene struje mogu nositi kilometrima prije nego što prije e u juvenilni stadij i pri vrsti se za supstrat bisusnim nitima.

U gra i veliger li inke uo lživ je jednodijelni ili dvodijelni velum koji je na rubovima trepetljiv. Velum ima dvojaku funkciju: pomo u njega se li inka pokre e i sakuplja hranjive estice, naj eš e fitoplankton (Nichols, 1993). Kod ove li inke tako er nalazimo za etak ljuštore, stopalo te neke visceralne organe.

Kada je li inka velika otprilike 350 µm zapo inje metamorfoza u juvenilnu jedinku. Velum se odbacuje, a bisusna žlijezda po inje stvarati niti kojima e se jedinka pri vrstiti za podlogu (Ackerman i sur., 1994; Claudi i Mackie, 1994).



**Slika 4.** Veliger li inka vrste *D. polymorpha*  
([www.isscgp.org](http://www.isscgp.org))

## 2.2. U INCI VRSTE *D. polymorpha*

### 2.2.1. EKOLOŠKI U INCI

Školjkaš *D. polymorpha* kao invazivna vrsta uvelike mijenja ekosistem u kojem se nalazi. No, osim onih negativnih postoji i cijeli niz pozitivnih ekoloških u inaka. Neke od posljedica unosa raznolike trokutnja e u novo stanište opisat u u tekstu koji slijedi.

Ovaj školjaš se prehranjuje filtracijom vode, tj. pomoću u trepetljika na škragama i usnim lapovima hranjive se estice iz vodenog stupca usmjeravaju prema ustima (Silverman i sur., 1996). Dio estica, poglavito fitoplankton, iskorištava kao hranu, a feces se taloži na dnu. Estice koje su prevelike te ih jedinka ne može konzumirati izbacuju se kao pseudofeces (MacIsaac i Rocha 1995). Fecesom i pseudofecesom školjkaša prehranjuju se ličinke trzalaca i malo etinaši, stoga je prisutnost vrste *D. polymorpha* uzrokovati i porast njihove biomase.

Jedna jedinka raznolike trokutnja dnevno može profiltrirati čak 2L vode pa kada imamo velike kolonije ovog školjkaša, može doći do pada biomase fitoplanktona (MacIsaac i sur., 1992; Bastviken i sur., 1998). Upravo zbog toga je vrsta *D. polymorpha* u indirektnoj konkurenciji za hranu s brojnim životinjama (drugi školjkaši, ribe, zooplankton). No, zbog pada brojnosti fitoplanktona u kopnenim vodama u kojima nalazimo kolonije vrste *D. polymorpha* imaju veći utjecaj na prozirnost vode i smanjen stupanj eutrofikacije, što pogoduje razvoju vodene vegetacije (Hebert i sur., 1991; Holland, 1993; Leach, 1993). Velike kolonije ovog školjkaša također predstavljaju izvor hrane za 36 vrsta ptica i 15 vrsta riba koje se hrane odraslim jedinkama te 38 vrsta riba koje se hrane ličinkama vrste *D. polymorpha* (Molloy i sur., 1997).

Zbog prehrane filtracijom, ova vrsta ima sposobnost bioakumulacije organskih spojeva i teških metala, često povezanih s onečišćenjem (PCB, pesticidi, itd) (Mackie i Schloesser, 1996). Pogodan je bioindikator jer, osim što akumulira kontaminante iz okolne vode, vrlo je široko rasprostranjena i u pravilu ne napušta svoje stanište godinama. Sposobnost bioakumulacije može biti letalna za životinje koje se hrane ovim školjkašem (www.epa.gov).

### 2.2.2. SOCIO-EKONOMSKI UTJECI

Guste populacije vrste *D. polymorpha* mogu uzrokovati brojne neželjene ekonomske učinke kao što su nakupljanje jedinki u vodovodima, rashladnim bazenima elektrana, betonskim obalama hidroakumulacija, cjevovodima i pumpama (Miller, 1992) (sl. 5). Također, veliki obraštaji ometaju ribarstvo jer ih nalazimo i na ribarskim mrežama, motorima i stijenkama brodova.



Turizam tako er može imati gubitke zbog ovog školjkaša. Naime, zbog oštih ljuski koje uzrokuju ozljede nemogu e je boraviti ili kupati se na mjestima gdje nalazimo ovog školjkaša (Miller, 1992) (sl. 6).



**Slika 5.** Obraštaj u cijevi  
([www.learnnc.org](http://www.learnnc.org))



**Slika 6.** Plaža puna ljuštura vrste *D. polymorpha*  
([www.nationalparkstraveler.com](http://www.nationalparkstraveler.com))

### 2.3. METODE KONTROLE VRSTE *D. polymorpha*

Zbog mnogih nepoželjnih ekoloških i socio-ekonomskih u inaka koje vrsta *D. polymorpha* uzrokuje, prou avaju se razli ite metode pomo u kojih bi se populacije ove invazivne vrste mogle kontrolirati. Ponajviše su razra ene biološke, kemijske i fizi ke metode kontrole.

Pod pojmom biološke kontrole smatra se kontroliranje populacija vrste *D. polymorpha* pomo u životinja koje se hrane ovom vrstom. Ribe iz porodice Cyprinidae te ptice mo varice mogle bi smanjiti broj jedinki ovog školjkaša, a da se pri tome gusto a populacije autohtonih vrsta ne mijenja (Molloy i sur., 1997).

Kod kemijskih metoda kontrole trebaju se pomno birati sredstva kojima e se populacije vrste *D. polymorpha* uništiti jer se može narušiti kvaliteta vode. Danas se u tu svrhu voda klorira, a brodovi i dokovi se premazuju kako se jedinke ne bi pri vrstile za njih (Claudi i Mackie, 1994).

Obraštaji (sl. 7) se tako er mogu uništiti i fizi kim metodama kontrole. Podru je na kojem nalazimo populacije ovog školjkaša može se mehani ki istiti, a li inke mogu

biti uništene ultrazvučnim vibracijama. No, fizičke metode uklanjanja ove vrste su najčešće dugotrajne i prezahtjevne te se stoga rijetko izvode.



**Slika 7.** Obraštaj vrste *D. polymorpha*  
([www.flickr.com](http://www.flickr.com))

### 3. RASPROSTRANJENOST VRSTE *D. polymorpha*

#### 3.1. VEKTORI ŠIRENJA VRSTE *D. polymorpha*

Domovina vrste *D. polymorpha* su Kaspijsko jezero, ujedno i najveće jezero na Zemlji te Crno more (sl. 8). No, vrsta je nenamjerno introducirana na mnoga područja izvan svog prirodnog rasprostranjenja. Na koji način je došlo do disperzije ove invazivne vrste?

Smatra se kako su najvjerojatniji uzrok proširenja areala vrste *D. polymorpha* balastne vode. Brodovi koriste balastne vode kako bi tokom plovidbe osigurali stabilnost. U luci gdje se teret iskrcava uzima se voda, a ispušta se u luci gdje se teret ponovno ukrcava. Kada voda ulazi u brod, većina organizama ipak to ne preživljava zbog postojanja brojnih filtara. No, vrste koje se na ovaj način unose na nova područja uzrokuju brojne ekološke i ekonomske probleme ([www.issg.org](http://www.issg.org)).

Iako su balastne vode najčešći način širenja invazivnih vrsta, školjkaš *D. polymorpha* je vjerojatno introduciran na mnoga područja i drugim vektorima (Carlton, 1993). Primjerice, pri vršenju na brodovima i životinjama, kao akvarijski školjkaš, itd. U

disperziji su ovom invazivnom školjkašu pomogle brojne biološke karakteristike zbog kojih se i uspijeva adaptirati na nova područja.



Slika 8. Geografski položaj Crnog mora i Kaspijskog jezera  
([www.bgman.info](http://www.bgman.info))

### 3.2. RASPROSTRANJENOST VRSTE *D. polymorpha* U HRVATSKOJ

Prisutnost vrste *D. polymorpha* u Hrvatskoj zabilježena je još sredinom 19. stoljeća (Lajtner, 2005). Na području dubrovačke obale konholog Kuzmić sabrao je nekoliko praznih ljuštura ovog školjkaša. U unutrašnjem dijelu Hrvatske ova vrsta tada nije bila zabilježena. No, istraživanja koja su se odvijala u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća, rezultirala su pronalaskom vrste *D. polymorpha* nedaleko od ušća rijeke Drine u rijeku Savu (Lajtner, 2005). Najnoviji podaci o rasprostranjenosti ovog školjkaša pokazuju kako je u kratkom vremenu ova invazivna vrsta drastično proširila svoj areal (Lajtner, 2011) (tab. 1).

**Tablica 1.** Lokaliteti u Hrvatskoj na kojima je pronađena vrsta *D. polymorpha*

	<b>Godina</b>	<b>Vodotok</b>	<b>Lokalitet</b>	<b>Sakupio</b>	<b>Determinirao</b>
1	1990	Drava	akumulacija Dubrava	Mišeti i sur.	Mišeti i sur.
2	1990	šoderica i ingi Lingi	Ledine Molvarske, Repaš	Kranj ev	Kranj ev
3	1993	šoderica i ingi Lingi	Ledine Molvarske, Repaš (na hrastovom trupcu)	Kranj ev	Kranj ev
4	1994	Drava	Pitomača	Grlica	Lajtner
5	1998	Drava	akumulacija Dubrava	Lajtner	Lajtner
6	1998	Drava	akumulacija Dubrava	Lajtner	Lajtner
7	1999	Drava	akumulacija Dubrava	Lajtner	Lajtner
8	2000	Drava	akumulacija Dubrava	Lajtner	Lajtner
9	2001	Dunav	1429 km/Batina	Paunovi i sur.	Paunovi i sur.
10	2001	Dunav	1384 km/uzvodno od utoka Drave	Paunovi i sur.	Paunovi i sur.
11	2001	Dunav	1355 km/Dalj	Paunovi i sur.	Paunovi i sur.
12	2001	Dunav	1300 km/Ilok	Paunovi i sur.	Paunovi i sur.
13	2002	Drava	akumulacija Varaždin	Mrakov i i sur.	Mihaljevi
14	2002	Drava	akumulacija akovec	Mrakov i i sur.	Mihaljevi
15	2002	Drava	2 km nizvodno od Repaškog mosta	Stankovi	Stankovi
16	2002	jezero Jarun	Zagreb	Lajtner	Lajtner
17	2003	šoderica i ingi Lingi	Ledine Molvarske, Repaš	Stankovi	Stankovi
18	2003	Vransko jezero	PP Vransko jezero	Mrakov i i sur.	Mihaljevi
19	2003	jezero Kopačev	PP Kopački rit	Klobučar	Klobučar
20	2006	Drava	akumulacija Dubrava	Lajtner	Lajtner
21	2006	Drava	akumulacija Varaždin	Lajtner	Lajtner
22	2006	Drava	akumulacija akovec	Lajtner	Lajtner
23	2007	Dunav	Monjoroški dunavac	Faller/Hudina/Lajtner	Lajtner
24	2007	Dunav	Aljmaš	Lajtner	Lajtner
25	2007	Dunav	Dalj	Lajtner	Lajtner
26	2007	Dunav	Dalj	aleta/ Mihaljevi	Lajtner
27	2007	Dunav	Batina	aleta/ Mihaljevi	Lajtner
28	2007	Dunav	ušće Drave u Dunav	aleta/ Mihaljevi	Lajtner
29	2007	Dunav	Erdut	aleta/ Mihaljevi	Lajtner
30	2007	Drava	naselje Karašica	Faller/Hudina/Lajtner	Lajtner
31	2007	Drava	Nard	Faller/Hudina/Lajtner	Lajtner
32	2007	Drava	most Drnje	Hudina/ Žganec	Lajtner
33	2007	Drava	Molve	Hudina/ Žganec	Lajtner
34	2007	Drava	Novo Virje	Hudina/ Žganec	Lajtner
35	2007	Drava	Karaška Luka	Hudina/ Žganec	Lajtner
36	2009	Dunav	Batina, obala Dunava, 500 m uzvodno od mosta	Crnan	Lajtner
37	2010	jezero Kopačev	PP Kopački rit	Lajtner	Lajtner

#### 4. LITERATURA

- ACKERMAN JD, SIM B, NICHOLS SJ, CLAUDI R (1994) A review of the early life history of zebra mussels (*Dreissena polymorpha*): comparisons with marine bivalves. *Can J Zool* 72: 1169-1179
- BASTVIKEN DTE, CARACO NF, COLE JJ (1998) Experimental measurements of zebra mussel (*Dreissena polymorpha*) impacts on phytoplankton community composition. *Freshwat Biol* 39: 375-386
- BORCHERDING J (1991) The annual reproductive cycle of the freshwater mussel *Dreissena polymorpha* Pallas in lakes. *Oecologia* 87: 208-218
- CARLTON JT (1993) Dispersal mechanisms fo the zebra mussel. U: NALEPA TF, SCHLOESSER DW (eds.): *Zebra mussels: Biology, Impacts, and Control*. Lewis Publishers, Boca Raton, str 677-697
- CLAUDI R, MACKIE GL (1994) Practical manual for zebra mussel monitoring and control. Lewis Publishers, Boca Raton, 227 str
- FREEMAN S (2008) Biological science. Pearson Benjamin Cummings, San Francisco, str 1144-1147
- HEBERT PDN, WILSON CC, MURDOCH MH, LAZAR R (1991) Demography and ecological impacts of the invading mollusc *Dreissena polymorpha*. *Can J Zool* 69: 405-409
- HEBERT PDN, MUNCASTER BW, MACKIE GL (1989) Ecological and genetic studies on *Dreissena polymorpha* (Pallas): a new mollusc in the Great Lakes. *Can J Fish Aquat Sci* 46: 1587-1591
- HOLLAND RE (1993) Changes in planktonic diatoms and water transparency in Hatchery Bay, Bass Island area, western Lake Erie since the establishment of the Zebra mussel. *J Great Lakes Res* 19: 617-624
- KALAFATI M (1998) Osnove biološke evolucije. Hrvatsko prirodoslovno društvo, Zagreb, str 115-117
- LAJTNER J (2005) Reproductivni ciklus školjkaša *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771) u rijeci Dravi. Doktorska disertacija. PMF. Sveu ilište u Zagrebu. 134 str.
- LAJTNER J (2011) Baza podataka projekta Invazivne vrste beskralješnjaka u slatkovodnim ekosustavima Hrvatske, MZOŠ
- LEACH JH (1993) Impacts of the Zebra mussel (*Dreissena polymorpha*) on water quality and fish spawning reefs in western Lake Erie. U: NALEPA TF, SCHLOESSER DW (eds.): *Zebra mussels: Biology, Impacts, and Control*. Lewis Publishers, Boca Raton, str 381-397
- MACISAAC HJ, ROCHA R (1995) Effects of suspended clay on the zebra mussel (*Dreissena polymorpha*) faeces and pseudofaeces production. *Arch Hydrobiol* 135: 53-64
- MACISAAC HJ, SPRULES WG, JOHANNSON OE, LEACH JH (1992) Filtering impacts of larval and sessile zebra mussels (*Dreissena polymorpha*) in western Lake Erie. *Oecologia* 92: 30-39
- MACKIE, GL (1999) Ballast Water Introductions of Mollusca. U: CLAUDI R, LEACH JH (eds): *Nonindigenous Freshwater Organisms: Vectors, Biology, and Impacts*. Lewis Publishers, Boca Ratton, str 19-254
- MACKIE GL, SCHLOESSER DW (1996) Comparitive Biology of Zebra Mussels in Europe and North America: An Overview. *Am Zool* 36: 244-258

- MACKIE GL, GIBBON B, MUNCASTER B, GRAY I (1989) Zebra mussels (*Dreissena polymorpha*): A synthesis of European experiences and preview for North America. BAR Environmental, Queens Printer for Ontario.
- MATONI KIN I, HABDIJA I, PRIMC-HABDIJA B (1998) Biologija nižih avvertebrata. Školska knjiga, Zagreb, str 609
- MILLER SS (1992) The Pesky Zebra Mussel. Environ Sci Technol 26: 2334-2336
- MOLLOY DP, KARATAYEV AY, BURLAKOVA LE, KURANDINA DP, LARUELLE F (1997) Natural enemies of zebra mussels: predators, parasites, and ecological competitors. Rev Fish Sci. 5: 27-97
- NICHOLS SJ (1993) Spawning of zebra mussels (*Dreissena polymorpha*) and rearing of veligers under laboratory conditions. U: Nalepa TF, Schloesser DW (eds.): Zebra mussels: Biology, Impacts, and Control. Lewis Publishers, Boca Raton, str. 315-329
- SILVERMAN H, LYNN JW, DIETZ TH (1996) Particle Capture by the Gills of *Dreissena polymorpha*: Structure and Function of Latero-frontal Cirri. Biol Bull 191: 42-54
- STANCZYKOWSKA A (1977) Ecology of *Dreissena polymorpha* (Pall.) (Bivalvia) in lakes. Pol Arch Hydrobiol 24: 461-530

#### INTERNETSKI IZVORI

- [www.bgman.info](http://www.bgman.info) (pristupljeno 26.8.2011.)
- [www.epa.gov](http://www.epa.gov) (pristupljeno 26.8.2011.)
- [www.flickr.com](http://www.flickr.com) (pristupljeno 29.8.2011.)
- [www.invasivespecies.gov](http://www.invasivespecies.gov) (pristupljeno 25.8.2011.)
- [www.isscpg.org](http://www.isscpg.org) (pristupljeno 1.9.2011.)
- [www.issg.org](http://www.issg.org) (pristupljeno 25.8.2011.)
- [www.learnnc.org](http://www.learnnc.org) (pristupljeno 1.9.2011.)
- [www.nationalparkstraveler.com](http://www.nationalparkstraveler.com) (pristupljeno 2.9.2011.)
- [www.water.ca.gov](http://www.water.ca.gov) (pristupljeno 29.8.2011.)
- [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) (pristupljeno 29.8.2011.)
- [www.wjon.com](http://www.wjon.com) (pristupljeno 7.9.2011.)

## 5. SAŽETAK

Slatkovodni školjkaš *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771) je autohtona vrsta u Crnome moru i Kaspijskom jezeru. Ova vrsta je ponajviše putem balastnih voda proširila svoj areal te je trenutno prisutna u brojnim rijekama i jezerima Europe i Sjeverne Amerike. Kao invazivna vrsta, ona na područjima introdukcije uzrokuje brojne nepoželjne ekološke i socio-ekonomske učinke. Izrazito velika reproduktivna sposobnost, slobodno plivajuća veliger ličinka te mogućnost stvaranja bisusnih niti samo su neke od karakteristika koje ovome školjkašu omogućuju ovakvo proširenje areala. Kako bi se spriječio daljnje širenje vrste *D. polymorpha* primjenjuju se biološke, kemijske i fizičke metode kontrole. Istraživanja koja se u Hrvatskoj provode od 1990. godine pokazuju kako se ova vrsta invazivnog školjkaša iz rijeke Dunav proširila u rijeku Dravu, a pronađena je i u jezerima Vinski Lingi, Jarun, Kopačevsko i u Vranskom jezeru.

## 6. SUMMARY

Freshwater mussel *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771) is a species native to the Black and Caspian seas. One of the species' main means of expanding its living area is ballast waters. Today this mussel can be found throughout the rivers and lakes of Europe and North America. As an invasive species, the mussel *D. polymorpha* once introduced to a new habitat causes many unwanted environmental and socio-economic impacts. This species has a number of characteristics that have allowed its rapid expansion. Some of the traits are rapid reproduction and possession of planktonic veliger larvae and byssal threads. Many biological, chemical and physical methods of control are in use to stop the further dispersal of this mussel. Research done in Croatia since the 1990's showed how this species of invasive mussel spread from the river Dunav into the river Drava. Also it has been found in lakes Vinski Lingi, Jarun, Kopačevsko and Vrana.