

# Struktura grafova višeg reda

---

**Perlić, Antonija**

**Master's thesis / Diplomski rad**

**2016**

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:* **University of Zagreb, Faculty of Science / Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet**

*Permanent link / Trajna poveznica:* <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:217:102027>

*Rights / Prava:* [In copyright](#)

*Download date / Datum preuzimanja:* **2021-09-17**



*Repository / Repozitorij:*

[Repository of Faculty of Science - University of Zagreb](#)



**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU**  
**PRIRODOSLOVNO–MATEMATIČKI FAKULTET**  
**MATEMATIČKI ODSJEK**

Antonija Perlić

**STRUKTURA GRAFOVA VIŠEG REDA**

Diplomski rad

Voditelj rada:  
Doc.dr.sc. Pavle Goldstein

Zagreb, rujan, 2016.

Ovaj diplomski rad obranjen je dana \_\_\_\_\_ pred ispitnim povjerenstvom u sastavu:

1. \_\_\_\_\_, predsjednik
2. \_\_\_\_\_, član
3. \_\_\_\_\_, član

Povjerenstvo je rad ocijenilo ocjenom \_\_\_\_\_.

Potpisi članova povjerenstva:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

*Ovaj rad želim posvetiti svojoj majci Zdenki.*

# Sadržaj

<b>Sadržaj</b>	<b>iv</b>
<b>Uvod</b>	<b>1</b>
<b>1 Matrica susjedstva i usmjereni graf</b>	<b>2</b>
1.1 Definicije i osnovni pojmovi . . . . .	2
<b>2 2-grafovi</b>	<b>5</b>
2.1 2-grafovi . . . . .	5
<b>3 <math>C^*</math>-algebre grafova</b>	<b>11</b>
3.1 Osnovni pojmovi . . . . .	11
3.2 Primjeri elementarnih $C^*$ -algebri . . . . .	13
3.3 $C^*$ -algebre grafova . . . . .	14
<b>Bibliografija</b>	<b>20</b>

# Uvod

U ovom radu će se proćavati struktura grafova drugog reda i pridruženih algebri. Da bismo došli do pojma 2-grafa prvo ćemo promatrati usmjerene grafove i njima pridružene matrice susjedstva. Nakon toga ćemo definirati što je to 2-graf, dati jednostavne primjere za bolje razumijevanje definicije te iskazati i dokazati nužan i dovoljan uvjet za egzistenciju bijekcije pomoću koje ćemo iz dva 1-grafa formirati 2-graf. Nakon toga ćemo napraviti uvod u posebnu klasu  $C^*$ -algebri:  $C^*$ -algebre grafova, odnosno  $C^*$ -algebre koje zadajemo preko grafova.


# Poglavlje 1

## Matrica susjedstva i usmjereni graf

U ovom poglavlju ćemo promatrati usmjerene grafove i njima pridružene matrice susjedstva.

### 1.1 Definicije i osnovni pojmovi

Da bismo došli do pojma 2-grafa prvo ćemo promatrati nenegativne cjelobrojne matrice susjedstva reda  $n$  ( $A \in M_{n,n}(\mathbb{Z}^+)$ ). Takvoj matrici možemo pridružiti usmjereni graf  $\Gamma_A = (V, E)$  gdje je  $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  skup svih vrhova, a  $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$  skup svih bridova grafa  $\Gamma_A$ . Broj svih vrhova u grafu  $\Gamma_A$  jednak je redu matrice  $A$ .



Slika 1.1: Primjer usmjerenog grafa

**Definicija 1.1.1.** *Matrica susjedstva  $A$  dimenzija  $n \times n$  dana je formulom po članovima:*


$$A_{i,j} = \begin{cases} a, & (v_i, v_j) \in E, a \in \mathbb{N}, i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$

$A_{ij}$  nam govori na koliko načina možemo doći iz vrha  $v_i$  u vrh  $v_j$ , odnosno to je broj bridova iz vrha  $v_i$  u vrh  $v_j$ . Radi jednostavnosti, dane pojmove ću prikazati grafički na sljedećem primjeru.

**Primjer 1.1.2.**  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Usmjeren graf pridružen matrici susjedstva  $A$  prikazan je na Slici 1.1. Skup svih vrhova je dan s  $V = \{v_1, v_2, v_3\}$ , a skup svih bridova s  $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}$ .

**Definicija 1.1.3.** Neka je  $A \in M_{n,n}(\mathbb{Z}^+)$  matrica susjedstva i  $\Gamma_A$  pripadni usmjeren graf. Definiramo preslikavanje izvor (eng. source)  $s : E \rightarrow V$  i rang (eng. range)  $r : E \rightarrow V$ , gdje za  $e \in E$ ,  $s(e)$  označava vrh iz kojeg  $e$  počinje, dok  $r(e)$  označava vrh u kojem  $e$  završava.



Slika 1.2: Primjer usmjerenog grafa

Na gornjem grafu skup vrhova  $V = \{w, v, u\}$ , skup bridova  $E = \{e, f, g, h\}$ ,  $r(e) = r(h) = r(f) = u$ ,  $r(g) = v$ ,  $s(e) = u$ ,  $s(h) = s(g) = w$ ,  $s(f) = v$ .

**Definicija 1.1.4.** Niz bridova  $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$  nazivamo put kroz graf  $\Gamma_A$  ako vrijedi

$$r(e_i) = s(e_{i+1}), \forall i. \quad (1.1)$$

**Lema 1.1.5.** Neka je  $A$  matrica susjedstva usmjerenog grafa i neka je  $\Gamma_A$  njoj pridružen usmjeren graf. Tada se na  $(i, j)$ -om mjestu matrice  $A^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , nalazi broj puteve duljine  $n$  iz vrha  $v_i$  u vrh  $v_j$ .



*Dokaz.* Na  $(i,j)$ -om mjestu matrice  $A$  piše broj različitih puteva duljine 1 iz vrha  $v_i$  u vrh  $v_j$ .

$$(A^2)_{ij} = (A \times A)_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik}A_{kj} \quad (1.2)$$

- za  $k=1$ : prvi član gornje sume je jednak  $A_{i1}A_{1j}$ . To je broj puteva duljine 1 od vrha  $v_i$  do vrha  $v_1$ , pomnoženo brojem puteva duljine 1 od vrha  $v_1$  do vrha  $v_j$ . Dakle, taj umnožak je jednak broju puteva duljine 2 koji prolaze preko vrha  $v_1$ .
- za  $k=2$ : drugi član gornje sume je jednak  $A_{i2}A_{2j}$ . To je broj puteva duljine 1 od vrha  $v_i$  do vrha  $v_2$ , pomnoženo brojem puteva duljine 1 od vrha  $v_2$  do vrha  $v_j$ . Dakle, taj umnožak je jednak broju puteva duljine 2 koji prolaze preko vrha  $v_2$ .
- $\vdots$
- za  $k=n$ : zadnji član gornje sume je jednak  $A_{in}A_{nj}$ . To je broj puteva duljine 1 od vrha  $v_i$  do vrha  $v_n$ , pomnoženo brojem puteva duljine 1 od vrha  $v_n$  do vrha  $v_j$ . Dakle, taj umnožak je jednak broju puteva duljine 2 koji prolaze preko vrha  $v_n$ .

Ako zbrojimo ove vrijednosti za svaki  $k = 1, 2, \dots, n$ , dobivamo broj različitih puteva duljine 2 od vrha  $v_i$  do vrha  $v_j$ . Trivijalno se vidi da smo na taj način prebrojali sve puteve duljine 2 iz vrha  $v_i$  u vrh  $v_j$  te neki put nismo brojali dvaput zbog toga što za svaki  $k = 1, 2, \dots, n$ , vrh preko kojeg prelazimo u sredini puta je drukčiji.

Zaključujemo da sa na  $(i, j)$ -om mjestu kvadrirane matrice susjedstva nalazi broj svih puteva duljine 2 iz vrha  $v_i$  u vrh  $v_j$ . Ovakvo razmišljanje primijenimo za svaki  $n \in \mathbb{N}$ .

□

Iz gornje Leme 1.1.5 slijedi da je produkt matrice  $A^n$  i  $A^m$  u kojima piše broj svih puteva duljine  $n$ , odnosno  $m$ ,  $n, m \in \mathbb{N}$  jednak matrici u kojoj piše broj svih puteva duljine  $n + m$ , tj. jednak je matrici  $A^{n+m}$ .

# Poglavlje 2

## 2-grafovi

### 2.1 2-grafovi

**Definicija 2.1.1.** Kategorija je matematički objekt koji se sastoji od 2 klase,  $C^0$  (objekti) i  $C^1$  (morfizmi), sa sljedećim svojstvima:

- postoje preslikavanja  $r : C^1 \rightarrow C^0$  i  $s : C^1 \rightarrow C^0$  koje zovemo izvor i rang
- postoji preslikavanje  $\circ : \{(f, g) \in C^1 \times C^1; s(f) = r(g)\} \rightarrow C^1$  koju zovemo kompozicija sa svojstvom da je  $r(g \circ f) = r(g)$ ,  $s(g \circ f) = s(f)$
- postoji preslikavanje  $i : C^0 \rightarrow C^1$  koju zovemo identiteta (petlja) takva da  $\forall c \in C^0$  vrijedi:

$$r(i(c)) = c = s(i(c)) \quad (2.1)$$

**Definicija 2.1.2.** Neka su  $C$  i  $D$  kategorije. Funktor  $F$  je preslikavanje  $F : C \rightarrow D$  kojeg čine dva preslikavanja  $F^0 : C^0 \rightarrow D^0$  i  $F^1 : C^1 \rightarrow D^1$  za koje vrijedi:

- $\forall c \in C^0, F^1 \circ i(c) = i(F^0(c))$
- ako je  $(f : c \rightarrow c') \in C^1$ , onda je  $(F^1(f) : F^0(c) \rightarrow F^0(c')) \in D^1$
- $F^1(f \circ g) = F^1(f) \circ F^1(g)$

**Definicija 2.1.3.** 2 – graf  $(\Lambda, d)$  sastoji se od prebrojive male kategorije  $\Lambda$  (sa funkcijama  $r$  i  $s$ ) i funktora  $d : \Lambda \rightarrow \mathbb{N}^2$  koji zadovoljava sljedeće svojstvo:

$$\forall \lambda \in \Lambda, \forall m, n \in \mathbb{N}^2 \quad \text{takvi da je} \quad d(\lambda) = m + n, \quad (2.2)$$

postoje jedinstveni  $\mu, \nu \in \Lambda$  takvi da je

$$\lambda = \mu\nu (= \mu \circ \nu) \quad \text{i} \quad d(\mu) = m, d(\nu) = n. \quad (2.3)$$

**Napomena 2.1.4.** Pojam male prebrojive kategorije iz prethodne definicije označava da je klasa objekata  $C^0$  prebrojiv skup.

Slijedeća lema govori da 2-graf možemo konstruirati iz nekih 1-grafova.

**Lema 2.1.5.** Neka su  $A$  i  $B$  matrice susjedstva definirane nad istim skupom vrhova. Ako matrice  $A$  i  $B$  komutiraju, tada postoji bijekcija  $\Theta$  sa skupa  $A^1 * B^1 = \{(a, b) \in A^1 \times B^1, s(a) = r(b)\}$  u skup  $B^1 * A^1 = \{(b, a) \in B^1 \times A^1, s(b) = r(a)\}$ .

*Dokaz.* Matrice  $A$  i  $B$  su definirane nad istim skupom vrhova  $A^0 = B^0 = V$ . Budući da radimo nad konačnim skupovima, možemo pretpostaviti da imamo  $n$  vrhova i da je  $V = \{1, 2, \dots, n\}$ , tj.  $A, B \in M_{n,n}(\mathbb{Z}^+)$

$$A_{n,n} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix} \quad B_{n,n} = \begin{pmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & \cdots & b_{1,n} \\ b_{2,1} & b_{2,2} & \cdots & b_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n,1} & b_{n,2} & \cdots & b_{n,n} \end{pmatrix}$$

Neka je  $\Gamma_A$  graf pridružen matrici  $A$  i nekaj je  $\Gamma_B$  graf pridružen matrici  $B$ . Gledamo što je to  $(AB)_{ij}$ :

$$(AB)_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} \quad (2.4)$$

Uočimo naprimjer da je  $a_{i1}b_{1j} = 1$  ako i samo ako postoji brid iz vrha  $i$  u vrh 1 u grafu  $\Gamma_A$  i postoji brid iz vrha 1 u vrh  $j$  u grafu  $\Gamma_B$  ako i samo ako  $(\vec{1}_j, \vec{1}_1) \in B^1 * A^1$ .

Po pretpostavci  $A$  i  $B$  komutiraju, tj.  $AB = BA$ , odnosno  $(AB)_{ij} = (BA)_{ij}, \forall i, j = 1, 2, \dots, n$ . Dakle, na mjestu  $ij$  u matrici  $AB$  i  $BA$  nalazi se isti broj, neka je to  $k \in \mathbb{Z}^+$ . To znači da imamo točno  $k$  jedinica u rastavu  $(AB)_{ij}$  (to ne znači da imamo točno  $k$  članova sume (2.4) jer imamo mogućnost višestrukih bridova i petlji).

Analogno zaključujemo i u slučaju  $(BA)_{ij}$ :

$$(BA)_{ij} = b_{i1}a_{1j} + b_{i2}a_{2j} + \cdots + b_{in}a_{nj} \quad (2.5)$$

Uočimo naprimjer da je  $b_{i2}a_{2j} = 1$  ako i samo ako postoji brid iz vrha  $i$  u vrh 2 u grafu  $\Gamma_B$  i postoji brid iz vrha 2 u vrh  $j$  u grafu  $\Gamma_A$  ako i samo ako  $(\vec{2}_j, \vec{2}_2) \in A^1 * B^1$ .

Jer je  $(AB)_{ij} = (BA)_{ij}$  slijedi da je  $(BA)_{ij} = k$ , tj. imamo točno  $k$  jedinica u rastavu, tj. točno  $k$  različitih puteva duljine 1.

Sada uzmemo tih  $k$  članova sume iz  $(BA)_{ij}$  i preslikamo ih u  $k$  članova sume iz  $(AB)_{ij}$ . Budući da je  $k$  konačan prirodan broj (ili 0) sigurno imamo bijekciju iz prvog skupa u drugi.

Uočimo da je takvo preslikavanje dobro, tj. podudara se sa definicijom skupova  $A^1 * B^1$  i  $B^1 * A^1$ , odnosno ako  $(\alpha, \beta) \mapsto (\beta', \alpha')$  vrijedi  $r(\alpha) = r(\beta')$  i  $s(\beta) = s(\alpha')$ . Npr. ako je  $b_{i2}a_{2j} = 1$  u relaciji (2.5) i  $a_{i1}b_{1j} = 1$  u relaciji (2.4), onda možemo  $(\vec{2}j, i\vec{2}) \in A^1 * B^1$  preslikati u  $(i\vec{1}j, i\vec{1}) \in B^1 * A^1$  i  $r(\vec{2}j) = r(i\vec{1}j) = j$  i  $s(i\vec{2}) = s(i\vec{1}) = i$ .

To napravimo  $\forall i, j$  u matrici  $AB = BA$  i na taj način dobijemo bijekciju sa skupa  $A^1 * B^1$  u skup  $B^1 * A^1$

□

**Napomena 2.1.6.** *Obrat Leme 2.1.5. očito vrijedi ako pretpostavimo još jedan dodatan uvjet. Neka postoji bijekcija  $\Theta : A^1 * B^1 = \{(a, b) \in A^1 \times B^1, s(a) = r(b)\} \rightarrow B^1 * A^1 = \{(b, a) \in B^1 \times A^1, s(b) = r(a)\}$  i pretpostavimo da vrijedi sljedeće: ako  $(\alpha, \beta) \mapsto (\beta', \alpha')$ , onda vrijedi  $r(\alpha) = r(\beta')$  i  $s(\beta) = s(\alpha')$ . Vidimo da  $\Theta$  preslikava put iz  $A^1 \times B^1$  u put s istim početkom i krajem iz  $B^1 \times A^1$ . Jer postoji bijekcija  $\implies$  broj puteva mora biti jednak  $\implies (AB)_{ij} = (BA)_{ij}, \forall i, j \implies AB = BA$ , tj. matrice susjedstva komutiraju.*

Ako je  $\Theta$  takva bijekcija, možemo formirati 2-graf  $A *_\Theta B$  gdje je  $(A *_\Theta B)^0 = A^0 = B^0 = V$  i možemo poistovjetiti  $(A *_\Theta B)^{e_1}$  sa  $A^1$  te  $(A *_\Theta B)^{e_2}$  sa  $B^1$ . Dakle pomoću dva 1-grafa i bijekcije  $\Theta$  možemo formirati 2-graf  $A *_\Theta B$ .

Puteve  $(A *_\Theta B) \setminus (A *_\Theta B)^0$  možemo shvaćati kao neprazne nizove  $\{\lambda_i, i = 1, \dots, n\} \subset A_1 \sqcup B_1$ , gdje je  $s(\lambda_i) = r(\lambda_{i+1}), \forall i = 1, 2, \dots, n$ . Takve puteve pišemo kao  $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \dots \lambda_n = \lambda_1 \circ \lambda_2 \circ \lambda_3 \circ \dots \circ \lambda_n$ .

Stupanj od  $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \dots \lambda_n$  jednak je  $(m_1, m_2)$ , gdje je  $m_1$  broj  $\lambda_i$ -eva iz  $A_1$  a  $m_2$  broj  $\lambda_i$ -eva iz  $B_1$ .


Uloga bijekcije  $\Theta$  je osigurati da  $A *_\Theta B$  zadovoljava pravilo faktorizacije: za  $a \in (A *_\Theta B)^{e_1}$  i  $b \in (A *_\Theta B)^{e_2}$ , te  $s(a) = r(b)$ , vrijedi  $ab = b'a' \in (A *_\Theta B)^{(1,1)}$ , ako je  $\Theta(a, b) = (b', a')$ .

**Primjer 2.1.7.** *U ovom primjeru vidjeti ćemo da je komutacija matrica susjedstva iz Leme 2.1.5 nužna za egzistenciju bijekcije  $\Theta$ . Iz Slike 2.1. vidimo:*

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vidimo da je  $AB \neq BA$ , a jer je bijekcija  $\Theta$  definirana po elementima matrice  $AB$ , odnosno  $BA$ , očito je da bijekcija  $\Theta : A^1 * B^1 = \{(a, b) \in A^1 \times B^1, s(a) = r(b)\} \rightarrow B^1 * A^1 = \{(b, a) \in B^1 \times A^1, s(b) = r(a)\}$  ne postoji.



Slika 2.1: Skica 2-grafa

**Lema 2.1.8.** *Ako znamo rastav puteva iz  $(A *_{\Theta} B)^{(1,1)}$ , onda znamo rastav svih puteva  $(A *_{\Theta} B)^{(m,n)}$ ,  $\forall m, n \in \mathbb{N}$ .*

*Dokaz.*  $(A *_{\Theta} B)^{(m,n)} \implies$  imamo  $m$  puteva duljine 1 iz  $A_1$  i  $n$  puteva duljine 1 iz  $B_1$ .  
Neka su  $i_1, i_2, \dots, i_m \in A_1$  te  $j_1, j_2, \dots, j_n \in B_1$ . Vrijedi:

$$\begin{aligned} d(i_1) = d(i_2) = \dots = d(i_m) &= (1, 0) \\ d(j_1) = d(j_2) = \dots = d(j_n) &= (0, 1) \end{aligned} \quad (2.6)$$

Na primjer:

$$i_1 i_2 j_1 i_3 j_2 i_4 i_5 i_6 j_7 j_8 i_9 \quad (2.7)$$


Upravo bijekcija  $\Theta$  osigurava da svaki put iz skupa  $(A *_{\Theta} B)^{(1,1)}$  zadovoljava pravilo faktorizacije, tj. da za neki put  $ij$  takav da je  $r(j) = s(i)$  koji je potput puta (2.7) postoji jedinstveni put  $i' \in (A *_{\Theta} B)^{e_1}$  i  $j' \in (A *_{\Theta} B)^{e_2}$  takvi da je  $ij = j'i' \in (A *_{\Theta} B)^{(1,1)}$ . Grupirajući potputeve iz (2.7) i primjenjivajući definiranu bijekciju  $\Theta$  dolazimo do jedinstvenog rastava puta (2.7).

□

Lemu 2.1.8 najbolje ćemo razumjeti na sljedećem primjeru.

**Primjer 2.1.9.** *Na Slici 2.2. dana je skica 2-grafa. Vrijedi:*

$$\begin{aligned} V &= A^0 = B^0 = \{1\} \\ A &= [2], B = [2] \\ AB &= BA = [4] \\ (A^1 * B^1) &= \{(a, \alpha), (a, \beta), (b, \alpha), (b, \beta)\} \\ (B^1 * A^1) &= \{(\alpha, a), (\alpha, b), (\beta, a), (\beta, b)\} \end{aligned} \quad (2.8)$$



Slika 2.2: Skica 2-grafa

Ukupno ima  $4! = 24$  preslikavanja  $\Theta : (A^1 * B^1) \rightarrow (B^1 * A^1)$ , ali ne razlikujemo bridove  $\alpha$  i  $\beta$  te  $a$  i  $b$ . Isto tako ne razlikujemo “gornje bridove”  $a, b$  od “donjih bridova”  $\alpha, \beta$ . Zbog toga dijelimo 24 sa  $2 \cdot 2 \cdot 2$  i dobivamo 3 fundamentalno različite bijekcije. Moguće bijekcije, odnosno indetitete su:

$$\begin{aligned}
 a\alpha &= \alpha a \\
 a\beta &= \alpha b \\
 b\alpha &= \beta a \\
 b\beta &= \beta b
 \end{aligned}
 \tag{2.9}$$

$$\begin{aligned}
 a\alpha &= \alpha a \\
 a\beta &= \beta a \\
 b\alpha &= \alpha b \\
 b\beta &= \beta b
 \end{aligned}
 \tag{2.10}$$

$$\begin{aligned}
 a\alpha &= \beta b \\
 a\beta &= \alpha b \\
 b\alpha &= \beta a \\
 b\beta &= \alpha a
 \end{aligned}
 \tag{2.11}$$

Uzmimo npr. da je bijekcija zadana sa (2.9) i uzmimo neki put, npr.  $\lambda = ab\beta\alpha \in (A *_\Theta B)^{(2,2)}$ . Znamo rastav svih puteva iz skupa  $(A *_\Theta B)^{(1,1)}$  pa prema Lemi 2.1.8 znamo rastav zadanog puta.  $d(\lambda) = (2, 2) = (0, 2) + (2, 0)$  te znamo da postoje jedinstveni putevi  $\mu$  i  $\nu$  takvi da vrijedi  $\lambda = \mu \circ \nu$  i da je  $d(\mu) = (0, 2)$ ,  $d(\nu) = (2, 0)$ .

$$\begin{aligned} a | b\beta | \alpha, b\beta = \beta b &\implies a\beta b\alpha \\ | a\beta | b\alpha, a\beta = \alpha b &\implies \alpha b b\alpha \\ \alpha b | b\alpha, b\alpha = \beta a &\implies \alpha b\beta a \\ \alpha | b\beta | a, b\beta = \beta b &\implies \alpha\beta b a \end{aligned} \tag{2.12}$$

$$\implies \mu = \alpha\beta, \nu = ba, d(\mu) = (0, 2), d(\nu) = (2, 0).$$

# Poglavlje 3

## $C^*$ -algebre grafova

### 3.1 Osnovni pojmovi

**Definicija 3.1.1.** *Neka je  $V$  Abelova grupa u odnosu na zbrajanje, a  $F$  polje. Na skupu  $F \times V$  definirano je množenje vektora skalarom, tj. preslikavanje  $F \times V \rightarrow V$ , koje svakom skalaru  $\alpha \in F$  i svakom vektoru  $x \in V$  pridružuje vektor  $\alpha x \in V$ , tako da vrijede sljedeći aksiomi:*

- $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x, \forall \alpha, \beta \in F, \forall x \in V$
- $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y, \forall \alpha \in F, \forall x, y \in V$
- $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x, \forall \alpha, \beta \in F, \forall x \in V$
- $1x = x, \forall x \in V$ .

*Ovako definirano preslikavanje zove se množenje vektora skalarom, dok se  $V$  naziva vektorski prostor nad poljem  $F$ .*

**Definicija 3.1.2.** *Neka je  $V$  vektorski prostor nad poljem  $F$ . Norma na  $V$  je preslikavanje  $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \|x\|$ , za koje vrijedi:*

- $\|x\| \geq 0, \forall x \in V$ ,
- $\|x\| = 0 \iff x = 0$ ,
- $\|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|, \forall \lambda \in F, \forall x \in V$ ,
- $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \forall x, y \in V$ .

*Normiran prostor je uređeni par  $(V, \|\cdot\|)$ .*



Preslikavanje koje zadovoljava svojstva Definicije 3.1.2, osim drugog, zovemo *seminorma*.

**Definicija 3.1.3.** *Vektorski prostor  $A$  nad poljem  $F$ , zajedno sa operacijama množenja  $(x,y) \mapsto xy$  zove se algebra nad  $F$ , ako preslikavanje  $(x,y) \mapsto xy$  s  $A \times A$  u  $A$  ima svojstva:*

- $(xy)z = x(yz)$ ,
- $x(y + z) = xy + xz$ ;  $(x + y)z = xz + yz$ ,
- $(\alpha x)y = x(\alpha y)$ ,

za sve  $\alpha \in F$  i sve  $x, y, z \in A$ .

**Definicija 3.1.4.** *Funkcija  $x \mapsto \|x\|$  s algebre  $A$  u polje realnih brojeva je norma na algebri  $A$  ako je  $x \mapsto \|x\|$  norma na vektorskom prostoru  $A$ , i vrijedi:*

- $\|x \cdot y\| \leq \|x\| \cdot \|y\|, \forall x, y \in A$ ,
- $\|1\| = 1$ , za  $1 \in A$  jedinični element.

Uređeni par  $(A, \|\cdot\|)$  zovemo normirana algebra.

**Definicija 3.1.5.** *Normiran prostor  $X$  je potpun ili Banachov ako je svaki Cauchyjev niz u  $X$  konvergentan.*

**Definicija 3.1.6.** *Za normiranu algebru  $(A, \|\cdot\|)$  kažemo da je Banachova algebra ako je  $A$  Banachov prostor.*

**Definicija 3.1.7.** *Operacija  $*$  :  $A \rightarrow A$ , dana sa  $x \mapsto x^*$ , zove se involucija ako za svaki  $x, y \in A$  i svaki  $\alpha \in \mathbb{C}$  vrijedi:*

- $(x^*)^* = x$ ,
- $(xy)^* = y^*x^*$ ,
- $(\alpha x)^* = \bar{\alpha}x^*$ .

**Definicija 3.1.8.** *Operacija involucije na  $A$  je izometrička ako vrijedi:*

$$\|x^*\| = \|x\|, \forall x \in A. \quad (3.1)$$

**Definicija 3.1.9.** *Neka je  $A$  Banachova algebra s izometričkom involucijom. Kažemo da je  $A$   $C^*$ - algebra ako za svaki  $x \in A$  vrijedi:*

$$\|xx^*\| = \|x\|^2. \quad (3.2)$$

**Napomena 3.1.10.** Identitet (3.2) ćemo zvati  $C^*$  – svojstvo norme.

**Definicija 3.1.11.** Ograničenu linearnu funkciju  $\varphi : A \rightarrow B$ , gdje su  $A$  i  $B$   $C^*$ -algebre, zovemo  $*$ -homomorfizam ako za svaki  $x, y \in A$  vrijedi:

- $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$ ,
- $\varphi(x^*) = \varphi(x)^*$ .

Svaki  $*$ -homomorfizam  $\varphi$  između  $C^*$ -algebri je norme  $\leq 1$ , što je posljedica  $C^*$ -svojstva norme.

**Definicija 3.1.12.** Preslikavanje  $f$  iz jedne strukture u drugu naziva se izomorfizmom ako vrijedi:

- preslikavanje  $f$  je bijektivno
- preslikavanje  $f$  je homomorfizam
- inverzna funkcija  $f^{-1}$  homomorfizam

Ako postoji izomorfizam između dvije strukture, tada se za njih kaže da su izomorfne.

## 3.2 Primjeri elementarnih $C^*$ -algebri

Elementarnim  $C^*$ -algebama obično se nazivaju algebre svih ograničenih operatora na nekom Hilbertovom prostoru  $H$ , algebra kompaktnih operatora, te algebra neprekidnih funkcija s nekog kompaktnog Hausdorffovog prostora  $X$  u  $\mathbb{C}$ . Stoga, neki od najjednostavnijih primjera  $C^*$ -algebri su skup kompleksnih brojeva  $\mathbb{C}$ , prostor svih neprekidnih kompleksnih funkcija definiranih na segmentu  $[0,1]$ , skup svih  $n \times n$  matrica nad  $\mathbb{C}$  ( $M_n(\mathbb{C})$ ), i slično.

**Lema 3.2.1.** Neka je  $A = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}; f \text{ neprekidna}\} = C[0, 1]$ , tj. prostor svih neprekidnih kompleksnih funkcija sa segmenta  $[0, 1] \subseteq \mathbb{R}$  u  $\mathbb{C}$ . Za  $f, g \in A$  i  $\alpha \in \mathbb{C}$  definiramo zbrajanje, množenje, involuciju i normu:

- $(f + g)(t) = f(t) + g(t)$
- $(f \cdot g)(t) = f(t) \cdot g(t)$
- $(\alpha f)(t) = \alpha f(t)$
- $(f)^*(t) = \overline{f(t)}$
- $\|(f)(t)\| = \sup_{t \in X} |f(t)|$ .

Tada je  $A$   $C^*$ -algebra.

**Definicija 3.2.2.** Neka je  $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \in \mathbb{C}^n$ . Standardna norma u  $\mathbb{C}^n$  definira se kao:

$$|\xi| = \left( \sum \xi_i \bar{\xi}_i \right)^{1/2}. \quad (3.3)$$

**Lema 3.2.3.**  $M_n(\mathbb{C})$  je potpun prostor.

**Definicija 3.2.4.** Neka je  $H$  Hilbertov prostor sa skalarnim produktom  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  i neka je  $M : H \rightarrow H$  ograničen linearni operator. Tada postoji jedinstveni linearni operator  $M^* : H \rightarrow H$  takav da vrijedi:

$$\langle Mx, y \rangle = \langle x, M^*y \rangle, \forall x, y \in H. \quad (3.4)$$

Operator  $M^*$  zovemo adjungirani operator operatora  $M$ .

Za svaki ograničeni operator  $M$  definiramo

$$\|M\| = \sup\{|Mx| : x \in H, |x| = 1\}. \quad (3.5)$$

**Lema 3.2.5.** Neka su  $H$ ,  $M$  i  $M^*$  kao u Definiciji 3.2.4. Tada vrijedi sljedeće:

- $\|M\| = \|M^*\|$
- $\|M\|^2 = \|M^*M\|$

**Lema 3.2.6.** Neka je  $A = M_n(\mathbb{C})$ , tj. skup svih  $n \times n$  matrica nad  $\mathbb{C}$ . Na  $A$  se definiraju uobičajne operacije zbrajanja i množenja matrica te množenje matrice skalarom. Za  $X \in A$  i  $\xi \in \mathbb{C}^n$  definiramo operaciju involucije i normu sa:

- $X^* = [\bar{x}_{j,i}]$  za  $X = [x_{i,j}]$ ,
- $\|M\| = \sup_{\{|\xi|=1\}} |X\xi|$ .

Tada je  $A$   $C^*$ -algebra.

### 3.3 $C^*$ -algebre grafova

**Definicija 3.3.1.** Neka je  $A$  proizvoljna  $C^*$ -algebra. Tada za element  $p \in A$  kažemo da je ortogonalni projektor ako je  $p^2 = p = p^*$ .

**Definicija 3.3.2.** Neka je  $A$  proizvoljna  $C^*$ -algebra. Tada za element  $s \in A$  kažemo da je parcijalna izometrija ako su  $ss^*$  i  $s^*s$  ortogonalni projektori.


**Primjer 3.3.3.** Neka je  $e_{ij} \in M_{n,n}(\mathbb{C})$  matrica koja na  $(i, j)$ -tom mjestu ima jedinicu, a svi ostali elementi su 0, za  $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ . Uočimo da je  $e_{ij}$  parcijalna izometrija za svaki  $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ :

$$e_{ij}e_{ij}^* = e_{ij}e_{ji} = e_{ii}, \quad (3.6)$$

$$e_{ij}^*e_{ij} = e_{ji}e_{ij} = e_{jj}, \quad (3.7)$$

$$e_{ii} = e_{ii}^2 = e_{ii}^*, \quad (3.8)$$

tj.  $e_{ii}$  je ortogonalni projektor.



Slika 3.1: Prikaz grafova

**Definicija 3.3.4.** Neka je  $G=(V,E,s,r)$  usmjeren graf, neka je  $S = \{S_e, e \in E\}$  skup parcijalnih izometrija te neka je  $P = \{P_v, v \in V\}$  skup ortogonalnih projektor.  $C^*$ -algebra  $C^*(G)$  je generirana Cuntz-Kriegerovom familijom  $\{S, P\}$  ako ona zadovoljava sljedeća svojstva:

- $S_e^*S_e = P_{r(e)}, \forall e \in E$
- $P_v = \sum_{\{e:s(e)=v\}} S_e S_e^*, \forall v \in s(E).$

**Primjer 3.3.5.** Uzmimo prvi graf sa Slike 3.1. i označimo ga sa  $G_1$ . Graf  $G_1$  sadrži samo jedan vrh pa imamo samo jedan generator

$$P_v = P_v^2 = P_v^* \quad (3.9)$$

pa je u ovom slučaju  $C^*(G) = \mathbb{C}$ .

Uzmimo drugi graf sa Slike 3.1. i označimo ga sa  $G_2$ . Generatori su sljedeći:

$$P_v = P_v^2 = P_v^* \quad (3.10)$$

$$S_e \quad (3.11)$$

Relacija:

$$S_e^* S_e = P_v = S_e S_e^* \quad (3.12)$$

pa vidimo da je  $C^*(G) = C(S^1) = \{z \in \mathbb{C}, \|z\| = 1\}$ .

Uzmimo treći graf sa Slike 3.1. i označimo ga sa  $G_3$ . Generatori su sljedeći:

$$P_{v_1} = P_{v_1}^2 = P_{v_1}^* \quad (3.13)$$

$$P_{v_2} = P_{v_2}^2 = P_{v_2}^* \quad (3.14)$$

$$S_e \quad (3.15)$$

Relacija:

$$S_e^* S_e = P_{v_2} \quad (3.16)$$

Neka je  $e_{ij}$   $2 \times 2$  matrica koja na  $(i, j)$ -tom mjestu ima jedinicu, a svi ostali elementi su 0, za  $i, j \in \{1, 2\}$ . Neka vrijedi sljedeće:

$$P_{v_1} \mapsto e_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.17)$$

$$P_{v_2} \mapsto e_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.18)$$

$$S_e \mapsto e_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.19)$$

Vidimo da ovakvo pridruživanje zadovoljava gornju relaciju pa je  $C^*(G_3)$  generirana sa  $\{e_{12}\}$ , tj.  $C^*(G_3)$  algebra je izomorfna sa  $M_2(\mathbb{C})$ .

Uzmimo četvrti graf sa Slike 3.1. i označimo ga sa  $G_4$ . Generatori su sljedeći:

$$P_{v_1} = P_{v_1}^2 = P_{v_1}^* \quad (3.20)$$

$$P_{v_2} = P_{v_2}^2 = P_{v_2}^* \quad (3.21)$$

$$P_{v_3} = P_{v_3}^2 = P_{v_3}^* \quad (3.22)$$

$$S_{e_1} \quad (3.23)$$

$$S_{e_2} \quad (3.24)$$

Relacije:

$$S_{e_1}^* S_{e_1} = P_{v_2} = S_{e_2} S_{e_2}^* \quad (3.25)$$

$$S_{e_2}^* S_{e_2} = P_{v_3} \quad (3.26)$$

Neka je  $e_{ij}$   $3 \times 3$  matrica koja na  $(i, j)$ -tom mjestu ima jedinicu, a svi ostali elementi su 0, za  $i, j \in \{1, 2, 3\}$ . Neka vrijedi sljedeće:

$$P_{v_1} \mapsto e_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.27)$$

$$P_{v_2} \mapsto e_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.28)$$

$$P_{v_3} \mapsto e_{33} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.29)$$

$$S_{e_1} \mapsto e_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.30)$$

$$S_{e_2} \mapsto e_{23} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.31)$$

Vidimo da ovakvo pridruživanje zadovoljava gornje relacije pa je  $C^*(G_4)$  generirana sa  $\{e_{12}, e_{23}\}$ , tj.  $C^*(G_4)$  algebra je izomorfna sa  $M_3(\mathbb{C})$ .

Općenito, može se pokazati da je  $C^*(S, P) = \overline{\text{span}}\{S_\mu S_\nu^*, \mu, \nu \in E^*, s(\mu) = s(\nu)\}$ , pri čemu je  $E^*$  skup svih puteva duljine  $1, 2, \dots, n$ , za  $n \in \mathbb{N}$ , te za svaki  $\mu \in E^n$ ,  $\mu = \mu_1 \mu_2 \dots \mu_n$ ,  $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n \in E^1 = E$  i  $S_\mu = S_{\mu_1} S_{\mu_2} \dots S_{\mu_n}$ .


**Definicija 3.3.6.** Neka je  $\Lambda$  2-graf. Tada se  $C^*(\Lambda)$  definira kao univerzalna  $C^*$ -algebra generirana familijom  $\{t_\lambda, \lambda \in \Lambda\}$  parcijalnih izometrija koje zadovoljavaju sljedeća svojstva:

- $\{t_v, v \in \Lambda^0 = V\}$  je skup ortogonalnih projekcija,
- $t_\lambda t_\mu = t_{\lambda\mu}$ , za sve  $\lambda, \mu \in \Lambda$  takve da ja  $s(\lambda) = r(\mu)$ ,
- $t_\lambda^* t_\lambda = t_{s(\lambda)}$ ,  $\forall \lambda \in \Lambda$ ,
- $t_v = \sum_{\lambda \in \Lambda^n(v)} t_\lambda t_\lambda^*$ ,  $\forall v \in \Lambda^0 = V$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}^2$ , pri čemu je  $\Lambda^n(v) = \{\lambda \in \Lambda^n : r(\lambda) = v\}$ .

Familiju  $\{t_\lambda, \lambda \in \Lambda\}$  parcijalnih izometrija koje zadovoljavaju gore navedena svojstva nazivamo Cuntz-Kriegerova  $\Lambda$ -familija. Cuntz-Kriegerova algebra  $C^*(\Lambda)$  je  $C^*$  algebra generirana Cuntz-Kriegerovom  $\Lambda$ -familijom  $\{s_\lambda, \lambda \in \Lambda\}$  koja je univerzalna u smislu da za svaku

Cuntz-Kriegerovu  $\Lambda$ -familiju  $\{t_\lambda, \lambda \in \Lambda\}$  postoji jedinstveni homomorfizam  $\Pi$  definiran na  $C^*(\Lambda)$  koji zadovoljava

$$\Pi(s_\lambda) = t_\lambda, \forall \lambda \in \Lambda. \quad (3.32)$$



Slika 3.2: Graf  $G$ ,  $C^*(G) = \mathcal{O}_2$

Neka je  $L$  univerzalne  $C^*$ -algebra generirana sa  $n$  generatora  $S_1, S_2, \dots, S_n$  koji zadovoljavaju sljedeće relacije:

$$S_1 S_1^* + S_2 S_2^* + \dots + S_n S_n^* = 1, \quad (3.33)$$

$$S_i^* S_1 = 1, \forall i. \quad (3.34)$$

Univerzalnu  $C^*$ -algebru koja zadovoljava relacije (3.33) i (3.34) zovemo *Cuntz algebra* i označavamo ju sa  $\mathcal{O}_n$  ( $n \geq 2$ ). Kao i za  $C^*(S, P)$ , pokazuje se da je

$$\mathcal{O}_n = \overline{\text{span}}\{s_\mu s_\nu^*, \mu, \nu \text{ putevi}\} \quad (3.35)$$

**Primjer 3.3.7.** Za graf  $G$  prikazan na Slici 3.2 vrijedi:

$$s_1^* s_1 = 1 = s_2^* s_2 \quad (3.36)$$

$$s_1 s_1^* + s_2 s_2^* = 1 \quad (3.37)$$

Primijetimo da možemo prepoznati neke podalgebre od  $\mathcal{O}_2$ . Npr, neka je  $F = C^*\{s_\mu s_\nu^*, |\mu| = |\nu| = 1\}$ . Sa Slike 3.2 vidimo da su  $s_1$  i  $s_2$  putevi duljine 1 pa su  $s_1 s_1^*, s_1 s_2^*, s_2 s_2^*, s_2 s_1^*$  elementi od  $F$ .

Neka vrijedi sljedeće:

$$s_1 s_1^* = e_{11} \quad (3.38)$$

$$s_1 s_2^* = e_{12} \quad (3.39)$$

$$s_2 s_2^* = e_{22} \quad (3.40)$$

$$s_2 s_1^* = e_{21}, \quad (3.41)$$

Tada je  $F \cong M_2(\mathbb{C})$ .

Lagano se provjeri da je  $F$  je podalgebra od  $O_2$  koristeći relacije (3.36) i (3.37), npr. uzmimo

$$s_1 s_2^* s_2 s_1^* = (s_2^* s_2 = 1) = s_1 s_1^*. \quad (3.42)$$

**Napomena 3.3.8.** Isto razmišljanje možemo primijeniti i na 2-grafove. Označimo skicu 2-grafa sa Slike 2.2 sa  $G$ . Tada je  $C^*(G) = O_{2,2}$ , pri čemu je  $O_{2,2}^{e_1} = \{a, b\}$ ,  $O_{2,2}^{e_2} = \{\alpha, \beta\}$ . Iz Definicije 3.3.6 i Primjera 2.1.9 slijedi da dobvamo 3 različite  $C^*$ -algebre.



# Bibliografija

- [1] A. Kumjian, D. Pask, *Higher rank graph  $C^*$ -algebras*, New York Journal of Mathematics, **6** (2000) 1-20.
- [2] D. G. Evans, *On Higher Rank Graph  $C^*$ -Algebras*, Ph. D. Thesis, School of Mathematics, Cardiff University, 2002.
- [3] M. Đuračić, *Induktivni sistemi  $C^*$ -algebri*, Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, 2011.

# Sažetak

U ovom diplomskom radu uveli smo pojam 2-grafa i konstruirali smo 2-graf pomoću određenih usmjerenih grafova te opisali osnovne pojmove i primjere vezane uz tu konstrukciju. Nadalje, definirali smo i naveli neke od jednostavnih primjera  $C^*$ -algebri. Zatim smo uveli pojam  $C^*$ -algebre grafova te vidjeli vezu između te algebre i 2-grafa.

# Summary

In this thesis we have introduced the term 2-graph, we have constructed a 2-graph by certain directed graphs and described the basic terms and examples regarding the 2-graph construction. Furthermore, we have defined and induced some simple examples of  $C^*$  - algebra. Afterwards, we introduced the term  $C^*$ -algebra of a graph and noticed a connection between that algebra and 2-graph.

# Životopis

Moje ime je Antonija Perlić. Rođena sam 18.11.1991. u Zagrebu. Živim u Zagrebu, gdje sam stekla osnovno i srednješkolsko obrazovanje. Završila sam opću gimnaziju sa odličnim uspjehom, te se nakon toga, 2010. godine, upisala na sveučilišni prediplomski studij Matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Tamo sam 2014. godine, nakon završenog prediplomskog studija, na kojem sam stekla titulu prvostupnice matematike, upisala diplomski studij Matematičke statistike.