

# Catalanovi brojevi

---

**Babić, Jelena**

**Master's thesis / Diplomski rad**

**2016**

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:* **University of Zagreb, Faculty of Science / Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet**

*Permanent link / Trajna poveznica:* <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:217:965809>

*Rights / Prava:* [In copyright](#)/[Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja:* **2025-03-14**



*Repository / Repozitorij:*

[Repository of the Faculty of Science - University of Zagreb](#)



**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU**  
**PRIRODOSLOVNO–MATEMATIČKI FAKULTET**  
**MATEMATIČKI ODSJEK**

Jelena Babić

**CATALANOVI BROJEVI**

Diplomski rad

Voditelj rada:  
Prof.dr.sc. Dragutin Svrtnan

Zagreb, veljača, 2016.

Ovaj diplomski rad obranjen je dana \_\_\_\_\_ pred ispitnim povjerenstvom u sastavu:

1. \_\_\_\_\_, predsjednik
2. \_\_\_\_\_, član
3. \_\_\_\_\_, član

Povjerenstvo je rad ocijenilo ocjenom \_\_\_\_\_.

Potpisi članova povjerenstva:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

*Svojim roditeljima*

# Sadržaj

<b>Sadržaj</b>	<b>iv</b>
<b>Uvod</b>	<b>1</b>
<b>1 Eugène Charles Catalan</b>	<b>2</b>
<b>2 Fundamentalne interpretacije Catalanovih brojeva</b>	<b>4</b>
2.1 Putovi u cjelobrojnoj mreži . . . . .	4
2.2 Problem zagrada . . . . .	5
2.3 Problem binarnih stabala . . . . .	6
2.4 Triangulacija konveksnog n-terokuta . . . . .	7
2.5 Dyckovi planinski putovi . . . . .	8
2.6 Bertrandov problem glasovanja . . . . .	9
<b>3 Svojstva Catalanovih brojeva</b>	<b>11</b>
3.1 Funkcija izvodnica za Catalanove brojeve . . . . .	13
3.2 Eksplicitna formula Catalanovih brojeva . . . . .	14
<b>4 Primjeri nekih kombinatornih interpretacija Catalanovih brojeva</b>	<b>16</b>
<b>Bibliografija</b>	<b>21</b>

# Uvod

Catalanovi brojevi se vjerojatno jedni od brojeva koje najčešće susrećemo u matematici. Catalanovi brojevi tvore niz prirodnih brojeva koji se javljaju pri prebrojavanju zapanjujuće mnogo kombinatornih objekata. Ime su dobili po belgijskom matematičaru Eugène Charles Catalanu (1814–1894), iako ih nije on prvi otkrio. Na Catalanove brojeve prvi su naišli Leonhard Euler (1703.-1783.) i Johann Andreas von Segner (1704.-1777.), gotovo čitavo stoljeće prije Catalana. Proučavajući problem triangulacije konveksnog  $n$ -terokuta, Segner je postavio rekurzivnu relaciju, a Euler prvi uspješno riješio i 1760. godine došao do općeg izraza za broj triangulacija. Ipak, u čast Catalanu, koji je izveo i dokazao mnoga svojstva i identitete ovih brojeva, oni se danas zovu njegovim imenom. Catalanovi brojevi javljaju se u mnoštvu naizgled nepovezanih kombinatornih problema. Malo je poznato da je ove brojevi potpuno neovisno otkrio kineski matematičar Ming An-Tu (1692.-1763.) tijekom 1730-ih godina, no njegovi radovi ostali su nepoznati zapadnom svijetu sve do 1839. godine. Catalanovi brojevi često su definirani kao

$$C_n = \frac{2n!}{(n+1)!n!} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}, \quad n \geq 0. \quad (1)$$

te lako možemo izračunati prvih nekoliko članova niza. Prvih 10 članova prikazani su u tablici.

$n$	$C_n$	$n$	$C_n$
1	1	6	132
2	2	7	429
3	5	8	1430
4	14	9	4862
5	42	10	16796

Catalanovi brojevi, osim što se pojavljuju kao niz u mnogim područjima kombinatornih objekata, kao što su particije poligona na trokute, binarno sastavljanje zagrada  $(n+1)$ -članih izraza, šetnja po cjelobrojnoj mreži, Dyckovi putevi, problem binarnih stabala, također se pojavljuju na mnogim neočekivanim mjestima.

# Poglavlje 1

## Eugène Charles Catalan

Eugène Charles Catalan bio je francuski i belgijski matematičar. Rođen je 30. svibnja 1814. godine u belgijskom gradu Brugesu koji je tada bio dio Francuske te se i on sam cijeli život smatrao Francuzom. Eugènova majka, Jeanne Bardin, tada je imala tek 17 godina, a pošto se nije znalo tko je otac, Eugène je nosio majčino prezime te su živjeli kod njezinih roditelja. Kada je Eugène imao 6 godina on i majka su se preselili u Brusseles, gdje je ona upoznala draguljara Joseph Victor Etienne Catalana. Par se vjenčao sljedeće godine, a godinu potom su se preselili u francuski grad Lille. Tamo su se zadržali 3 godine, nakon čega su se preselili u Pariz kojim je Eugène bio očaran. Iako još uvijek vrlo mlad već tada je pokazivao veliku zainteresiranost za politiku i protivio se monarhiji što će obilježiti cijeli njegov život i karijeru. Ubrzo nakon preseljenja u Pariz umrla mu je majka te je nastavio živjeti s očuhom i maćehom.

Eugène je pohađao školu Ecole Royale Gratuite de Dessin et de Mathematiques en Faveur des Arts Mecaniques gdje je, zbog svojeg isticanja znanjem, izabran da predaje geometriju svojim vršnjacima. Nakon škole upisao je sveučilište Ecole Polytechnique gdje je studirao matematiku i francusku povijest i književnost. Studenti tog sveučilišta su bili vrlo politički aktivni, te su predvodili ustanak protiv vlasti koji je brutalno ugušen od strane vojske. Zbog toga je cijela njegova generacija, uključujući i Eugèna, izbačena sa sveučilišta, te su, da bi se mogli vratiti, morali pismeno ispričati.

Nakon završetka studija 1835. godine dobio je posao profesora na sveučilištu Ecole des Arts et Metiers at Chalons-sur-Marne. Godinu poslije oženio je Charlotte Augustine Renee Perin (poznatiju kao Eugènie), koja je bila dvije godine starija od njega i s kojom je proveo ostatak života. Eugènov sveučilišni profesor Joseph Liouville je pokrenuo matematički časopis Journal de Mathematiques Pures et Appliquees gdje je Eugène objavio svoje prve članke. U članku Note sur une Equation aux differences finies, objavljenom 1838. godine, prvi puta iznosi svoje rješenje triangulacije konveksnog n-terokuta. Eugène je bio odlučan u namjeri da nađe posao u Parizu te se prijavljivao na mnoge natječaje u školama i na

sveučilištima, ali bez uspjeha. Nakon svih razočaranja ponovo se obratio profesoru Liuvilleu te su zajedno osnovali školu École Sainte-Barbe, koja je služila učenicima kao priprema za upis na cijenjenu sveučilište École Polytechnique. Kasnije te godine dobio je posao asistenta na tom sveučilištu, a već sljedeće godine napredovao je na poziciju istraživača. Za to vrijeme Eugène se dodatno obrazovao što je rezultiralo završenim doktoratom iz matematike 1841. godine. Godine 1843. u časopisu *Journal für die reine und angewandte Mathematik* po prvi puta je objavljena njegova slutnja (poznata danas kao Catalanova slutnja) koju u tom trenutku nije znao dokazati: Dva pozitivna cijela broja, osim 8 i 9, ne mogu biti uzastopne potencije. Odnosno, jednadžba s cijelobrojnim rješenjima  $x^m - y^n = 1$  ima jedinstveno rješenje. Sljedećih godina doživljavao je razočaranje za razočaranjem jer zbog svojih političkih stavova nije mogao napredovati, iako je bio najsposobniji kandidat na nekoliko natječaja. Kada se 1848. godine dogodila pobuna i na vlast došao Louis-Napoleon Bonaparte mislilo se kako će stvari krenuti na bolje, ali uskoro je Napoleon pokazao pravo lice i proglasio se carem. Eugène je javno izrazio svoje nezadovoljstvo i odbio potpisati zakletvu odanosti što je rezultiralo time da je 1852. dobio otkaz te je u narednim godinama bio bez stalnog zaposlenja. Nakon što je bio bez posla 13 godina napokon je dobio mjesto profesora na sveučilištu u Liègeu i na toj poziciji je ostao sve do 1884. i svog umirovljenja. Za vrijeme života u Liègeu dobio je mnoga priznanja i bio primljen u razna visoka matematička društva, ali nikada nije primljen u cijenjenu Académie des Sciences, za čime je žudio cijeli život. Umro je 14. veljače 1894. godine od posljedica pneumoije.




## Poglavlje 2

# Fundamentalne interpretacije Catalanovih brojeva

### 2.1 Putovi u cjelobrojnoj mreži

Jedan od poznatijih problema uz kojeg se vežu Catalanovi brojevi je šetnja po cjelobrojnoj mreži. Cjelobrojna mreža ili diskretna rešetka sastoji se od pravaca kroz cjelobrojne točke, koji su usporedni s koordinatnim osima u Kartezijevom koordinatnom sustavu. Za ovaj primjer uvodimo restrikciju na mrežu veličine  $n \times n$  te se pitamo koliko ima različitih najkraćih putova u ovakvoj cjelobrojnoj mreži koji nikad ne prelaze dijagonalu, odnosno putevi u kojima se krećemo samo gore i desno, počevši od donjeg lijevog kuta pa do desnog gornjeg kuta.



Slika 2.1: Putovi u cjelobrojnoj mreži 4 x 4

## POGLAVLJE 2. FUNDAMENTALNE INTERPRETACIJE CATALANOVIH BROJEVA

Kako bi dobili eksplicitnu formulu za  $n$ -ti Catalanov broj pokušat ćemo direktno prebrojiti sve puteve koji zadovoljavaju već navedene uvjete. Prvo ćemo prebrojiti sve puteve kroz cjelobrojnu mrežu do točke  $(n, n)$  i od tog broja oduzmemo broj putova koji sjeku dijagonalu.

Svaki cjelobrojni put možemo prezentirati kao određen redoslijed vektora pomaka udesno  $(1, 0)$  i vektora pomaka prema gore  $(0, 1)$ . Izbor pozicija prema gore (od ukuno  $2n$  pomaka) jednoznačno određuju put u cjelobrojnoj mreži jer preostale pozicije predstavljaju pomake udesno. Pomake prema gore možemo rasporediti na  $\binom{2n}{n}$  načina.

Nakon što smo prebrojali sve puteve kroz cjelobrojnu mrežu do točke  $(n, n)$ , trebamo izbrojati puteve koji sjeku dijagonalu. Promotrimo prvu točku koja se nalazi na nedozvoljenom putu (putu koji sječe dijagonalu) s krive strane dijagonale. Nakon te točke preslikavamo put tako da svaki pomak udesno zamijenimo pomakom prema gore i obrnuto. Budući da smo došli jedno polje iznad dijagonale, dosad smo učinili  $k$  pomaka prema desno i  $k + 1$  prema gore. Preostalo nam je  $n - k$  pomaka desno i  $n - k - 1$  pomaka gore da bismo došli do  $(n, n)$ . Reflektiranjem puta zamjenjuju se brojevi preostalih pomaka pa će takva modificirana staza imati  $k + (n - k - 1) = n - 1$  pomaka udesno i  $(k + 1) + (n - k) = n + 1$  prema gore, dakle doći ćemo do točke  $(n - 1, n + 1)$ . Svaki nedozvoljen put možemo tako modificirati na jedinstven način. Uočimo i da svaki najkraći put u cjelobrojnoj mreži od  $(0, 0)$  do  $(n - 1, n + 1)$  možemo preinačiti u točno jedan nedozvoljen put od  $(0, 0)$  do  $(n, n)$ , reflektirajući ga na isti način čim prijeđe originalnu dijagonalu. Time smo uspostavili bijekciju između skupa svih najkraćih putova koji sijeku dijagonalu i skupa svih najkraćih putova u cjelobrojnoj mreži do točke  $(n - 1, n + 1)$ , kojih ima  $\binom{2n}{n+1}$ . Stoga je  $n$ -ti Catalanov broj jednak:

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

### 2.2 Problem zagrada

Postavlja se pitanje na koliko načina možemo u nizu rasporedit  $2n$  zagrada (odnosno  $n$  parova zagrada) tako da brojeći s lijeva, niti u jednom trenutku nemamo više zatvorenih nego otvorenih zagrada.

Problem možemo gledati i kao množenje  $n + 1$  brojeva napisanih jedan za drugim. Naime, mi znamo množiti samo dva broja i prema zakonu asocijativnosti dobivamo isti rezultat ako parom zagrada zagravimo svako množenje. Problem je naći ukupni broj takvih zagrađivanja. Za  $n = 2$  imamo tri broja i samo dva načina zagrađivanja  $(x_1 x_2) x_3 = x_1 (x_2 x_3)$ . Za  $n = 3$  imamo 4 broja i pet načina zagrađivanja  $(x_1 x_2)(x_3 x_4) = ((x_1 x_2) x_3) x_4 = (x_1 (x_2 x_3)) x_4 = x_1 ((x_2 x_3) x_4) = x_1 (x_2 (x_3 x_4))$ , itd. Ovo je pitanje ekvivalentno tome koliko bi najviše rezultata dobili s neasocijativnim množenjem  $n + 1$  varijabli. Kako bi pokazali da problem zagrada zadovoljava  $n$ -ti Catalanov broj promotrimo prvo problem zagrada za  $n$

brojeva  $x_1x_2\dots x_n$ . Da pomozimo te brojeve uvijek imamo jedno završno množenje prvih  $k$  brojeva  $x_1x_2\dots x_k$  i zadnjih  $n - k$  brojeva  $x_{k+1}x_{k+2}\dots x_n$ , za neki  $k = 1, 2, \dots, n - 1$ . Na primjer za  $n = 7$  i  $k = 4$ , u zagrađivanju  $(x_1(x_2(x_3x_4))) \cdot ((x_5x_6)x_7)$  završno je množenje prvih 4 i zadnjih 3 broja. Prvih  $k$  brojeva možemo pomnožiti na  $Z_k$  načina, a zadnjih  $n - k$  brojeva na  $Z_{n-k}$  načina, pa stoga za čvrsti  $k$  čitav produkt na  $Z_kZ_{n-k}$  načina. Prem pravilu sume, kad  $k$  ide od 1 do  $n - 1$  dobivamo


$$Z_n = Z_1Z_{n-1} + Z_2Z_{n-2} + \dots + Z_{n-2}Z_2 + Z_{n-1}Z_1$$

odnosno s pomakom indeksa za 1

$$Z_{n+1} = Z_1Z_n + Z_2Z_{n-1} + \dots + Z_{n-1}Z_2 + Z_nZ_1$$

### 2.3 Problem binarnih stabala

Stablo je povezani graf bez ciklusa. Binarna stabla precizno se definiraju induktivno, tj. rekurzivno ovako. Binarno stablo je ili prazno ili se sastoji od jednog istaknutog vrha koji se zove korijen i uređenog para binarnih stabala koji se zovu lijevo i desno podstablo. Problem je da se izračuna broj  $B_n$  binarnih stabala s  $n$  vrhova.



Slika 2.2: Binarna stabla

Iz definicije binarnog stabla slijedi da je za  $n \geq 1$  broj  $B_n$  binarnih stabala s  $n$  vrhova jednak broju urešenih parova  $(B, B')$  binarnih stabala s ukupno  $n - 1$  vrhova, od kojih  $B$

## POGLAVLJE 2. FUNDAMENTALNE INTERPRETACIJE CATALANOVIH BROJEVA


ima, recimo,  $k$  vrhova,  $B'$  ostalih  $n - k + 1$  vrhova,  $k = 0, 1, \dots, n - 1$ . Opet iz pravila sume i produkta slijedi

$$B_n = B_0B_{n-1} + B_1B_{n-2} + \dots + B_{n-2}B_1 + B_{n-1}B_0$$

### 2.4 Triangulacija konveksnog n-terokuta


Ovaj povijesno najstariji problem doveo je do otkrića Catalanovih brojeva. Promatramo broj načina (označimo ih s  $T_n$ ) na koje je moguća maksimalna dekompozicija konveksnog  $n$ -terokuta na  $n-2$  trokuta. Da bi smo  $n$ -terokut triangulirali potrebno je povući  $n-3$  dijagonale koje se ne smiju sijeći.

Problem razmatramo induktivno pa počinjemo sa trokutom. S obzirom da je on trianguliran postoji samo jedan način triangulacije pa je stoga  $T_3 = 1$ . Za konveksan četverokut moramo povući jednu dijagonalu. To možemo učiniti na dva načina pa je  $T_4 = 2$ . Za peterokut postoji 5 načina triangulacije, znači  $T_5 = 5$ . Sad nađimo opće rješenje za trian-



Slika 2.3: Svi načini triangulacije šesterokuta

gulaciju  $n$ -terokuta  $T_n$ . Možemo primjetiti da je svaka stranica  $n$ -terokuta dio točno jednog trokuta triangulacije. Kako bi prebrojili sve načine triangulacije prvo fiksiramo jednu od stranica te brojimo triangulacije u kojima sudjeluje svaki od trokuta podignutih nad tom stranicom. Za  $k$ -tu točku kao vrh trokuta, zdesna je ostao  $(n - k + 1)$ -terokut, koji možemo triangulirati na  $T_{n-k+1}$  načina, a s lijeva  $k$ -terokut koji možemo triangulirati na  $T_k$  načina (vidi sliku 2.3.). Pritom podrazumijevamo da je  $T_2 = 1$ .



Slika 2.4: Fiksiramo jednu stranicu i nad njom konstruiramo trokute

Kako su izbori triangulacije izdvojenih mnogokuta međusobo neovisni, vrijedi kombinatorni princip produkta, te je za proizvoljnu točku  $k$  taj broj jednak  $T_k T_{n-k+1}$ . Izbor te točke također možemo učiniti na više neovisnih načina pa ostaje samo sumirati po svim vrijednostima za  $k$ . Konačno smo dobili:

$$T_n = \sum_{k=2}^{n-1} T_k T_{n-k+1}$$

odnosno s pomakom indeksa za 2 dobivamo

$$T_{n+2} = \sum_{k=2}^{n+1} T_k T_{n-k+3}$$

## 2.5 Dyckovi planinski putovi

Problem Dyckovih planinskih putova sastoji se od pronalaženja svih mogućih konfiguracija planinskih lanaca koji se sastoje od točno  $n$  uspona i  $n$  spustova, uz pretpostavku da se oni uvijek nalaze iznad početne razine puta. Ako je  $n=0$  očito je moguća samo jedna konfiguracija, za  $n=1$  isto tako postoji samo jedna konfiguracija. Za  $n=2$  moguće je napraviti dvije, te za  $n=3$  pet različitih konfiguracija.

Problem Dyckovih planinskih putova možemo povezati s problemom zgrađivanja i to tako da svaku otvorenu zgradu zamjenimo usponom, a zatvorenu padom. Također problem zgrađivanja možemo zapisati u obliku odgovarajućeg problema Dyckovih planinskih putova.

$n = 0$ :	*	1 way
$n = 1$ :	$\wedge$	1 way
$n = 2$ :	$\wedge\wedge, \wedge \searrow$	2 ways
$n = 3$ :	$\wedge\wedge\wedge, \wedge\wedge \searrow, \wedge \searrow\wedge, \wedge \searrow\wedge \searrow, \wedge \searrow\wedge \wedge$	5 ways

Mountain Ranges

[h]

Slika 2.5: Dyckovi putovi

## 2.6 Bertrandov problem glasovanja

Treba izračunati broj nizova  $(i_1, i_2, \dots, i_{2n}), i_k \in \{-1, 1\}$ , tako da svaka parcijalna suma  $i_1 + i_2 + \dots + i_k \geq 0$ , a ukupno  $i_1 + i_2 + \dots + i_{2n} = 0$ . Interpretacija je ova. Na nekim predsjedničkim izborima, dva su kandidata A i B, glasuje  $2n$  ljudi. Svaki glas A bilježimo s 1, a za B s -1. Na koliko načina možemo prebrojiti rezultate glasovanja, tako da B nikad nema više glasova od A, a koačan je rezultat ipak nerješen?

Ovaj problem podsjeća na ostale već navedene, te će njihove povezanosti biti pokazane u idućem teoremu.

**Teorem 2.6.1.** *Catalanov broj  $C_n$  jednak je:*

- (i) *Broju triangulacija  $T_{n+2}$  konveksnog poligona sa  $n+2$  vrhova*
- (ii) *Problemu zagrada  $Z_{n+1}$  kod množenja  $n+1$  brojeva*
- (iii) *Broju binarnih stabala  $B_n$  s  $n$  vrhova*
- (iv) *Broju ispod dijagonalnih putova  $P_n$  u cjelobrojnoj mreži*
- (v) *Broju Dyckovih putova  $D_n$*
- (vi) *Bertrandovom problemu glasovanja  $G_n$*

*Dokaz.* Pogledavši rekurzije za broj triangulacija konveksnog poligona, broj binarnih stabala i broj zagrađivanja uočavamo da su one iste (do na pomak indeksa), a početni uvjeti za

## POGLAVLJE 2. FUNDAMENTALNE INTERPRETACIJE CATALANOVIH BROJEVA

$T_{n+2}$ ,  $Z_{n+1}$  i  $B_n$  su također isti. Zato je  $T_{n+2} = Z_{n+1} = B_n$

Pokažimo sad da je  $G_n = D_n$ . To slijedi odmah iz toga što svakom nizu  $(i_1, i_2, \dots, i_{2n})$  iz definicije  $G_n$  pridružimo Dyckov put s koracima redom  $(1, i_1), (1, i_2), \dots, (1, i_{2n})$ . To je bijekcija, jer mu je inverz ovo: svakom usponu  $\nearrow$  pridružimo 1, a svakom silasku  $\searrow$  pridružimo -1. Da bi vidjeli da je  $D_n = P_n$ , treba samo okrenuti sliku Dyckovog puta za  $45^\circ$  tako, da os x prijeđe u os  $y=x$ , čime se dobije odgovarajući put u cjelobrojnoj mreži.

Pokažimo još da je  $Z_{n+1} = G_n$ . Svakom zagrađivanju produkta  $x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_{n+1}$  pridružimo niz  $(i_1, i_2, \dots, i_{2n})$  ovako. Prvo, s jednim ekstra parom zagrada zatvorimo završno množenje. Na taj način imamo n parova zagrada koje odgovaraju n sukcesivnim množenjima. Sada svako množenje zamjenimo brojem 1, a svaku desnu zagradu zamjenimo brojem -1 i sve ostalo izbrišemo. Ovaj se algoritam na očit način može obrnuti, čime smo dobili bijekciju. Da je  $P_n = C_n$  već smo pokazali objašnjavajući problem putova u cjelobrojnoj mreži. Time smo pokazali sve jednakosti iz čega slijedi tvrdnja teorema.  $\square$

## Poglavlje 3

# Svojstva Catalanovih brojeva

Alternativan izraz za Catalanove brojeve je:

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}, \quad n \geq 0.$$

Uzimajući u obzir navedenu formulu pokažimo da su Catalanovi brojevi cijeli brojevi. Prvo ćemo dokazati Hermite-ov teorem.

**Teorem 3.0.2.** (Hermite) *Neka je  $m, n \leq 1$ . Tada vrijedi:*

$$\frac{m}{(m, n)} \mid \binom{m}{n} \tag{3.1}$$

$$\frac{m-n+1}{(m+1, n)} \mid \binom{m}{n} \tag{3.2}$$

gdje je  $(a, b)$  najveći zajednički djelitelj (NZD) pozitivnih brojeva  $a$  i  $b$ .

*Dokaz.* Neka je  $d = (m, n)$ . Tada postoje cijeli brojevi  $x$  i  $y$  takvi da vrijedi  $d = xm + yn$ , štoviše  $d = \min(xm + yn : x, y \in \mathbb{Z} \cap \mathbb{N})$ . Neka je  $l$  najmanji pozitivni član skupa  $S = xm + yn : x, y \in \mathbb{Z}$ . To znači da postoje cijeli brojevi  $x_0$  i  $y_0$  takvi da je  $l = mx_0 + ny_0$ . Pokažimo da  $l \mid m$  i  $l \mid n$ . Pretpostavimo da npr.  $l \nmid m$ . Tada postoje cijeli brojevi  $q$  i  $r$  takvi da je  $m = lq + r$ , i  $0 < r < l$ . Sada je  $r = m - lq = m - q(mx_0 + ny_0) = m(1 - qx_0) + n(-qy_0) \in S$  što je u suprotnosti s minimalnošću od  $l$ . Dakle,  $l \mid m$ . Na isti način se dokazuje da  $l \mid n$ . Budući da je  $d = (m, n)$ , postoje  $\gamma, \beta \in \mathbb{Z}$  takvi da je  $m = d\beta$  i  $n = d\gamma$ , pa je  $l = mx_0 + ny_0 = d(\beta x_0 + \gamma y_0)$ . Odavde slijedi da je  $d \leq l$ , pa smo dokazali da je  $d = l$ . Pomnožimo sada obje strane jednakosti  $d = xm + yn$  s  $\binom{m}{n}$ . Dobivamo

$$d \binom{m}{n} = xm \binom{m}{n} + yn \binom{m}{n}$$



$$= m \left[ x \binom{m}{n} + y \binom{m-1}{n-1} \right]$$

$$= mz, z \in \mathbb{Z}$$

Dobili smo da vrijedi  $\frac{m}{d} \binom{m}{n}$ , odnosno,  $\frac{m}{(m,n)} \binom{m}{n}$ , pa je tvrdnja (3.1) dokazana.

Dokažimo sada drugu tvrdnju. Neka je  $d = (m+1, n)$ . Kao i gore, postoje cijeli brojevi  $P$  i  $Q$  takvi da je

$$d = P(m+1) + Qn$$

$$= (m-n+1)P + n(P+Q)$$

$$d \cdot \frac{m!}{n!(m-n+1)!} = \binom{m}{n} P + \binom{m}{n-1} (P+Q)$$

$$= R$$

$$d \binom{m}{n} = (m-n+1)R$$

Dakle vrijedi

$$\frac{m-n+1}{d} \binom{m}{n}$$

odnosno

$$\frac{m-n+1}{m+1, n} \binom{m}{n}$$

□

Sada možemo pokazati korolar koji pokazuje da su Catalanovi brojevi cijeli brojevi

**Korolar 3.0.3.** 1. Binomni koeficijent  $\binom{2n}{n}$  je paran cijeli broj, za  $n \geq 1$

2. Neka je  $p$  prost broj. Tada je  $\binom{p}{r} \equiv 0 \pmod{p}$ , za  $1 \leq r \leq p-1$

3.  $n+1 \mid \binom{2n}{n}$

*Dokaz.* 1. Iz svojstva (3.1) direktno slijedi da je  $\binom{2n}{n}$  paran broj.

2. Jer je  $1 \leq r \leq p-1$  te  $p$  prost, vrijedi  $\binom{p}{r} = 1$ . Ponovno, iz svojstva (3.1) slijedi  $p \mid \binom{p}{r}$ , odnosno  $\binom{p}{r} \equiv 0 \pmod{p}$ .

3. U (3.2) stavimo  $m = 2n$ . Kako je  $(2n+1, n) = 1$  to vrijedi  $(n+1) \mid \binom{2n}{n}$

□

### 3.1 Funkcija izvodnica za Catalanove brojeve

Općenito, funkcija izvodnica je formalni red potencija čiji su koeficijenti članovi nekog brojevnog niza.

Spomenimo sad jedan aspekt funkcija izvodnica, naime binomni teorem za proizvoljni eksponent. Kada je  $a$  proizvoljan kompleksni broj, a  $k \in \mathbb{N}$ , onda definiramo binomni koeficijent kao:

$$\binom{a}{k} = \frac{a(a-1)\dots(a-k+1)}{k!}$$

Poopćeni binomni teorem kaže:

$$(1+x)^a = \sum_{n \geq 0} \binom{a}{n} x^n$$

Ova formula je samo formula za Taylor-ov red  $(1+x)^a$  za  $x=0$ .

Pretpostavljamo da je funkcija izvodnica opisana u gornjoj jednadžbi "obični" identitet. U ovom slučaju konvergenciju ignoriramo.

**Propozicija 3.1.1.** *Neka je  $C(x)$  funkcija izvodnica za Catalanove brojeve*

$$C(x) = \sum_{n \geq 0} C_n x^n = 1 + x + 2x^2 + 5x^3 + 14x^4 + 42x^5 + 132x^6 + 429x^7 + 1430x^8 + \dots$$

Tada je:

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}$$

*Dokaz.* Množeći jednakost  $C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}$ ,  $C_0 = 1$  sa  $x^n$  i sumirajući po  $n \geq 0$  s lijeva dobivamo:

$$\sum_{n \geq 0} C_{n+1} x^n = \frac{C(x) - 1}{x}$$

Budući da je koeficijent od  $x^n$  u  $C(x)^2$  jednak  $\sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}$  s desne strane imamo  $C(x)^2$ .

Imamo

$$\frac{C(x) - 1}{x} = C(x)^2$$

ili

$$xC(x)^2 - C(x) + 1 = 0$$

Rješavajući kvadratnu jednadžbu za  $C(x)$  dobivamo

$$C(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}$$

Moramo odrediti točan predznak. Sada, uz pomoć binomnog teorem za eksponent  $1/2$

$$\sqrt{1 - 4x} = 1 - 2x + \dots$$

Ako uzmemo pozitivan predznak dobivamo

$$\frac{1 + (1 - 2x + \dots)}{2x} = \frac{1}{x} - 1 + \dots$$

što nije ispravno. Znači moramo uzeti negativan predznak.

$$\frac{1 - (1 - 2x + \dots)}{2x} = 1 + \dots$$

□

## 3.2 Eksplicitna formula Catalanovih brojeva

Uz pomoć funkcije izvodnice jednostavno je naći formulu za  $C_n$

**Teorem 3.2.1.** *Vrijedi:*

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{n!(n+1)!}$$

*Dokaz.* Imamo

$$\sqrt{1 - 4x} = (1 - 4x)^{1/2} = \sum_{n \geq 0} \binom{1/2}{n} (-4x)^n$$

Prema propoziciji 3.1.1.

$$\begin{aligned} C(x) &= \frac{1}{2x} \left( 1 - \sum_{n \geq 0} \binom{1/2}{n} (-4x)^n \right) \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{n \geq 0} \binom{1/2}{n+1} (-4)^{n+1} x^n \end{aligned}$$

Izjednačavajući koeficijente uz  $x^n$  sa obe strane dobivamo

$$C_n = -\frac{1}{2} \binom{1/2}{n+1} (-4)^{n+1}$$

Lako se raspiše desna strana jednakosti i uočava da je jedanka  $\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ .

□

Formula  $\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$  je standardna eksplicitna formula za zapisivanje  $C_n$ . Postoji ekvivalentna formula koja je ponekad zgodnija:

$$C_n = \frac{1}{2n+1} \binom{2n+1}{n}$$

Također možemo koristiti i formulu


$$C_n = \frac{1}{n} \binom{2n}{n-1}$$

## Poglavlje 4

# Primjeri nekih kombinatornih interpretacija Catalanovih brojeva


Pokažimo još neke primjere pojavljivanja Catalanovih brojeva.

**Primjer 4.0.2.** Broj triangulacija konveksnih  $(n+2)$ -terokuta u  $n$  trokuta sa  $n - 1$  dijagonalom koje se ne sjeku unutar  $(n+2)$ -terokuta.




Tvrdnja primjera izravno slijedi iz teorema 2.6.1

**Primjer 4.0.3.** Broj binarnih stabala s  $n$  unutarnjih vrhova takvih da svaki vrh ima najviše dvoje djece i svako lijevo dijete s dvoje djece je unutarnji vrh jednak je Catalanovom broj  $C_n$ .



Kako bi pokazali da navedena tvrdnja vrijedi prvo obilazimo stablo u preduređaju. Zamjenimo brid preko kojeg prolazimo po prvi put (od korijena) sa 1, sa -1 ako njegov vrh koji je udaljeniji od korijena nema djece, zamjenimo sa 1 ako ima lijevo dijete, a sa -1 ako ima desno dijete. Na taj način pokazali smo bijekciju između ovog problema i Bertrandovog problema glasovanja, iz čega je jasno da je broj binarnih stabala koja zadovoljavaju gornje uvjete jednak Catalanovom broju  $C_n$ .

**Primjer 4.0.4.** Broj Dyckovih puteva duljine  $2n$  jednak je broju putova u cjelobrojnoj mreži od  $(0,0)$  do  $(2n,0)$  sa koracima  $(1,1)$  i  $(1,-1)$ , koji nikad ne idu ispod  $x$ -osi.



Dokaz ove tvrdnje već smo pokazali u teoremu 2.6.1., te ćemo ovu tvrdnju koristiti u dokazima sljedećih primjera.



**Primjer 4.0.6.**  $n$ -člani multiskupovi na  $\mathbb{Z}/(n+1)\mathbb{Z}$  čija je suma jednaka 0.

000 013 022 112 233

Ukupan broj  $n$ -članih multiskupova na  $\mathbb{Z}/(n+1)\mathbb{Z}$  je  $\binom{2n}{n}$ . Kažemo da su dva multiskupa  $M$  i  $N$  jednaki ako za proizvoljni  $k \in \mathbb{Z}/(n+1)\mathbb{Z}$  imamo  $M = \{a_1, \dots, a_n\}$  i  $N = \{a_1 + k, \dots, a_n + k\}$ . Definirali smo relaciju ekvivalencije u kojoj svaka klasa ekvivalencije sadrži  $n+1$  element, točno jedan čija suma elementa teži u 0. Stoga je broj multiskupova sa elementima čija suma teži u 0 (ili bilo koji drugi fiksni element iz  $\mathbb{Z}/(n+1)\mathbb{Z}$ ) jednaka  $\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ .

**Primjer 4.0.7.** Nizovi pozitivnih cijelih brojeva  $a_1, a_2, \dots, a_{n+2}$  za koje postoji polje cijelih brojeva (nužno sa  $n+1$  redova)

$$\begin{array}{cccccccccccc}
 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & & 1 & 1 & \dots & 1 & & 1 \\
 & a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_{n+2} & & a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & \\
 & & b_1 & b_2 & b_3 & \dots & b_{n+2} & & b_1 & \dots & b_{n-2} & \\
 & & & & & \vdots & & & & & & \\
 & & & r_1 & r_2 & r_3 & \dots & r_{n+2} & & r_1 & & \\
 & & & & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & & & 
 \end{array}$$

takvih da svaka četiri susjedna člana konfiguracije  $st$  zadovoljavaju jednakost  $st = ru + 1$ . Primjer takvog polja za  $(a_1, \dots, a_8) = (1, 3, 2, 1, 5, 1, 2, 3)$ , koje je nužno jedinstveno prikazano je na slici.

$$\begin{array}{cccccccccccc}
 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 & 1 & 3 & 2 & 1 & 5 & 1 & 2 & 3 & 1 & 3 & 2 & 1 & 5 \\
 & & 2 & 5 & 1 & 4 & 4 & 1 & 5 & 2 & 2 & 5 & 1 & 4 \\
 & & & 3 & 2 & 3 & 3 & 3 & 2 & 3 & 3 & 3 & 2 & 3 \\
 & & & & 1 & 5 & 2 & 2 & 5 & 1 & 4 & 4 & 1 & 5 \\
 & & & & & 2 & 3 & 1 & 3 & 2 & 1 & 5 & 1 & 2 \\
 & & & & & & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1
 \end{array}$$



Neka je  $P$  konveksni  $(n+2)$ -terokut sa vrhovima  $v_1, v_2, \dots, v_{n+2}$  u smjeru kazaljke na satu. Neka je  $T$  triangulacija od  $P$  prikazana kao u primjeru 4.0.1, te neka je  $a_i$  broj trokuta iznad  $v_i$ . Tada preslikavanje  $T \mapsto (a_1, a_2, \dots, a_{n+2})$  uspostavlja bijekciju sa primjerom 4.0.1.

# Bibliografija

- [1] Richard P. Stanley, *Enumerative Combinatorics, Volume 1*, 2nd edition, 2011.
- [2] Darko Veljan *Kombinatorna i diskretna matematika*, Algoritam, prvo izdanje 2001.
- [3] Richard P. Stanley, *Catalan Numbers*, Cambridge University Press 2015.
- [4] Wikipedia, *Catalan Numbers*, 2016., [https://en.wikipedia.org/wiki/Catalan number](https://en.wikipedia.org/wiki/Catalan_number)
- [5] Wikipedia, *Eugene Charles Catalan*, 2015., [https://en.wikipedia.org/wiki/Eugene Charles Catalan](https://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_Charles_Catalan)
- [6] Ivica Nakić, *Diskretna matematika*, predavanja ak. god. 2011./2012.
- [7] Hrvoje Čavrak, *Catalanovi brojevi*, Hrvatski matematički elektronski časopis, Broj 7

# Sažetak

Catalanovi brojevi javljaju se u mnogo kombinatornih problema, kao što su putevi u cjelobrojnoj mreži, problem zagrađivanja, problem binarnih stabala, Dyckovi putovi, triangulacije konveksnog  $n$ -terokuta, te Bertradox problem glasovanja. U ovom diplomskom radu opisani su navedeni kombinatorni problemi te pokazane bijekcije sa drugim kombinatornim objektima. Opisana su i svojstva Catalanovih brojeva. Na kraju diplomskog rada navedeni su primjeri nekih kombinatornih interpretacija koje nisu toliko poznate, te je pokazano kako se Catalanovi brojevi pojavljuju na mnogo neočekivanih mjesta.

# Summary

Catalan numbers appear in many combinatorial problems, such as monotonic lattice paths along the edges of a grid with  $n \times n$  square cells which do not pass above the diagonal, matching  $n$  pairs of brackets, the problem of binary trees, Dyck paths, triangulation of a convex polygon with  $n$  sides, and Bertrand's ballot problem. In this study we described each of these combinatorial problems and showed bijection with other combinatorial objects. We also have described the properties of the Catalan numbers. We have concluded the work with some examples of combinatorial interpretations that are not so well known, and showed some of them how Catalan numbers appear in many unexpected places.

# Životopis

Rođena sam 04.veljače 1990. godine u Vukovaru. Završila sam OŠ Gustava Krklec u Maruševcu, te 1.Gimnaziju u Varaždinu.

Nakon završenog srednjeg školovanja upisala sam Preddiplomski sveučilišni studij Matematike na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu (2008. godine), koji sam završila 2012. godine. Iste godine upisala sam Diplomski sveučilišni studij Računarstva i matematike na istom fakultetu.