

# Akvatičke ličinke kukaca kao pokazatelji kakvoće vode

---

Grozić, Dino

Undergraduate thesis / Završni rad

2012

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Faculty of Science / Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:217:240650>

Rights / Prava: [In copyright](#)/[Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-12-11**



Repository / Repozitorij:

[Repository of the Faculty of Science - University of Zagreb](#)



**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU**  
**PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKI FAKULTET**  
**BIOLOŠKI ODSJEK**

**Akvatičke ličinke kukaca kao pokazatelji kvalitete vode**

**Aquatic insects larvae as water quality indicators**

**Seminarski rad**

Dino Grozi

Preddiplomski studij znanosti o okolišu  
(Undergraduate Study of Environmental Sciences)

Mentor: Doc. dr. sc. Marko Miliša

Zagreb, 2012.

# SADRŽAJ

<b>1. UVOD</b> .....	<b>1</b>
1.1 POVJEST BIOMONITORINGA .....	1
1.2 OSNOVNE POSTAVKE BIOMONITORINGA .....	1
<b>2. BIOLOŠKE METODE ANALIZE VODE</b> .....	<b>2</b>
2.1. PREDNOSTI I NEDOSTACI BIOLOŠKIH METODA U ANALIZI VODE.....	2
<b>3. KORIŠTENJE MAKROSKOPSKIH BESKRALJEŽNJAKA KAO POKAZATELJA KAKVO E VODE</b> .....	<b>4</b>
3.1 INDEKSI TEMELJENI NA MAKROSKOPSKIM BESKRALJEŽNJACIMA .....	4
3.2 AKVATI KE LI INKE KUKACA KAO POKAZATELJI KAKVO E VODE .....	5
3.2.1 EPHEMEROPTERA, PLECOPTERA I TRICHOPTERA .....	6
3.2.1.1 BIOLOGIJA EPHEMEROPTERA .....	6
3.2.1.1.1 ŽIVOTNI CIKLUS I FENOLOGIJA .....	7
3.2.1.1.2 STANIŠTA.....	8
3.2.1.1.3 TROFI KI ODNOSI.....	9
3.2.1.2 BIOLOGIJA PLECOPTERA .....	9
3.2.1.2.1 ŽIVOTNI CIKLUS I FENOLOGIJA .....	10
3.2.1.2.2 STANIŠTA.....	11
3.2.1.2.6 TROFI KI ODNOSI.....	11
3.2.1.3 BIOLOGIJA TRICHOPTERA.....	11
3.2.1.3.1 ŽIVOTNI CIKLUSI I FENOLOGIJA.....	12
3.2.1.3.3 KU ICE LI INKI I STANIŠTA .....	13
3.2.1.4 METODE SAKUPLJANJA .....	15
<b>4. ZAKLJU CI</b> .....	<b>17</b>
<b>5. LITERATURA</b> .....	<b>18</b>
<b>6. SAŽETAK</b> .....	<b>20</b>
<b>7. SUMMARY</b> .....	<b>20</b>

# 1. UVOD

## 1.1 POVJEST BIOMONITORINGA

Povijest biomonitoringa može se pratiti sve od vremena Aristotela, koji je slatkovodne ribe stavljao u morsku vodu i promatrao reakcije. Prva istraživanja toksikosti objavljena su 1816. godine, te opisuju dulje preživljavanje nekolicine vrsta slatkovodnih mekušaca u 2% naspram u 4% slanoj otopini. Studije preživljavanja slatkovodnih beskralježnjaka izloženih metalima i organskim tvarima pojavile su se sredinom 1890-ih dok je korištenje struktura zajednica slatkovodnih organizama za biomonitoring poznato iz pionirskih radova dvaju njemačkih znanstvenika, R. Kolkwitz i M. Marssona ranih 1900-ih. Njihove objave na temu saprobnosti dovele su do razvoja koncepta indikatorskih organizama.

Zanimljiv je primjer savezne države New York u kojoj se biomonitoring počeo koristiti 1972. godine kao dopuna kemijskom monitoringu i procjeni stanja rijeka i potoka. Od tog vremena, biomonitoring je nadmašio kemijski monitoring u mogućnosti motrenja najvećeg broja vodnih tijela u državi. Biomonitoring se također pokazao neprocjenjivim u promatranju trendova kakvoće voda kroz vrijeme, te danas pridonosi kompilaciji tridesetogodišnjih trendova kakvoće voda (Mandaville, 2002).

## 1.2 OSNOVNE POSTAVKE BIOMONITORINGA

Mandaville (2002) navodi kako je biomonitoring sistematsko korištenje živih organizama ili njihovog odgovora kako bi se odredila kakvoća okoliša, te daje usporedbu u kojoj navodi da su kemijska mjerenja kao fotografiranje ekosustava, dok su biološka mjerenja nalik snimanju videozapisa. Isti autor zaključuje kako je konačna namjena okolišnih procjena i propisa održavanje biološkog integriteta te bi zbog toga, uz kemijski, u procjenama svakako trebao biti prisutan i biološki kriterij.

Biomonitoring je danas prepoznat kao jedan od najvrjednijih alata stručnjaka koji se bave okolišem. Biomonitoring se temelji na jednostavnoj pretpostavci da su živi organizmi izvrstan indikator kakvoće okoliša. Biomonitoring ima i sekundarnu korist kroz inspiriranje pojedinaca, posebno mladih ljudi, prema znanosti i istraživanju prirode. Postoji malo područja u kojima proučavanje prirode nudi toliko izravan utjecaj na očuvanje proučavanog staništa.

## **2. BIOLOŠKE METODE ANALIZE VODE**

### **2.1. PREDNOSTI I NEDOSTACI BIOLOŠKIH METODA U ANALIZI VODE**

U studiji Hrvatski indikatorski saprobni sustav (HRIS) iz 2005. godine prema Thienemannu (1926) navode se sljedeće prednosti i nedostaci bioloških i kemijskih metoda u analizi vode:

- (1) Kemijska analiza pokazuje trenutno kakvo u vode u vrijeme uzorkovanja. To znači da voda u ponovljenom uzorku, koji je uzet kasnije, može imati sasvim drugačija fizikalna i kemijska obilježja. Suprotno, zahvaljujući osjetljivosti i ekološkoj multidimenzionalnosti živog svijeta, biološke analize ukazuju na promjene u kakvo u vode u duljem razdoblju. Npr. ako se u rijeku ili jezero izliju određene količine otpadnih tvari, nastaju biocenote koje promjene u zajednici koje su primjetljive duže vrijeme nakon one izmjene, iako zbog otplavlivanja otpadne tvari više nisu prisutne u vodi.
- (2) Biološke analize ukazuju na promjene u stanju kakvo u vode, dok je za utvrđivanje promjena vrijednosti nekog parametra kemijskom metodologijom potrebno izvesti više i broj opetovanih mjerenja.
- (3) Uzimajući u obzir cijenu izvedbe, biološko vrednovanje voda uvijek je znatno jeftinije od kemijskog..

U istoj studiji navode se i ograničenja bioloških metoda analiza vode:

- (1) Rezultati biološke analize značajno ukazuju na stupanj nepovoljnog djelovanja otpadnih voda, ali se njihovom primjenom ne mogu ustvrditi vrste tvari koje su bile sadržane u otpadnoj vodi. Samo za neke tvari (sumporovodik, željezo i natrijev klorid) postoje biološki indikatori.
- (2) Biološka analiza ne može nikada pružiti točne numeričke vrijednosti za količinu tvari s nepovoljnim djelovanjem, jer organizmi nisu kemijski reagensi koji bi pod istim uvjetima reagirali istovrsno na određene tvari sadržane u otpadnim vodama.

Veliki nedostatak biološkog vrednovanja voda, temeljnim indikatorskih sustava, leži u ovisnosti o djelovanju fiziografskih čimbenika (temperatura, svjetlo, brzina strujanja vode, akumulacija organskog detritusa, vrsta supstrata itd.). To znači da iste koncentracije otpadnih

tvori u pojedinim biotopima s različitim fiziografskim i klimatskim uvjetima nemaju iste posljedice za biocenotičku strukturu zajednice.

Fore i sur. (2001) proveli su procjenu uspješnosti nestručnih volontera u monitoringu odabranih tokova. Zaključeno je da nema razlike u terenskim uzorcima koje su sakupili volonteri i stručnjaci te da je uspješnost stručnjaka u determinaciji svojti bila samo 13 % veća od one kod volontera. Volonteri su koristili jednostavne generalizirane indekse temeljene na odreivanju do razine porodice, stoga je zaključeno da takve metode ne mogu dati zadovoljavajuću različitost na mjestima s malo antropogenog utjecaja, gdje se razlike mogu otkriti tek na razini roda ili vrste. U istom radu pokazano je i kako često uzorkovanje na istim mjestima može dati netočnu sliku o stanju vodnog tijela, zbog poremećaja stvorenih prijašnjim uzorkovanjima. Rezultati tog istraživanja pokazali su da volonteri mogu pridonijeti nadopuni procjene stanja vodnog tijela, te uz iskustvo i stručno vodstvo mogu sakupiti terenske uzorke slične kvalitete kao i stručnjaci. Također, laboratorijske analize volontera ne mogu parirati onima profesionalaca.

### **3. KORIŠTENJE MAKROSKOPSKIH BESKRALJEŽNJAKA KAO POKAZATELJA KAKVO ĆE VODE**

Makroskopski beskraljeŹnjaci danas su najpopularnija skupina organizama za korištenje u biomonitoringu. U prilog tome, Mandaville (2002) navodi sljede Će argumente:

- (1) Svugdje su prisutni te na njih utje Ću poreme Ćaji u mnogo razli Ćitih staništa.
- (2) Veliko bogatstvo vrsta dovodi do ve Ćeg raspona odgovora na okolišne uvjete.
- (3) Razmjerno su slabo pokretljivi što omogu Ćuje odre Ćivanje prostorne raširenosti poreme Ćaja.
- (4) DugoŹivu i su što omogu Ćuje pra Ćenje promjena pojavnosti i dobne strukture kroz vrijeme.
- (5) Kao i sve druge skupine Źivog svijeta nude dokaze o okolišnim uvjetima kroz dulje razdoblje.

Mandaville (2002) navodi kako se nedostaci korištenja makroskopskih beskraljeŹnjaka uglavnom mogu izbje Ći paŹljivim osmišljavanjem pokusa, odnosno uzorkovanja.

#### **3.1 INDEKSI TEMELJENI NA MAKROSKOPSKIM BESKRALJEŹNJACIMA**

Indeksi omogu Ćuju istraŹiva u da koristi zna Ćajna indikatorska svojstva u procjeni sastava zajednica kao odgovora na poreme Ćaje u okolišu. Da bi indeks bio koristan on mora biti:

- (1) Ekološki zna Ćajan za biološku grupu ili zajednicu koja se promatra te mora biti zna Ćajan za ciljeve istraŹivanja.
- (2) Osjetljiv na stresore i pokazivati odgovore koji se mogu razlikovati od prirodnih varijacija.

Ve Ćina indeksa koristi „vrijednosti tolerancije“ koje su dobivene iz velikih baza podataka objavljenih i neobjavljenih studija znanstvenika koji se bave prou Ćavanjem odre Ćenih skupina organizama, te su razvijeni biotički indeksi koji daju broj Ćanu vrijednost pojedinom indikatorskom organizmu na odre Ćenoj taksonomskoj razini. Takvi organizmi imaju specifi Ćne fizi Ćke i kemijske zahtjeve. Promjene u prisutnosti, broju, morfologiji, fiziologiji ili ponašanju tih organizama mogu ukazivati da su fizi Ćki i/ili kemijski parametri izvan odgovaraju Ćeg raspona. Prisutnost velikog broja porodica visokotolerantnih organizama

uglavnom ukazuje na lošu kakvo u vode. Broj indeksa temeljenih na makroskopskim beskralježnjacima vjerojatno je oko pet puta ve i od broja indeksa temeljenih na bilo kojoj drugo grupi organizama. Trenutno postoji pedesetak indeksa i njihov broj još raste.

Tipi ne metode bioprocjena temelje se na brojnim kvantitativnim uzorcima koji zahtijevaju mnogo vremena, rada, novca i stru nosti za identificiranje svih organizama. U posljednje vrijeme dolazi do kombiniranja kvantitativnih i kvalitativnih pristupa, a rezultat je pristup znan kao brza procjena ili brzi biomonitoring. Takav pristup koristi se za inicijalne procjene vodnih tijela kao temelj za mogu a daljnja istraživanja. Zbog toga recentni trendovi teže prema brzim tehnikama bioprocjena kao što je korištenje semi-kvantitativnih metoda sakupljanja (npr. kick-sample metoda), te nasumi no odabiranje i odre ivanje samo prvih 100 organizama u uzorku. Npr. u SAD-u je agencija za zaštitu okoliša (eng. – EPA: Environmental Protection Agency) razvila 5 protokola za brzu bioprocjenu od ega se prva tri odnose na makroskopske beskralježnjake, a ostala dva na ribe.

Danas su relativno dobro istražene tolerancije akvati kih beskralježnjaka na organsko optere enje, ali potrebno je još mnogo istraživanja na podru ju odre ivanja tolerancije na razne druge vrste one iš iva a i zaga iva a, kao što su metali, pesticidi i kiselost. Tako er, bitna je i sposobnost odre ivanja organizama na razini vrste kada se za biomonitoring koriste akvati ki beskralježnjaci jer se vrijednosti tolerancije mogu razlikovati i na razini roda (Mandaville, 2002).

### **3.2 AKVATI KE LI INKE KUKACA KAO POKAZATELJI KAKVO E VODE**

Akvati ke li inke kukaca prakti ne su za utvr ivanje kakvo e vodenih tijela jer vrlo esto preko 70% biomase i brojnosti akvati ke faune pripada upravo njima. Naj eš e skupine su Trichoptera (tulari), Ephemeroptera (vodencvjetokrilaši), Plecoptera (obal ari), Odonata (vretenca), Coleoptera (kornjaši) i odre ene porodice Diptera (dvokrilci). Faunisti ki sastav Ephemeroptera Hrvatske bazira se na temelju nalaza i determinacije li ina kih stadija (Mihaljevi i sur., 2011).



### **3.2.1 EPHEMEROPTERA, PLECOPTERA I TRICHOPTERA**

Predstavnici skupina Ephemeroptera, Plecoptera i Trichoptera (EPT) općenito su poznati kao osjetljive svojte. Njihova prisutnost i brojnost u izravnoj i snažnoj vezi sa mnogim stresorima. Posebno su osjetljive na smanjenje količine kisika kao posljedicu organskog onečišćenja, ali i smanjenja brzine strujanja vode. Indeksi temeljeni na ovim skupinama dobri su pokazatelji organskog onečišćenja i hidromorfološke degradacije, kao i ukupne degradacije vodotoka. Također, dobro je poznato da udio predstavnika navedenih skupina drastično pada uslijed gubitka staništa na koja su prilagođeni, poput stabilnog krupnog supstrata pokrivenog mahovinama, ostacima lišća i slinčom.

Dobar primjer obuhvatnosti ljudskog djelovanja je intervencija u toku pregradnjom tekućica što ima za posljedicu porast brojnosti vrsta koje naseljavaju fini sediment, a koji uglavnom ne odgovara predstavnicima skupina EPT. Smanjenje udjela EPT svojti posljedica je smanjenja produktivnosti zajednice makrozoobentosa zbog taloženja finog supstrata. Slična je situacija i u prirodnim nizinskim tekućicama sporog toka gdje je u makrozoobentosu udio EPT skupina mali.

Primjeri indeksa temeljenih na EPT korištenih u studiji „Testiranje bioloških metoda ocjene ekološkog stanja (okvirna direktiva o vodama, 2000/60/EC) u reprezentativnim slivovima Panonske i Dinaridske ekoregije“ koju je proveo Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011 su: (1) Broj svojti koje pripadaju skupinama Ephemeroptera, Plecoptera i Trichoptera (EPT-S); (2) Udio predstavnika EPT skupina u makrozoobentosu (EPT %) (Mihaljević i sur., 2011).

Uvećani slučajeva smatra se da su vrste reda Plecoptera najosjetljivije na organsko zagađenje i nedostatak kisika (Woodwiss, 1964; 1982; Armitage i sur., 1983; Lenat, 1988; Friedrich, 1990) dok se red Ephemeroptera smatra drugom najosjetljivijom svojtom (Timm, 1997).

#### **3.2.1.1 BIOLOGIJA EPHEMEROPTERA**

Ephemeroptera (Slika 1.) predstavljaju jedan od dva živa reda unutar podrazreda Palaeopterygota i sadrži nešto više od 2100 vrsta smještenih u otprilike 200 rodova i 22 porodice. Ličinke se mogu pronaći u gotovo svim vrstama slatkih voda na planeti, uz Arktik i Antarktiku kao iznimke. Ephemeroptera su slabo zastupljeni na oceanskim otocima, izoliranim planinskim vrhovima, te mnogi rodovi i vrste ne uspijevaju premostiti relativno

male fiziogeografske prepreke kao što su male ravnice. Smatra se da je to posljedica njihove slabe sposobnosti raspostranjenja, dok se njihova odsutnost u polarnim područjima veže uz termotoleranciju. Fauna Ephemeroptera najraznolikija je u tektonički umjerenim područjima gdje predstavljaju važne članove bentičkih zajednica (Williams i sur., 1992).



**Slika 1.** Odrasla jedinka i ličinka Ephemeroptera

(<http://zoology.fns.uniba.sk>)

### 3.2.1.1.1 ŽIVOTNI CIKLUS I FENOLOGIJA

Životni ciklus Ephemeroptera uključuje četiri stadija: jaje, ličinka i dvije odrasle faze subimago i imago. Životni ciklus se odvija nepotpunom metamorfozom, s obzirom da nedostaje stadij kukuljice, a kao iznimka, u sjevernoj Europi ženke roda *Prosopistoma* nikad ne dostižu stadij imaga. Životni raspon jedinki proteže se od 6 tjedana (npr. *Centroptilum*) do 3 godine (npr. *Ephemera*) u stadiju ličinke koja pritom prolazi kroz 20 do 30 presvlačenja. Životni ciklus može biti semivoltin (ličinke provode 2 do 3 godine u vodi), univoltin (jedna generacija prezimuje u obliku jajeta ili ličinke) ili bivoltin (sa dvije do tri generacije u godini, ovisno o temperaturi vode). Semivoltne vrste poznate su u rodu *Ephemera*, dok je većina drugih rodova univoltina. Bivoltne vrste poznate su unutar porodica Baetidae i Caenidae. Subimago se pojavljuje ispod vode te otpliva na površinu (*Ecdyonurus lateralis*) ili se zrela ličinka popne na vrh travke ili kamena iznad površine vode prije pojavljivanja subimaga (*Siphonurus*). Međutim, ličinke većine vrsta plivaju na površinu gdje neko vrijeme plutaju, nakon čega dolazi do pojavljivanja subimaga. Stadij subimaga traje 1 do 2 dana u većini

vrsta, ali može trajati i samo nekoliko minuta kao u porodice Caenidae. Trajanje metamorfoze imaga iz subimaga može jako varirati. U vrste *Cloeon inscriptum* traje 20 sati, dok kod vrste *C.schoenemundi* traje 60 sati. Subimago i imago se ne hrane. *Baetis rhodani* te polivoltni *Centroptilum luteolum* imaju najduže razdoblje leta koje može trajati od travnja do studenoga. Rojevi muških imaga javljaju se iznad vode (*Heptagenia sulphurea*), iznad grmlja i trave (*Cloeon*), iznad krošnji drve a (*Ephemerella*), ili visoko u zraku (*Siphonurus*), ali ne udaljavaju i se više od 500 m od vode. Rojenje se uglavnom događava za vrijeme dana, ali se gustoća rojeva povećava prema večeri. Rojevi mogu biti sastavljeni od nekoliko jedinki (*Centroptilum*), ili od nekoliko milijuna jedinki formirajući oblak (*Caenis*). *Heptagenia dalecarlica* može formirati rojeve u ponoć, a neki predstavnici roda *Caenis* i kasnije u noć. Neke vrste čak formiraju rojeve za vrijeme padanja kiše i snijega. Glavni obrazac ponašanja tijekom leta mužjaka je ritmično uzletavanje i spuštanje. Ženke imaju ravniji i odlučniji let od grmlja prema roju, natrag u grmlje, te zatim prema mjestu polaganja jaja. Parenje se odvija u letu. Nakon parenja, mužjaci se ponekad vraćaju u roj, ali u večernji slučaj umiru. Ženke koje žive u tekućicama tipično lete uzvodno na polaganje jaja. Lenticulne vrste ispuštaju svoja jaja u blizini mjesta parenja. Većina vrsta ispušta jaja na površinu vode, ali neke vrste roda *Baetis* prihvataju ih na podvodno kamenje. Jaja mogu biti ispuštena u jednoj nakupini kao u roda *Siphonurus* ili *Ephemerella*, ali većina vrsta ih ispušta u više nakupina. Razvoj jaja i ličinke ovisi o temperaturi vode i može se razlikovati i kod geografski bliskih vodnih tijela (Engblom, 1996).

### 3.2.1.1.2 STANIŠTA

Ephemeroptera se javljaju u svim slatkovodnim okolišima. Neke vrste, npr. *Caenis* spp. i *Baetis fuscatus*, također nastanjuju obale vode. Većina vrsta je reofilna, iako neke od njih nastanjuju i obale jezera (*Ephemera danica* i *Heptagenia sulphurea*). Rijetke vrste su ograničene samo na jezera (*Cloeon dipterum*, *Caenis robusta* te *Ephemera glaucops*). Većina jezerskih vrsta preferira plitke litoralne zone bogate vegetacijom. *Cloeon simile* i *C. praetextum* se često mogu naći i u sastojinama alga *Chara* i *Nitella* na dubini od 0.5 do 1.5 m. Jedino *Caenis* i *Ephemera* spp. nastanjuju zonu profundala gdje se ličinke roda *Caenis* nalaze na površini silta, dok se ličinke roda *Ephemera* ukopavaju u mulj. U tekućicama se često mogu pronaći jedinke vrste *Ephemerella ignita* kako se penju na *Myriophyllum* te *Baetis* spp. Kako se penju na stabljike *Fontinalis*. Neke vrste, kao *Heptagenia sulphurea*, borave ispod kamenja. Ličinke Ephemeroptera se mogu razvijati u vrlo malim vodnim tijelima. U malim

nizinskim barama bez stalnih utoka esta je vrsta *Cloeon inscriptum*, dok je vrsta *Baetis bundyae* esta u barama na ve im nadmorskim visinama, iznad granice rasta drve a. Neke vrste, kao *Heptogenia fuscogrisea*, mogu se prona i na samim izvorima tokova. Privremene lokve stvorene plavljenjem rijeka u prolje e nastanjene su mnogim vrstama. Liinke *Cloeon inscriptum* i *Leptophlebia spp.* prona ene su u napuštenim, poplavljenim rudnicima. Mnoge vrste su osjetljive na zakiseljavanje i zaga enje voda (Engblom, 1996).

#### **4.2.1.1.3 TROFI KI ODNOSI**

Liinke Ephemeroptera uglavnom žive u nezaga enim jezerima, potocima i rijekama gdje s gusto ama do 10000/m<sup>2</sup> zna ajno pridonose sekundarnoj produkciji (Williams & Feltmate, 1992). Me utim, male koli ine organskog zaga enja mogu ponekad isprva pridonijeti pove anju broja i produkcije odre enih vrsta. Vrste roda *Baetis* pokazuju najve u toleranciju na zaga enje, te se uz ostale vrste koriste kao indikatori kakvo e vode.

Liinke su uglavnom herbivorne ili detritivorne. Sadržaji probavnog sustava uobi ajeno sadrže dijatomeje, te fragmente filamentoznih algi i biljaka. Nekoliko vrsta je karnivorno, hrane se li inkama Chironomidae i Oligochaeta. Ve ina slatkovodnih predatora uklju uje Ephemeroptera u svoju prehranu, pogotovo salmonidne vrste riba. Njima se još hrane šišmiši, ptice i pauci. Metilji riba koriste vrste roda *Ephemera* kao drugog me udomadara. Ephemeroptera sudjeluju u životnom ciklusu ve eg broja nametnika (Engblom, 1996).

#### **3.2.1.2 BIOLOGIJA PLECOPTERA**

Plecoptera (Slika 2.) je mali red kukaca raspostranjen u ve em djelu svijeta, od tropa do Arktika. Me utim, najve a raznolikost vrsta prisutna je u umjerenim podru jima. Red broji više od 1700 vrsta smještenih u dva podreda: Antartoperlaria ograni en samo na južnu hemisferu i Arctoperlaria, na obje hemisfere. Podred Arctoperlaria dijeli se u dvije skupine, Systellognatha i Euholognatha (Brittain i sur., 1996).



**Slika 2.** a) Odrasla jednika Plecoptera (<http://lesinsectesduquebec.com>) i b) li inka Plecoptera (<http://zoology.fns.uniba.sk>)

### 3.2.1.2.1 ŽIVOTNI CIKLUS I FENOLOGIJA

Ve ina vrsta iz reda Plecoptera ima univoltni životni ciklus s relativno kratkim razdobljem razvitka jaja tijekom ljeta i dugim razdobljem rasta li inki tijekom jeseni i zime, uz moguće produženje u proljeće i sljedeće godine. Međutim, neke vrste (*Leuctra fusca*), imaju dugo razdoblje inkubacije jaja tijekom zime s izlijevanjem u proljeće, nakon čega slijedi brzi rast li inki tijekom ljeta. Većina vrsta ima semivoltni životni ciklus. Kod dvogodišnjih ciklusa (*Diura bicaudata*) postoji dijapauza jaja tijekom prve zime te se rast li inki odvija uglavnom tijekom ljeta, a odrasli se pojavljuju nakon otapanja leda sljedećeg proljeća. Poznate su i razlike u trajanju životnog ciklusa unutar iste vrste. Neke vrste iz porodice Nemouridae mogu preći iz univoltnog na dvogodišnji ciklus u višim nadmorskim visinama i geografskim širinama (Brittain i sur., 1996).

Razvoj jaja Plecoptera dobro je proučavan, pogotovo u odnosu na temperaturu vode. Dijapauza je važna za vrijeme razvoja jajeta, posebice u Plecoptera koji pripadaju skupini Systellognatha. Izravni razvoj je najčešći i najbrži u razvoju. Trajanje inkubacije je kratko pri visokim temperaturama vode te se smanjenjem temperature produljuje (Brittain i sur., 1996).

Li inke mnogih Plecoptera podnose (pa i preferiraju) vrlo niske temperature, što im omogućuje iskorištavanje dugog razdoblja niskih temperatura u višim geografskim širinama. Vrsta supstrata ima značajan utjecaj na rasprostranjenje li inki. Najveće bogatstvo vrsta prisutno je na kamenitom dnu tekućeg voda, dok pjeskovite supstrate nastanjuje samo nekoliko vrsta (Brittain i sur., 1996).

Preobrazba se odvija nakon što odrasle liinke izađu na obalu. Tek preobraženi odrasli su u početku svijetlo obojani, te postepeno postaju tamniji dok se suše. Nakon sušenja odrasli odlaze u zaklon, najčešće vegetaciju ili kamenje. Odrasli se okupljaju zbog hranjenja, odmaranja i kopulacije. Ženke zatim odlaze prema vodi na polaganje jaja. Duljina života odraslih varira od nekoliko dana do nekoliko tjedana (Brittain i sur., 1996).

### **3.2.1.2.2 STANIŠTA**

Plecoptera su tipični za tekuće vode bogate kisikom, međutim, određeni broj vrsta pojavljuje se u jezerima i barama. Lenticke vrste su najčešće u oligotrofnim vodnim tijelima na višim nadmorskim visinama, iako se neke vrste iz porodice Nemouridae javljaju i u nizinskim lentickim staništima. Slabi su letači što smanjuje njihovu mogućnost disperzije, te potiče razvoj lokalnih populacija koje se međusobno razlikuju po morfološkim i ekološkim karakteristikama (Brittain i sur., 1996).

### **3.2.1.2.6 TROFIČKI ODNOSI**

Većina liinki Plecoptera su detritivori. Ostaci lišća su glavni izvor hrane, međutim, većina vrsta iz skupine Systellognatha su omnivorne ili karnivorne. Euholognatha se hrane u svojoj odrasloj fazi i to algama, lišajevima, mahovinom i lišćem te mogu živjeti i do nekoliko tjedana pri povoljnim uvjetima, dok Systellognatha imaju reducirani usni aparat te se ne hrane u odrasloj fazi. Njihov životni vijek je stoga kratak i uobičajeno ne prelazi tjedan dana (Brittain i sur., 1996).

### **3.2.1.3 BIOLOGIJA TRICHOPTERA**

Trichoptera (Slika 3.) je red kukaca s 10500 opisanih vrsta diljem svijeta, međutim procjenjuje se da bi na svijetu moglo biti 50000 vrsta s time da u Europi ima 900 do 1000 vrsta. Trichoptera predstavlja jednu od najraznolikijih skupina akvatičkih kukaca čiji broj vrsta nadilazi jedino skupinu akvatičkih Diptera. Uz nekoliko iznimki, nezreli stadiji žive u podvodnim slatkovodnim staništima, te njihova respiracija ne ovisi o atmosferskom kisiku. Prvotni Trichoptera nastanjivali su hladne tekuće vode. S takvih staništa su se proširili te danas

nastanjuju lenti ka staništa i privremena vodna tijela. Imaju potpunu preobrazbu i prolaze kroz četiri životna stadija: jaje, li inka, kukuljica i odrasla faza.



Slika 3. a) Odrasla jedinka Trichoptera (<http://www.lesinsectesduquebec.com>), b) kukuljica Trichoptera (<http://www.mdfrc.org.au>) i c) li inka Trichoptera (<http://www.aquatax.ca/trichoptera.html>)

### 3.2.1.3.1 ŽIVOTNI CIKLUSI I FENOLOGIJA

Ženke Trichoptera polažu nakupine jaja jednom ili više puta tijekom svoga života. U jednoj nakupini može se nalaziti 10-20 pa i do nekoliko stotina jaja. Nakupine su okružene želatinoznim matriksom koji bubri u doticaju s vlagom. Mogu se razlikovati tri na ina polaganja jaja:

- (1) jaja se polažu na površinu vode (npr. Leptoceridae)
- (2) ženke ulaze u vodu te polažu jaja na odre enim objektima ispod površine (Rhyacophilidae, Glossosomatidae, Hydroptilidae, Philopotamidae, Hydropsychidae, Phryganeidae, Brachycentridae te Sericostomatidae)
- (3) jaja se polažu na razne objekte ili vegetaciju iznad vode, što je naj eš i slu aj u Limnephilidae.

Postoje dvije vrste nakupina jaja. Ženke polažu jaja u jednom sloju cementirana za površinu podvodnog supstrata s vrlo malo želatinoznog matriksa prisutno izme u pojedinih jaja (Rhyacophilidae, Glossosomatidae, Hydroptilidae, Philopotamidae, Psychomyiidae, Hydropsychidae). U ostalih porodica Trichoptera, izme u jaja je umetnuta ve a koli ina matriksa koji bubri na veli inu nekoliko puta ve u od po etne nakon upijanja vode (Limnephilidae, Phryganeidae, Sericostomatidae, Molannidae, Leptoceridae). Takve nakupine mogu biti raznih oblika, npr. sferi ne, elipti ne, zavojite itd. Jaja se tipi no izlegu nakon 2 do 3 tjedna osim kod vrsta koje su u fazi leta u kasnu jesen ili ranu zimu. U tome slu aj u jaja se ne e izle i do prolje a (Solem i sur., 1996).

Trichoptera imaju jednu do nekoliko generacija u godini (univoltni ili multivoltni), ili mogu producirati jednu generaciju svakih dvije ili više godina (semivoltni). Neke vrste imaju vrsto odre en životni ciklus dok je kod drugih životni ciklus promjenjiv, te se mogu izmjenjivati univoltinizam i semivoltinizam. Semivoltni i univoltni životni ciklus esto se izmjenjuju kod vrsta koje nastanjuju nizinska i planinska podru ja. Ve ina vrsta je krepuskularna ili no na (Solem i sur., 1996).


### 3.2.1.3.3 KU ICE LI INKI I STANIŠTA

Mreže i ku ice koje grade li inke Trichoptera dobro su poznate. Svilenkasta tvar koju ispuštaju kroz usni aparat važan je gra evni materijal ili sredstvo za sljepljivanje zrnaca pijeska i dijelova bilja pri izgradnji prijenosne ku ice. Ku ica ima barem dvije svrhe, pruža zaštitu li inki i pomaže u ventilaciji škrge kada li inka proizvodi unduliraju e pokrete. U estalost undulacije pove ava se kako koncentracija kisika opada. Ku ice koje li inke izgra uju razlikuju se u dizajnu (Slika 4.), materijalima i funkciji, ali se uglavnom podudaraju na razini roda. Na temelju razli itih ku ica i ekoloških uloga, li inke se mogu grupirati u sljede e kategorije:

- (1) Slobodnoživu i oblici. Li inke iz porodice Rhyacophilidae pokretni su grabežljivci koji nastanjuju teku ice. Kada su spremne za fazu kukuljice, zatvaraju se u ku icu od zrnaca pijeska cementiranih svilenkastom tvari. U takvoj ku ici, cementiranoj za kamen, izgra uju sme u kukuljicu u kojoj se odvija preobrazba.
- (2) Tvorci sedlastih ku ica. U porodici Glossosomatidae li inka izgra uje prenosivu ku icu koja se sastoji od manjih kamen i a sa stožastim gornjim i plosnatim donjim djelom. Žive u teku icama, hrane i se dijatomejama i ostalom organskom tvari na stjenkama kamenja. Kada su spremni za pupanje, cementiraju ku icu za ve i objekt i stvore sme u kukuljicu.
- (3) Tvorci ku ica oblika torbe. Li inke Hydroptilidae vrlo su male i slobodnoživu e do zadnjeg (petog) presvla enja kada izgra uju pokretnu ku icu oblika torbe, boce ili ba ve. Žive u svim vrstama trajnih vodnih tijela, staja ih i teku ih, oligotrofnih i eutrofnih. Hrane se uglavnom stani nim sadržajem nitastih algi.
- (4) Tvorci mreža i nepokretnih ku ica. Porodice Philopotamidae, Psychomyiidae, Ecnomidae, Polycentropodidae, Hydropsychidae i Arctopsychidae. Uglavnom su slabo pokretne vrste koje konstruiraju ku ice s mrežom za filtriranje i hvatanje estica hrane u teku icama..



(5) Tvorci kuica oblika cijevi. Porodice Limnephilidae, Goeridae, Phryganeidae, Brachycentridae, Lepidostomatidae, Beraeidae, Sericostomatidae, Odontoceridae, Molannidae i Leptoceridae. Liinke grade pokretne cjevaste kuice različitog dizajna. Mogu se pronaći u tekucim i stajanim vodama. Većina vrsta se hrani dijelovima raspadajućeg tkiva vaskularnih biljaka i pripadaju omikroflori i fauni, ali prisutni su i drugi oblici prehrane pa i predatorstvo.



**Slika 4.** Primjer izgleda kuica liinki Trichoptera

U usporedbi s drugim redovima potpuno akvatičkih kukaca, Trichoptera je taksonomski bogata skupina. To je posljedica široke ekološke raznolikosti i raznolikosti u načinu hranjenja, iskorištavanja staništa i oblika kuica. Mnogo vrsta se može pronaći i u obitavajućim vodama, te u svim vrstama vodenih tijela, od morske razine do najviših planinskih predjela. Kameniti supstrat malih i srednje velikih potoka pruža stanište za liinke na, između i ispod kamenja, u perifitonu pa i u hiporeičkoj zoni. Uz iznimke, većina liinki živi na površini ili vrlo blizu površine supstrata ili vegetacije. Također, većina vrsta ograničena je na plitke vode te uglavnom ne podnose kiselu okolinu. Tolerancija na zagađenje bitna je za shvaćanje raspostranjenja vrsta. Isto tako, privremena vodna tijela imaju ograničenu faunu Trichoptera jer su povremene suše vrlo zahtjevne za tempiranje i usklađivanje životnog ciklusa. Odrasli se u najvećem broju nalaze u blizini lokacija gdje se mogu pronaći i liinke, ali mnogi odrasli preljeću i velike udaljenosti od vode (Solem i sur., 1996).


### 3.2.1.4 METODE SAKUPLJANJA

Liinke se najbolje sakupljaju kick-sample metodom (Slika 5.). Materijal sa dna se resuspendira udarcem noge ispred otvora mreže, a zatim struja vode ponese podignuti materijal s liinkama u mrežu.



**Slika 5.** Primjena kick-sample metode (<http://www.oart.org.uk>)

S obzirom da je ova metoda ponekad pregruba za neke krhkije vrste, posebice ako su potrebni živi primjerci za daljnje prouavanje u akvariju, preporučuju se neke manje grube metode. Jedna od takvih metoda je ispiranje stijena i vegetacije u posudi napola punoj vodom. Zatim se liinke odvajaju usisavanjem kroz plastičnu cijev i prebacuju u posudu sa svježom vodom. Sakupljanje sublitoralnih i intersticijskih vrsta zahtjeva korištenje Ekmanovog grabila (Slika 6.).



**Slika 6.** Ekmanovo grabilo (<http://www.rickly.com>)

Subimaga, koji se mogu pronaći i u grmlju u blizini vode, najbolje je sakupljati ručno. Neki primjerci se mogu pronaći i u paukovim mrežama duž obale. S obzirom da se većina vrsta Ephemeroptera preobražava u stadij subimaga na površini vode, njih je također moguće sakupljati izravno. Imaga u rojevima i na vegetaciji najlakše je sakupiti pomoću mreža za kukce. Neke vrste, posebice roda *Caenis*, privučene su na svjetlo što se može iskoristiti za postavljanje zamki (Engblom, 1996).

Ličinke Plecoptera mogu se sakupljati u jezerima i tekucima kroz većinu godine. Koristi se velik raspon metoda sakupljanja. Jednostavna kick-sample metoda zadovoljavajuća je za kvalitativna istraživanja, dok bi se za istraživanja pojavnosti i produkcije trebale koristiti kvantitativne metode kao što je upotreba Surberove mreže. Moguće je i korištenje zamki (Brittain i sur., 1996).

Najčešće kvalitativne metode sakupljanja ličinki i kukuljica Trichoptera su ručno sakupljanje ili sakupljanje pomoću mreže. U stajaćim mreža se može vući i po dnu supstrata, dok je u tekucima najbolje koristiti kick-sample metodu. Umjetni supstrati, kao što su žičane košare ispunjene kamenjem i lišćem, također se mogu koristiti. Kvantitativno uzorkovanje u stajaćim tekucima može se napraviti pomoću Ekmanovog ili Petersenovog grabila. Za sakupljanje odraslih mogu se koristiti različite tehnike kao što su zamke sa UV-svjetlom ili sakupljanje pomoću mreže. Determinacija ličinki i kukuljica može biti teška, ali se problem može pojednostaviti uzgojem do odrasle faze (Solem i sur., 1996).

#### 4. ZAKLJUČCI

Za razliku od kemijske koja pokazuje samo trenutno stanje u staništu, procjena stanja okoliša, a posebno tekućica biološkim metodama daju proširenu sliku u određenom razdoblju. O kojem se razdoblju radi ovisi o promatranoj vrsti organizma. Slika dobivena temeljem stanja zajednice makroskopskih beskralježnjaka smatra se optimalnom zbog obilježja životnih ciklusa kao i osjetljivosti ovih organizama. Prednosti biološkog vrednovanja su i povoljnija cijena, a prednost je i što relativno pouzdane rezultate može dobiti i nestručna osoblje. Nadalje, makroskopski beskralježnjaci su: kozmopolitski rasprostranjeni, dolaze s velikim bogatstvom vrsta, razmjerno slabo pokretljivi te ih se lako hvata. Ipak njihovom primjenom teško se i nikako ne mogu ustvrditi vrste i količine one i šiva. Nedostaci korištenja makroskopskih beskralježnjaka za procjenu stanja vodnih tijela u smislu različitih utjecaja iste vrste stresa u različitim fiziografskim uvjetima uglavnom se mogu izbjeći pažljivim osmišljavanjem pokusa, odnosno uzorkovanja.

Akvatici inke kukaca najpraktičniji su dio faune beskralježnjaka za utvrđivanje kakvoće vodnih tijela jer uvijek imaju akvatičku faunu. Od njih, najčešće se koriste skupine Trichoptera (tulari), Ephemeroptera (vodencvjetovi), Plecoptera (obalari), a u manjoj mjeri ili kao nadopuna Odonata (vretenca), Coleoptera (kornjaši) i određene porodice Diptera (dvokrilci).

U veštinama smatra se da su vrste reda Plecoptera najosjetljivije na organsko zagađenje i nedostatak kisika.

Iako biomonitoring pomoću akvatičkih inki kukaca ima svoje značajne prednosti, preporuča se njegovo korištenje u sprezi sa biomonitoringom temeljenim na drugim skupinama organizama kao što su dijatomeje i ribe, te mikrobiološkim i kemijskim analizama kako bi se dobila potpuna slika kvalitete vode nekog vodnog tijela.

## 5. LITERATURA

- Armitage, P. D., Moss, D., Wright, J. F., & Furse, M. T. (1983). The performace of a new biological water quality score system based on a wide range of unpolluted running-water sites. *Water Research*.17: 333-347.
- Primc Habdija, B., & Kerovec, M. (2005). Biološka valorizacija voda - Studija II: Primjena hrvatskog indikatorskog sustava. Prirodoslovno-matemati ki fakultet. Zagreb.
- Brittain, J. E., & Saltveit, S. J. (1996). Plecoptera, Stoneflies. U: A. N. Nilsson (Ur.), *Aquatic Insects of North Europe - A Taxonomic Handbook* (str. 55 - 75). Apollo Books. Stenstrup. Danska.
- Engblom, E. (1996). Ephemeroptera, Mayflies. U: A. N. Nilsson (Ur.), *Aquatic Insects of North Europe - A Taxonomic Handbook* (str. 13 - 53). Apollo Books. Stenstrup. Danska.
- Fore, L. S., Paulsen, K., & O'Laughlin, K. (2001). Assessing the performance of volunteers in monitoring streams. *Freshwater Biology* 46: 109-123.
- Friedrich, G. (1990). Eine Revision des Saprobiensystems. *Zeitschrift fur Wasser und Abwasser - Forschung*, 23: 141-152.
- Lenat, D. R. (1988). Water quality assessment of streams using a qualitative collection method for benthic macroinvertebrates. *Journal of North American Benthological Society*. 7: 222-233.
- Mandaville, S. M. (2002). Benthic Macroinvertebrates in Freshwaters- Taxa Tolerance Values, Metrics, and Protocols. *Soil & Water Conservation Society of Metro Halifax, Kanada*.
- Mihaljevi , Z., Kerovec, M., Mrakov i , M., Plenkovi , A., Alegro, A., & Primc-Habdija, B. (2011). Testiranje bioloških metoda ocjene ekološkog stanja (okvirna direktiva o vodama, 2000/60/EC) u reprezentativnim slivovima Panonske i Dinaridske ekoregije. Prirodoslovno-matemati ki fakultet. Zagreb.
- Solem, O. J., & Gullefors, B. (1996). Trichoptera, Caddisflies. U: N. A. Nilsson (Ur.), *Aquatic Insects of North Europe - A Taxonomic Handbook* (str. 223 - 255). Apollo Books. Stenstrup. Danska.
- Thienemann, A. (1926). *Das Leben des Süßwassers. Eine Einführung in die biologischen Probleme der Limnologie*. Hirt Verlag. Wroclaw/Breslau.
- Timm, H. (1997). Ephemeroptera and Plecoptera larvae as environmental indicators in running waters of Estonia. U: P. Landolt i M. Sartori (Ur.) *Ephemeroptera & Plecoptera: Biology-Ecology-Systematics*. MTL (Mauron, Tinguely & Lacht) SA, Fribourg, Švicarska. 247-253.

Williams, D., & Feltmate, B. W. (1992). Aquatic insects. Cab international. Wallingford, UK.

Woodwiss, F. S. (1964). The biological system of stream classification used by the Trent River Broad. Chemical industry. 11: 443 - 447.

<http://lesinsectesduquebec.com>: <http://lesinsectesduquebec.com/insecta/8-plecoptera/Plecoptera.htm>

<http://www.aquatax.ca>: <http://www.aquatax.ca/trichoptera.html>

<http://www.cals.ncsu.edu>:

<http://www.cals.ncsu.edu/course/ent425/library/compendium/trichoptera.html>

<http://www.lesinsectesduquebec.com>: <http://www.lesinsectesduquebec.com/insecta/26-trichoptera/trichoptera.htm>

<http://www.mdfr.org.au>: <http://www.mdfr.org.au/bugguide/view.asp?PhotoID=4884>

<http://www.oart.org.uk>: <http://www.oart.org.uk/biological/index.htm>

<http://www.rickly.com>: <http://www.rickly.com/as/bottomgrab.htm>

<http://zoology.fns.uniba.sk>: [http://zoology.fns.uniba.sk/poznavacka/images/i01\\_Ephemera\\_vulgata.jpg](http://zoology.fns.uniba.sk/poznavacka/images/i01_Ephemera_vulgata.jpg)

<http://zoology.fns.uniba.sk>: [http://zoology.fns.uniba.sk/poznavacka/images/i03\\_larva\\_Plecoptera.jpg](http://zoology.fns.uniba.sk/poznavacka/images/i03_larva_Plecoptera.jpg)

## 6. SAŽETAK

Biomonitoring je korištenje živih organizama ili njihovog odgovora na okolišne promjene za određivanje kakvoće okoliša. Strukture zajednica slatkovodnih organizama u svrhu biomonitoringa koriste se od početaka 20. st. Za razliku od kemijske, biološka analiza kakvoće vode je jeftinija i ukazuje na prosječnu kakvoću vode u dužem razdoblju. Njezini su nedostaci nemogućnost određivanja vrste i količine određene zagađujuće tvari. Akvatički ličinke kukaca praktične su za utvrđivanje kvalitete vodenih tijela jer često se injavaju i preko 70 % akvatičke faune. Isti se predstavnici skupina Ephemeroptera, Plecoptera i Trichoptera (EPT) kao osjetljive svojstvena je prisutnost i brojnost u izravnoj vezi s mnogim stresorima. Posebice smanjenjem količine kisika i brzine strujanja vode što ih čini dobrim pokazateljima organskog onečišćenja i hidromorfološke degradacije. Iako biomonitoring pomaže u akvatičkim ličinkama ima svoje značajne prednosti, za dobivanje potpune slike kvalitete vode nekog vodnog tijela preporučljivo je u sprezi koristiti i biomonitoring temeljen na drugim skupinama organizama kao što su dijatomeje i ribe, te mikrobiološke i kemijske analize.

## 7. SUMMARY

Biomonitoring can be defined as using living organisms, or their responses to environmental changes, to assess the quality of the environment. First noted use of freshwater communities in biomonitoring is known from early 1900's. Opposite to chemical methods, biological analyses are cheaper and provide insight to average water quality during longer time intervals rather than the current (acute) state. Its deficiencies are inability to provide information on quality and quantity of specific pollutant. Aquatic insects larvae often contribute to aquatic fauna with more than 70 %, which makes them suitable to use in water quality analyses. Species of insect orders Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera (EPT) are well known for their presence and abundance in correspondence with various stressors in the environment, especially oxygen deficiency and reduction of flow intensity. These properties make them good indicators of organic contamination and hydromorphological degradation. Although biomonitoring based on aquatic insects larvae has its advantages, it is recommended to use it in combination with analyses based on other organisms groups, such as diatoms and fish and microbiological and chemical analyses, to get a complete picture of water quality.