

# Latinski kvadrati i primjene

---

**Kučić, Antun**

**Master's thesis / Diplomski rad**

**2023**

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:* **University of Zagreb, Faculty of Science / Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet**

*Permanent link / Trajna poveznica:* <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:217:212558>

*Rights / Prava:* [In copyright](#)/[Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja:* **2024-07-22**



*Repository / Repozitorij:*

[Repository of the Faculty of Science - University of Zagreb](#)



**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU**  
**PRIRODOSLOVNO–MATEMATIČKI FAKULTET**  
**MATEMATIČKI ODSJEK**

Antun Kučić

**LATINSKI KVADRATI I PRIMJENE**

Diplomski rad

Voditelj rada:  
doc. dr. sc. Sonja Žunar

Zagreb, 2023.

Ovaj diplomski rad obranjen je dana \_\_\_\_\_ pred ispitnim povjerenstvom u sastavu:

1. \_\_\_\_\_, predsjednik
2. \_\_\_\_\_, član
3. \_\_\_\_\_, član

Povjerenstvo je rad ocijenilo ocjenom \_\_\_\_\_.

Potpisi članova povjerenstva:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

# Sadržaj

<b>Sadržaj</b>	<b>iii</b>
<b>Uvod</b>	<b>1</b>
<b>1 Osnovni pojmovi</b>	<b>2</b>
1.1 Skupovi . . . . .	2
1.2 Relacije . . . . .	3
1.3 Algebarske strukture . . . . .	5
1.4 Osnove teorije grafova . . . . .	6
<b>2 Latinski kvadrati i ortogonalni latinski kvadrati</b>	<b>9</b>
2.1 Latinski kvadrati . . . . .	9
2.2 Ortogonalni latinski kvadrati . . . . .	10
<b>3 Grafovi i latinski kvadrati</b>	<b>17</b>
3.1 Latinski kvadrati i bipartitni grafovi . . . . .	17
3.2 Latinski kvadrati i faktorizacija potpunih grafova . . . . .	21
3.3 Latinski kvadrati potpunog retka i putevi u grafu . . . . .	26
<b>4 Magični kvadrati i Roomovi kvadrati</b>	<b>32</b>
4.1 Magični kvadrati . . . . .	32
4.2 Roomovi kvadrati . . . . .	35
<b>Bibliografija</b>	<b>38</b>

# Uvod

Latinski kvadrati su kvadratne matrice reda  $n \in \mathbb{N}$  popunjene s  $n$  simbola, pri čemu se u svakom retku i stupcu svaki simbol pojavljuje točno jednom. Iako su proučavani i stoljećima prije, latinski kvadrati su ime i matematičku definiciju dobili od Eulera u 18. stoljeću. Osim bogate povijesti i mnogih primjena u znanosti, inženjerstvu i statistici, latinski kvadrati imaju veliki spektar primjenjivosti i u samoj matematici, osobito kombinatorici. U ovom radu kroz četiri poglavlja proučit ćemo osnovna svojstva i neke od primjena latinskih kvadrata.

U prvom su poglavlju rada dane definicije nekih pojmova koje ćemo koristiti u ostalim poglavljima rada. Definiramo pojmove vezane za skupove i operacije nad njima, relacije, algebarske strukture poput grupe, prstena i polja te izložimo osnove teorije grafova.

U drugom poglavlju uvodimo pojmove *latinskog kvadrata*, *reduciranog latinskog kvadrata*, *ortogonalnih latinskih kvadrata*, *skupa međusobno ortogonalnih latinskih kvadrata (MOLS)*, *potpunog skupa MOLS-a* i *transverzalnog dizajna*, ističemo i dokazujemo njihova svojstva i međusobnu povezanost te primjerima ilustriramo dobivene rezultate.

U trećem poglavlju uvodimo pojam *latinskog pravokutnika* te ističemo i dokazujemo veze latinskih pravokutnika i kvadrata s potpunim bipartitnim grafovima, preciznije njihovim 1-faktorima. Zatim proučavamo povezanost latinskih kvadrata i 1-faktora potpunih usmjerenih grafova, uvodimo pojam *unipotentnog latinskog kvadrata* i pokazujemo vezu takvih latinskih kvadrata s 1-faktorizacijama potpunih usmjerenih i neusmjerenih grafova. Na kraju ovog poglavlja uvodimo pojmove *latinskog kvadrata potpunog retka*, *latinskog kvadrata potpunog stupca* i *potpunog latinskih kvadrata* te iskazujemo i dokazujemo veze istih s Hamiltonovim putevima i ciklusima, tj. Eulerovim turama.

U četvrtom poglavlju rada uvodimo pojam *magičnog kvadrata* i čitatelju približavamo konstrukciju magičnih kvadrata pomoću tzv. *dijagonalnih latinskih kvadrata*. Također definiramo još neke magične objekte kao što su *pandijagonalan*, *simetričan*, *bimagičan*, *m-multimagičan* i *obrubljen magični kvadrat*. Na kraju rada definiramo *Roomov kvadrat*, iskazujemo i dokazujemo jedan način njegove konstrukcije i ilustriramo dobivene rezultate na primjeru.

# Poglavlje 1

## Osnovni pojmovi

### 1.1 Skupovi

**Definicija 1.1.1.** Za skup  $\mathcal{F}$  kažemo da je **familija skupova**, ako su svi elementi skupa  $\mathcal{F}$  i sami skupovi. Na primjer,

$$\mathcal{F} = \{\{1, 4\}, \{2, 3, 5\}, \{3, 4\}\} \text{ je jedna familija skupova.}$$

**Definicija 1.1.2.** Neka je  $A$  skup. **Partitivni skup**  $\mathcal{P}(A)$  skupa  $A$  je familija svih podskupova skupa  $A$ .

**Primjer 1.1.3.** Neka je dan skup  $A = \{0, 1, 2\}$ . Tada je

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{1, 2\}, \{0, 1, 2\}\}.$$

**Definicija 1.1.4.** Neka je  $\mathcal{U}$  skup i  $\mathcal{F}$  neka familija podskupova od  $\mathcal{U}$ , tj.  $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{U})$ . Tada za skup

$$\bigcup_{A \in \mathcal{F}} A := \{x \in \mathcal{U} : ((\exists A \in \mathcal{F})x \in A)\}$$

kažemo da je **unija familije**  $\mathcal{F}$ . Slično, za skup

$$\bigcap_{A \in \mathcal{F}} A := \{x \in \mathcal{U} : ((\forall A \in \mathcal{F})x \in A)\}$$

kažemo da je **presjek familije**  $\mathcal{F}$ .

**Definicija 1.1.5.** Neka je  $A$  skup i neka je  $\mathcal{P}(A)$  njegov partitivni skup. **Particija skupa**  $A$  je bilo koja familija skupova  $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(A)$  za koju vrijedi:

(i) Za svaki  $X \in \mathcal{F}$  vrijedi  $X \neq \emptyset$ ;

(ii) Za sve  $X, Y \in \mathcal{F}$  vrijedi  $X = Y$  ili  $X \cap Y = \emptyset$ ;

(iii)  $\bigcup_{X \in \mathcal{F}} X = A$ .

## 1.2 Relacije

**Definicija 1.2.1.** Neka su  $A$  i  $B$  skupovi. Podskup  $\varphi$  skupa  $A \times B$  zovemo **relacija**.

**Primjer 1.2.2.** Neka je  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  i neka je  $B = \{a, b, c, d, e\}$ . Definirajmo relaciju  $\varphi$  na sljedeći način:

$$\varphi = \{(1, b), (2, d), (3, c)\}.$$

Tada možemo reći za elemente  $1 \in A$  i  $b \in B$  da je "1 u relaciji  $\varphi$  s  $b$ " (jer je  $(1, b) \in \varphi$ ), dok za elemente  $2 \in A$  i  $a \in B$  možemo reći da "2 nije u relaciji  $\varphi$  s  $a$ " (jer  $(2, a) \notin \varphi$ ).

**Definicija 1.2.3.** Ako su  $A_1, A_2, \dots, A_n$  skupovi, tada ćemo za  $\varphi \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$  reći da je jedna  **$n$ -arna relacija**. Posebno, ako je  $n = 2$ , za  $\varphi$  kažemo da je **binarna relacija**. Ako je  $\varphi \subseteq A \times A$ , onda za  $\varphi$  kažemo da je **relacija na skupu  $A$** .

**Definicija 1.2.4.** Neka je  $A$  skup i  $\varphi$  binarna relacija na skupu  $A$ . Za binarnu relaciju  $\varphi$  kažemo da je:

(i) **refleksivna** ako vrijedi:

$$\text{za sve } a \in A \text{ vrijedi } (a, a) \in \varphi;$$

(ii) **simetrična** ako za sve  $a, b \in A$  vrijedi:

$$\text{ako je } (a, b) \in \varphi, \text{ onda je } (b, a) \in \varphi;$$

(iii) **antisimetrična** ako za sve  $a, b \in A$  vrijedi:

$$\text{ako je } (a, b) \in \varphi \text{ i } (b, a) \in \varphi, \text{ onda je } a = b;$$

(iv) **tranzitivna** ako za sve  $a, b, c \in A$  vrijedi:

$$\text{ako je } (a, b) \in \varphi \text{ i } (b, c) \in \varphi, \text{ onda je } (a, c) \in \varphi.$$

**Definicija 1.2.5.** **Relacija ekvivalencije** je refleksivna, simetrična i tranzitivna relacija.

**Definicija 1.2.6.** Neka je  $\varphi$  refleksivna, antisimetrična i tranzitivna relacija na skupu  $A$ . Tada za  $\varphi$  kažemo da je **relacija parcijalnog uređaja** ili **parcijalni uređaj**. Ako još vrijedi:

$$(\forall a, b \in A)((a, b) \in \varphi \vee (b, a) \in \varphi),$$

onda za  $\varphi$  kažemo da je **relacija totalnog uređaja** ili **totalni uređaj**. Za skup  $A$  s totalnim uređajem  $\varphi$  kažemo da je **(totalno) uređeni skup**.

**Napomena 1.2.7.** Za totalni uređaj još koristimo izraz **linearni uređaj**. Slično za (totalno) uređeni skup koristimo izraz **linearno uređeni skup**.

**Primjer 1.2.8.** Jedan od primjera totalno uređenog skupa je skup  $\mathbb{R}$  s relacijom " $\leq$ ". Naime, " $\leq$ " je relacija parcijalnog uređaja (refleksivna, antisimetrična i tranzitivna) i dodatno za bilo koje  $x, y \in \mathbb{R}$  vrijedi  $x \leq y$  ili  $y \leq x$ .

**Definicija 1.2.9.** Neka su  $A$  i  $B$  neprazni skupovi. Za relaciju  $\varphi \subseteq A \times B$  kažemo da je **funkcijska relacija** ako vrijedi

$$(\forall a \in A)(\exists! b \in B)(a, b) \in \varphi$$

Funkcijsku relaciju zovemo i **funkcija (preslikavanje)**.

**Definicija 1.2.10.** Neka su  $A$  i  $B$  neprazni skupovi. Neka je  $f \subseteq A \times B$  funkcijaska relacija. Skup  $A$  zovemo **domena**, a skup  $B$  **kodomena** funkcije  $f$  i pišemo  $f : A \rightarrow B$ . Ako je  $x \in A$ , a  $y \in B$  tako da je  $(x, y) \in f$ , to označavamo kao  $y = f(x)$ .

**Definicija 1.2.11.** **Polinom  $n$ -tog stupnja** je funkcija  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0,$$

gdje je  $n \in \mathbb{N}_0$ . Brojeve  $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ , pri čemu je  $a_n \neq 0$ , zovemo **koeficijenti polinoma**,  $a_n$  **vodeći koeficijent** i  $a_0$  **slobodni koeficijent**.

**Definicija 1.2.12.** **Linearni polinom** ili **polinom prvog stupnja** je funkcija  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = a_1 x + a_0,$$

gdje je  $a_1 \neq 0$ .



### 1.3 Algebarske strukture

**Definicija 1.3.1.** Neka je  $S$  neprazan skup. Za preslikavanje  $\theta : S \times S \rightarrow S$  kažemo da je **binarna operacija** na skupu  $S$ . Svakom uređenom paru  $(x, y) \in S \times S$  binarna operacija  $\theta$  pridružuje element  $z = \theta(x, y) \in S$ , tj.  $z = x\theta y \in S$ .

**Definicija 1.3.2.** Neka je  $S$  neprazan skup. Za binarnu operaciju  $*$  na skupu  $S$  kažemo da:

- (i) je **asocijativna** ako za sve  $x, y, z \in S$  vrijedi  $x * (y * z) = (x * y) * z$ ;
- (ii) ima **neutralni element**  $e \in S$  ako je  $e \in S$  takav da za sve  $x \in S$  vrijedi  $e * x = x * e = x$ ;
- (iii) svaki element iz  $S$  ima **inverzni element** s obzirom na operaciju  $*$  ako za svaki  $x \in S$  postoji  $y \in S$  tako da je  $x * y = y * x = e$ ;
- (iv) je **komutativna** ako za sve  $x, y \in S$  vrijedi  $x * y = y * x$ .

Ako za binarnu operaciju  $*$  na skupu  $S$  vrijede svojstva (i)-(iii), tada za uređeni par  $(S, *)$  kažemo da je **grupa**. Ako vrijedi i svojstvo (iv), kažemo da je uređeni par  $(S, *)$  **komutativna ili Abelova grupa**.

**Definicija 1.3.3.** Neka su na nepraznom skupu  $S$  definirane dvije binarne operacije  $+$  i  $\cdot$ . Za uređenu trojku  $(S, +, \cdot)$  kažemo da je **prsten** ako vrijedi:

- (i)  $(S, +)$  je Abelova grupa,
- (ii) operacija  $\cdot$  je asocijativna na skupu  $S$ ,
- (iii) distributivnost operacije  $\cdot$  s obzirom na operaciju  $+$ :

$$\text{Za sve } x, y, z \in S \text{ vrijedi } a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \text{ i } (a + b) \cdot c = a \cdot b + a \cdot c.$$

Dodatno, ako je operacija  $\cdot$  komutativna, onda uređenu trojku  $(S, +, \cdot)$  nazivamo **komutativnim prstenom**, a ako operacija  $\cdot$  ima neutralni element, tada uređenu trojku  $(S, +, \cdot)$  zovemo **prstenom s jedinicom**.

**Definicija 1.3.4.** Neka je  $(S, +, \cdot)$  prsten. Neutralni element Abelove grupe  $(S, +)$  označavamo s  $0$  i zovemo **nula**, a neutralni element od  $(S, \cdot)$ , ako postoji, označavamo s  $1$  i zovemo **jedinicom**.

**Definicija 1.3.5.** Neka je  $(S, +, \cdot)$  prsten s jedinicom. Za element  $a \in S$  kažemo da je **invertibilan** ako postoji  $b \in S$  tako da vrijedi  $a \cdot b = b \cdot a = 1$ . Tada element  $b$  možemo još označiti s  $a^{-1}$ .

**Definicija 1.3.6.** *Polje je komutativni prsten s jedinicom  $(S, +, \cdot)$  u kojem je svaki element  $x \in S \setminus \{0\}$  invertibilan.*

**Definicija 1.3.7.** *Polje koje ima konačan broj elemenata zovemo **konačno polje**. Ako konačno polje sadrži  $q$  elemenata, kažemo da je to **konačno polje reda  $q$** .*

## 1.4 Osnove teorije grafova

**Definicija 1.4.1.** *Uređeni par  $(V, E)$  zovemo **graf** ako je  $V$  skup (koji zovemo **skupom vrhova**), a  $E$  je skup 1-podskupova i 2-podskupova od  $V$ , koje zovemo **bridovima**. Brid koji je 1-podskup zovemo **petljom**.*

Gornja definicija definira grafove u kojima svaka dva vrha mogu biti povezana najviše jednim neusmjerenim bridom. Ponekad se grafovi definiraju i na drugačije načine, kao u sljedećim dvjema definicijama. Prva definira grafove u kojima dva vrha mogu biti međusobno povezana višestrukim bridovima, a druga grafove u kojima su bridovi usmjereni.

**Definicija 1.4.2.** ***Multigraf** je uređeni par  $(V, E)$ , gdje je  $V$  skup (koji zovemo **skupom vrhova**), a  $E$  je multiskup čiji elementi su 1-podskupovi i 2-podskupovi od  $V$ .*

**Definicija 1.4.3.** ***Usmjereni graf** ili **digraf** je uređeni par  $(V, E)$ , gdje je  $V$  skup (koji zovemo **skupom vrhova**), a  $E$  je podskup od  $V \times V$ .*

**Napomena 1.4.4.** *Pojam **jednostavni graf** ponekad koristimo u slučaju kada želimo naglasiti da ne govorimo o digrafu ili multigrafu nego o grafu iz definicije 1.4.1.*

**Definicija 1.4.5.** *Dva su vrha u jednostavnom grafu  $(V, E)$  **susjedna** ako postoji brid koji ih spaja, tj. vrhovi  $u, v \in V$  su **susjedni** ukoliko postoji brid  $e = \{u, v\} \in E$ .*

**Definicija 1.4.6.** *Jednostavan graf u kojem je svaki par vrhova brid zovemo **potpuni graf** (ako graf ima  $n$  vrhova označavat ćemo ga s  $K_n$ ), a graf u kojem uopće nema bridova zovemo **nulgraf** (ako graf ima  $n$  vrhova označavat ćemo ga s  $N_n$ ).*

**Definicija 1.4.7.** *Neka je  $(V, E)$  jednostavan graf. Neka je  $v \in V$  vrh, a  $e \in E$  brid. Ako je  $e = \{v, v'\}$  za neki  $v' \in V$ , tada za vrh  $v$  kažemo da je **incidentan** s bridom  $e$ .*

**Definicija 1.4.8.** *Neka su  $G_1 = (V_1, E_1)$  i  $G_2 = (V_2, E_2)$  dva jednostavna grafa. Za grafove  $G_1$  i  $G_2$  kažemo da su **izomorfni** ako postoje bijekcije  $\theta : V_1 \rightarrow V_2$  i  $\phi : E_1 \rightarrow E_2$  takve da za sve  $v \in V_1$  i  $e \in E_1$  vrijedi da je  $v$  incidentan s bridom  $e$  u  $G_1$  ako i samo ako je  $\theta(v)$  incidentan s bridom  $\phi(e)$  u  $G_2$ .*

**Definicija 1.4.9.** Neka su  $G = (V, E)$  i  $G' = (V', E')$  grafovi tako da je  $V' \subseteq V$  i  $E' \subseteq E$ . Tada za graf  $G'$  kažemo da je **podgraf** grafa  $G = (V, E)$ . Za graf  $G' = (V', E')$  kažemo da je **inducirani podgraf** grafa  $G$  induciran skupom  $V' \subseteq V$  ako se  $E'$  sastoji od svih bridova iz  $G$  čija oba vrha leže u  $V'$ . Podgraf oblika  $G' = (V, E')$  zovemo **razapinjući podgraf**.

**Definicija 1.4.10.** Neka je  $G = (V, E)$  graf. Pretpostavimo da se skup vrhova  $V$  može particionirati u dva skupa  $B$  i  $C$  tako da vrijedi:

Za svaki  $e \in E$ , ako je  $e = \{u, v\}$ , onda je  $u \in B$  i  $v \in C$  ili je  $v \in B$  i  $u \in C$ ,

tj. svaki brid iz  $E$  spaja vrh iz  $B$  s vrhom iz  $C$ . Tada particiju skupa vrhova  $V$  na skupove  $B$  i  $C$  zovemo **biparticijom** od  $G$ , a graf  $G$  zovemo **bipartitnim grafom**.

**Definicija 1.4.11.** Neka je  $G = (V, E)$  bipartitni graf s biparticijom  $V = B \cup C$ . Za graf  $G$  ćemo reći da je **potpuni bipartitni graf** ako je svaki vrh iz  $B$  spojen sa svakim vrhom iz  $C$ . Za  $|B| = m$  i  $|C| = n$ , taj graf označavamo s  $K_{m,n}$  ili  $K_{n,m}$ .

**Definicija 1.4.12.** **Stupanj** (ili **valencija**) vrha  $x$  grafa  $G = (V, E)$  je broj bridova grafa  $G$  s kojima je vrh  $x$  incidentan. Graf je **regularan** ako svaki vrh grafa ima isti stupanj. Ako svaki vrh grafa ima stupanj  $d$ , kažemo da je graf  **$d$ -regularan**.

**Definicija 1.4.13.** Svaki razapinjući podgraf grafa  $G$ , tj. graf  $H$  sa skupom vrhova jednakim skupu vrhova od  $G$  i skupom bridova koji je podskup skupa bridova od  $G$ , nazivamo **faktorom** grafa  $G$ . Faktor  $H$  grafa  $G$  koji je  $k$ -regularan nazivamo  **$k$ -faktorom** grafa  $G$ . Dekompozicija grafa  $G = (V, E)$  na  $k$ -faktore, tj. skup  $k$ -faktora disjunktna unija čijih skupova bridova je  $E$ , naziva se  **$k$ -faktorizacijom**.

**Definicija 1.4.14.** Neka je  $G = (V, E)$  graf, pri čemu je  $|V| = m$  i  $|E| = n$ . **Matrica incidencije** grafa  $G$  je matrica  $M(G)$  dimenzija  $m \times n$  za koju vrijedi  $M(G) = (m_{ij})$ , gdje je  $m_{ij}$  broj koliko puta su vrh  $v_i$  i brid  $e_j$  incidentni.

**Napomena 1.4.15.** Uočimo da za gornju definiciju vrijedi  $m_{ij} \in 0, 1, 2$ , za svaki  $i$  i  $j$ .

**Definicija 1.4.16.** Neka je  $G = (V, E)$  graf, pri čemu je  $|V| = n$ . **Matrica susjedstva** grafa  $G$  je kvadratna matrica  $A(G)$  reda  $n$  za koju vrijedi  $A(G) = (a_{ij})$ , gdje je  $a_{ij}$  broj bridova koji spaja vrh  $v_i$  s vrhom  $v_j$ .

**Napomena 1.4.17.** Uočimo da je matrica susjedstva  $A(G)$  simetrična i da su joj elementi  $a_{ij}$  nenegativni cijeli brojevi za svaki  $i$  i  $j$ .

**Definicija 1.4.18.** Neka je  $G = (V, E)$  graf te neka su  $v_0, v_1, \dots, v_n \in V$  i  $e_1, e_2, \dots, e_n \in E$  tako da je  $e_i = \{v_{i-1}, v_i\}$  za sve  $i = 1, 2, \dots, n$ . Za niz  $(v_0, e_1, v_1, \dots, e_n, v_n)$  kažemo da je **šetnja** od  $v_0$  do  $v_n$ . Za šetnju ćemo reći da je **zatvorena** ako je  $v_0 = v_n$ . Šetnju u kojoj su svi bridovi međusobno različiti zovemo **staza**, a šetnju u kojoj su svi vrhovi međusobno različiti osim eventualno prvog i posljednjeg zovemo **put**. Zatvoreni put još zovemo i **ciklus**.

**Napomena 1.4.19.** Neka je dana šetnja  $(v_0, e_1, v_1, \dots, e_n, v_n)$ . Tada za šetnju  $(v_n, e_n, \dots, v_1, e_1, v_0)$  kažemo da je **suprotna šetnji**  $(v_0, e_1, v_1, \dots, e_n, v_n)$ .

**Definicija 1.4.20.** **Eulerova staza** je staza koja prolazi svim bridovima grafa. **Eulerova tura** je zatvorena Eulerova staza, a **Eulerov graf** je graf koji dopušta Eulerovu turu. **Hamiltonov put** je put koji prolazi svim vrhovima grafa. **Hamiltonov ciklus** je zatvoren Hamiltonov put, a **Hamiltonov graf** je graf koji dopušta Hamiltonov ciklus.

## Poglavlje 2

# Latinski kvadrati i ortogonalni latinski kvadrati

### 2.1 Latinski kvadrati

**Definicija 2.1.1.** Za kvadratnu matricu  $L$  reda  $n \in \mathbb{N}$  kažemo da je **latinski kvadrat** ako vrijede sljedeća svojstva:

- (i) elementi matrice  $L$  su elementi nekog  $n$ -članog skupa  $S$ ;
- (ii) u svakom retku matrice  $L$  svaki element skupa  $S$  pojavljuje se na točno jednom mjestu;
- (iii) u svakom stupcu matrice  $L$  svaki element skupa  $S$  pojavljuje se na točno jednom mjestu.

**Definicija 2.1.2.** Za latinski kvadrat  $s$  elementima iz linearno uređenog skupa  $S$  kažemo da je **reduciran** ili **standardan** ako su mu elementi prvog retka i prvog stupca u prirodnom poretku, tj. u poretku određenom uređajem na skupu  $S$ .

**Primjer 2.1.3.** Sljedeće matrice su primjeri latinskih kvadrata reda 3, pri čemu je prva matrica reduciran latinski kvadrat (s obzirom na uređaj  $\leq$  na skupu  $\{0, 1, 2\}$ ):

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a & c & b \\ b & a & c \\ c & b & a \end{pmatrix}.$$

**Napomena 2.1.4.** Uočimo da su retci i stupci latinskih kvadrata reda  $n$  permutacije  $n$ -članog skupa.

**Teorem 2.1.5.** *Za svaki prirodni broj  $n$  postoji latinski kvadrat reda  $n$ .*

*Dokaz.* Uzmimo da su elementi  $0, 1, 2, \dots, n - 1$  u tom redosljedu prvi redak kvadratne matrice reda  $n$ . Svaki sljedeći redak matrice dobivamo tako da elemente prethodnog retka pomikemo za jedno mjesto ulijevo, pri čemu prvi element u prethodnom retku postaje zadnji element u sljedećem retku. Tako dobivena matrica je očito latinski kvadrat reda  $n$ .  $\square$

**Definicija 2.1.6.** *Za latinske kvadrate reda  $n$  kažemo da su **različiti** ako se razlikuju u barem jednoj poziciji. **Broj različitih latinskih kvadrata reda  $n$**  označavamo s  $L(n)$ , dok **broj različitih reduciranih latinskih kvadrata reda  $n$**  označavamo s  $l(n)$ .*

**Teorem 2.1.7.** *Za svaki  $n \geq 2$  broj različitih latinskih kvadrata  $L(n)$  reda  $n$  dan je s*

$$L(n) = n!(n - 1)!l(n).$$

*Dokaz.* Uzmimo matrični prikaz nekog reduciranog latinskog kvadrata reda  $n$ . Ukoliko permutiramo stupce tog latinskog kvadrata, možemo dobiti  $n!$  različitih latinskih kvadrata reda  $n$ . Fiksiramo li sada prvi redak jednog od tako dobivenih latinskih kvadrata, permutirajući preostale retke dobivamo  $(n - 1)!$  novih latinskih kvadrata. S obzirom da je broj reduciranih latinskih kvadrata  $l(n)$ , slijedi tvrdnja.  $\square$

## 2.2 Ortogonalni latinski kvadrati

**Definicija 2.2.1.** *Latinski kvadrati  $A = (a_{ij})$  i  $B = (b_{ij})$  s  $n$  simbola su **ortogonalni** ako se svaki uređeni par simbola pojavljuje točno jednom među  $n^2$  parova  $(a_{ij}, b_{ij})$ ,  $i, j = 1, 2, \dots, n$ .*

**Primjer 2.2.2.** *Prikažimo dva međusobno ortogonalna latinska kvadrata reda 3.*

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Primjer 2.2.3.** *Ortogonalnost latinskih kvadrata susrećemo u poznatom Eulerovom problemu gdje treba rasporediti 36 časnika (sa 6 različitih činova i iz 6 različitih pukovnija, pri čemu je u svakoj pukovnji po jedan časnik svakog čina) u kvadratnu matricu reda 6 tako da u svakom retku i stupcu budu zastupljeni svih 6 činova i 6 pukovnija.*

*Rješenje ovog problema bila bi dva latinska kvadrata reda 6 koji bi bili međusobno ortogonalni. Tarry je 1900. godine dokazao da takvo rješenje, s obzirom da je red latinskih kvadrata 6, ne postoji.*

**Definicija 2.2.4.** Skup od najmanje dva latinska kvadrata (istog reda) sa svojstvom da je svaki par iz skupa ortogonalni par zovemo **skupom međusobno ortogonalnih latinskih kvadrata** (skraćeno **MOLS**).

**Primjer 2.2.5.** Prikažimo skup od 3 MOLS-a reda 4.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Napomena 2.2.6.** Najveći mogući broj MOLS-a reda  $n$  označavamo s  $N(n)$ .

**Teorem 2.2.7.** Za svaki prirodni broj  $n \geq 2$ , vrijedi  $N(n) \leq n - 1$ .

*Dokaz.* U svakom latinskom kvadratu  $L_1$  možemo permutirati imena njegovih  $n$  simbola tako da ne utječemo na ortogonalnost s latinskim kvadratom  $L_2$ . Analogno, možemo preimenovati simbole bilo kojeg latinskog kvadrata iz skupa MOLS-a bez da utječemo na ortogonalnost cijelog skupa. Stoga možemo preimenovati simbole u svim kvadratima skupa MOLS-a tako da im prvi redak svima bude  $0, 1, 2, \dots, n - 1$ . Tada bi jedan od prikladnih prikaza dvaju latinskih kvadrata iz tog skupa bio:

$$L_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & n-1 \\ x & - & \dots & - \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ - & - & \dots & - \end{pmatrix}, L_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & n-1 \\ y & - & \dots & - \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ - & - & \dots & - \end{pmatrix}.$$

S obzirom da ni  $x$  ni  $y$  ne smiju biti 0, jer je 0 u prvom retku i prvom stupcu i također  $x \neq y$  jer su svi istočlani uređeni parovi dobiveni superponiranjem prvih redaka, slijedi da se na prvom mjestu drugog retka može pojaviti najviše  $n - 1$  mogućih simbola, pri čemu se u različitim kvadratima na tom mjestu pojavljuju međusobno različiti simboli. Stoga je  $N(n) \leq n - 1$ .

□

**Definicija 2.2.8.** Skup od  $n - 1$  MOLS-a nazivamo **potpunim skupom MOLS-a**.

Promotrimo sada problem konstruiranja skupova MOLS-a čiji je red potencija prostog broja, točnije reda  $q = p^m$ , gdje je  $p$  prost broj, a  $m$  prirodan broj. Za rješavanje tog problema koristit ćemo linearne polinome  $ax + y$ , gdje je  $a \in \mathbb{F}_q \setminus \{0\}$  ( $\mathbb{F}_q$  je konačno polje reda  $q$ ).

Označimo retke i stupce kvadratne matrice reda  $q$  s  $q$  elemenata iz konačnog polja  $\mathbb{F}_q$ . Pretpostavimo da su oznake redaka i stupaca u istom poretku.

**Definicija 2.2.9.** Za polinom  $f(x, y)$  s koeficijentima iz  $\mathbb{F}_q$  i za sve  $a, b \in \mathbb{F}_q$ , postavimo element  $f(a, b)$  u matricu  $A$  reda  $q$  na poziciju presjeka retka označenog s  $a$  i stupca označenog s  $b$ . Kažemo da polinom  $f(x, y)$  **reprezentira** matricu  $A$ .

**Teorem 2.2.10.** Neka je  $q$  potencija prostog broja. Tada polinomi  $f_a(x, y) = ax + y$ , gdje je  $a \in \mathbb{F}_q \setminus \{0\}$ , reprezentiraju potpuni skup od  $q - 1$  MOLS-a reda  $q$ .

*Dokaz.* Prvo pokažimo da, ako je  $a \neq 0$ , polinom  $f_a(x, y) = ax + y$  reprezentira latinski kvadrat reda  $q$ . Pretpostavimo da se u pripadnom latinskom kvadratu neki od simbola iz polja  $\mathbb{F}_q$  pojavljuje dva puta u stupcu  $y_1$  (npr. na pozicijama  $(x_1, y_1)$  i  $(x_2, y_1)$ ). Tada je  $ax_1 + y_1 = ax_2 + y_1$ . Slijedi da je  $ax_1 = ax_2$ , a s obzirom da je  $a \neq 0$ , slijedi i  $x_1 = x_2$ . Dakle,  $(x_1, y_1)$  i  $(x_2, y_1)$  su iste pozicije u matrici, pa su svi simboli u stupcu  $y_1$  različiti. Slično, ako je  $ax_1 + y_1 = ax_1 + y_2$ , onda je  $y_1 = y_2$ . Dakle i simboli u retku  $x_1$  su različiti. Stoga polinom  $f_a(x, y) = ax + y$  reprezentira latinski kvadrat reda  $q$ .

Pokažimo da polinomi  $f_a(x, y)$  i  $f_b(x, y)$  reprezentiraju ortogonalne latinske kvadrate ako je  $a \neq b$ . Pretpostavimo da su  $(x_1, y_1)$  i  $(x_2, y_2)$  dvije pozicije za koje vrijedi

$$ax_1 + y_1 = ax_2 + y_2$$

$$bx_1 + y_1 = bx_2 + y_2.$$

Oduzmemo li jednadžbe, slijedi  $ax_1 - bx_1 = ax_2 - bx_2$ , tj.  $(a - b)x_1 = (a - b)x_2$ . S obzirom da je  $a \neq b$ , slijedi  $x_1 = x_2$ , a stoga i (uvrstavajući u gornje jednadžbe)  $y_1 = y_2$ . Dakle, bilo koje dvije pozicije koje sadrže isti uređeni par nisu različite, tj. latinski kvadrati su ortogonalni.  $\square$

S obzirom da smo pokazali kako konstruirati potpuni skup MOLS-a čiji je red potencija prostog broja, prirodno je postaviti pitanje o skupovima MOLS-a za latinske kvadrate čiji red nije potencija prostog broja. Kako bismo lakše mogli proučavati i konstruirati skupove MOLS-a tih redova, definirajmo Kroneckerov produkt.

**Definicija 2.2.11.** Neka je  $A$  matrica reda  $m \times n$  te neka je  $B$  matrica reda  $p \times q$ . **Kroneckerov produkt**  $A \otimes B$  je  $pm \times qn$  blok-matrica:

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{pmatrix},$$

točnije:



$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} & \cdots & a_{11}b_{1q} & \cdots & \cdots & a_{1n}b_{11} & a_{1n}b_{12} & \cdots & a_{1n}b_{1q} \\ a_{11}b_{21} & a_{11}b_{22} & \cdots & a_{11}b_{2q} & \cdots & \cdots & a_{1n}b_{21} & a_{1n}b_{22} & \cdots & a_{1n}b_{2q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{11}b_{p1} & a_{11}b_{p2} & \cdots & a_{11}b_{pq} & \cdots & \cdots & a_{1n}b_{p1} & a_{1n}b_{p2} & \cdots & a_{1n}b_{pq} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \ddots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}b_{11} & a_{m1}b_{12} & \cdots & a_{m1}b_{1q} & \cdots & \cdots & a_{mn}b_{11} & a_{mn}b_{12} & \cdots & a_{mn}b_{1q} \\ a_{m1}b_{21} & a_{m1}b_{22} & \cdots & a_{m1}b_{2q} & \cdots & \cdots & a_{mn}b_{21} & a_{mn}b_{22} & \cdots & a_{mn}b_{2q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}b_{p1} & a_{m1}b_{p2} & \cdots & a_{m1}b_{pq} & \cdots & \cdots & a_{mn}b_{p1} & a_{mn}b_{p2} & \cdots & a_{mn}b_{pq} \end{pmatrix},$$

gdje je  $a_{ij}b_{kl} := (a_{ij}, b_{kl})$ .

**Teorem 2.2.12.** *Ako postoji par MOLS-a reda  $n$  i par MOLS-a reda  $m$ , onda postoji par MOLS-a reda  $mn$ .*

*Dokaz.* Neka su  $A_1$  i  $A_2$  MOLS reda  $m$  te neka su  $B_1$  i  $B_2$  MOLS reda  $n$ . Tada je matrica  $A_1 \otimes B_1$  trivijalno latinski kvadrat reda  $mn$ . Slično, matrica  $A_2 \otimes B_2$  je također latinski kvadrat reda  $mn$ . Iz ortogonalnosti latinskih kvadrata  $A_1$  i  $A_2$  te ortogonalnosti latinskih kvadrata  $B_1$  i  $B_2$  slijedi ortogonalnost  $A_1 \otimes B_1$  i  $A_2 \otimes B_2$ .  $\square$

Uvedimo sada definiciju kongruencije kako bismo mogli iskazati i dokazati još jedan rezultat za najveći mogući broj MOLS-a reda  $n$ .

**Definicija 2.2.13.** *Neka su  $a, b \in \mathbb{Z}$ , te  $n \in \mathbb{N}$ . Kažemo da je broj  $a$  **kongruentan** broju  $b$  modulo  $n$  ako vrijedi  $n \mid a - b$ . Pišemo:  $a \equiv b \pmod{n}$ .*

**Teorem 2.2.14.** *Neka je  $n > 1$  prirodan broj. Ako je  $n \equiv 0, 1, 3 \pmod{4}$ , onda je  $N(n) \geq 2$ .*

*Dokaz.* Ako je  $n \equiv 0, 1, 3 \pmod{4}$ , tada je  $n$  ili neparan ili djeljiv s 4. U svakom slučaju, ako je  $n = q_1 \cdot \dots \cdot q_r$  faktorizacija od  $n$  u produkt potencija različitih prostih brojeva, onda je  $q_i \geq 3$ , dakle  $q_i - 1 \geq 2$  za svaki  $i = 1, \dots, r$ . Ako primijenimo teorem 2.2.10 i teorem 2.2.12, slijedi tvrdnja.  $\square$

Općenitije, za MOLS-e reda  $n$  vrijedi:

**Teorem 2.2.15.** *Neka je  $q_1 \cdot \dots \cdot q_r$  faktorizacija od  $n \in \mathbb{N}$  u potencije različitih prostih brojeva tako da je  $q_1 < \dots < q_r$ . Tada je  $N(n) \geq q_1 - 1$ .*

*Dokaz.* Za svaku potenciju prostog broja  $q_i$  možemo, po teoremu 2.2.10, sagraditi skup od  $q_i - 1$  MOLS-a reda  $q_i$ . Tada za svaki  $i > 1$  imamo da je  $q_i - 1 > q_1 - 1$ , pa ponavljajući primjenu Kroneckerovog produkta dobivamo skup od barem  $q_1 - 1$  MOLS-a reda  $n$ .  $\square$

**Napomena 2.2.16.** Proučimo svojstva za skupove MOLS-a reda  $n$  pri čemu za  $n$  vrijedi  $n \equiv 2 \pmod{4}$ . Naime, za  $n = 2$  i  $n = 6$  znamo da je  $N(n) = 1$  (za  $n = 2$  je trivijalno, dok smo slučaj  $n = 6$  susreli u primjeru 2.2.3). Za brojeve  $n = 10, 14, \dots$  vrijedi sljedeći teorem.

**Teorem 2.2.17.** Za sve prirodne brojeve  $n > 1$  osim 2 i 6 postoji par MOLS-a reda  $n$ . Posebno je za sve prirodne brojeve  $n > 1$ , osim  $n = 2$  i  $n = 6$ ,  $N(n) \geq 2$ .

Spomenimo sada još strukturu transverzalnog dizajna kojom se mnoga svojstva i rezultati za latinske kvadrate mogu pokazati.

**Definicija 2.2.18.** *Transverzalni dizajn* s  $k$   $n$ -teročlanih grupa i indeksom  $\lambda$  (u oznaci  $T[k, \lambda; n]$ ) je trojka  $(X, G, A)$  sa sljedećim svojstvima:

- (i)  $X$  je skup od  $k \cdot n$  elemenata;
- (ii)  $G = \{G_1, \dots, G_k\}$  je familija od  $k$   $n$ -teročlanih skupova, zvanih grupama, koji čine particiju od  $X$ ;
- (iii)  $A$  je familija  $k$ -članih skupova, zvanih blokovima, tako da svaki blok  $B$  u presjeku sa svakim od skupova  $G_i \in G$  ima točno jedan element i da se svaki par elemenata iz različitih grupa u  $G$  pojavljuje točno u  $\lambda$  blokova od  $A$ .

Prikažimo tablično primjer transverzalnog dizajna.

**Primjer 2.2.19.** U tablici 2.1 prikazujemo grupe i blokove transverzalnog dizajna  $T[4, 1; 3]$ .

Tablica 2.1: Transverzalni dizajn  $T[4, 1; 3]$

	$B_1 : x_{11}x_{21}x_{31}x_{41}$
	$B_2 : x_{11}x_{22}x_{32}x_{42}$
$G_1 : x_{11}x_{12}x_{13}$	$B_3 : x_{11}x_{23}x_{33}x_{43}$
$G_2 : x_{21}x_{22}x_{23}$	$B_4 : x_{12}x_{21}x_{32}x_{43}$
$G_3 : x_{31}x_{32}x_{33}$	$B_5 : x_{12}x_{22}x_{33}x_{41}$
$G_4 : x_{41}x_{42}x_{43}$	$B_6 : x_{12}x_{23}x_{31}x_{42}$
	$B_7 : x_{13}x_{21}x_{33}x_{42}$
	$B_8 : x_{13}x_{22}x_{31}x_{43}$
	$B_9 : x_{13}x_{23}x_{32}x_{41}$

Iskažimo i dokažimo teorem koji povezuje latinske kvadrate (točnije skupove MOLS-a) i transverzalni dizajn.

**Teorem 2.2.20.** *Transverzalni dizajn  $T[k, 1; n]$  postoji ako i samo ako postoji skup od  $k - 2$  MOLS-a reda  $n$ .*

*Dokaz.* Pretpostavimo da imamo transverzalni dizajn  $T[k, 1; n]$  s grupama  $G_1, \dots, G_k$  čiji su elementi označeni sa

$$G_h = \{x_{h1}, \dots, x_{hn}\}, h = 1, \dots, k.$$

Za svaki prirodan broj  $h$  tako da je  $1 \leq h \leq k - 2$  definirajmo kvadratnu matricu (reda  $n$ )  $A^{(h)} = (a_{ij}^{(h)})$  na sljedeći način. Kako je  $\lambda = 1$ , za svaki izbor  $1 \leq i, j \leq n$ , postoji jedinstveni blok  $B$  koji sadrži elemente  $x_{k-1,i}$  i  $x_{k,j}$ . Blok  $B$  sadrži točno jedan element iz  $G_h$  koji ćemo označiti s  $x_{hm}$ . Sada definirajmo  $a_{ij}^{(h)} = m$ . Da bismo pokazali da je matrica  $A^{(h)}$  zaista latinski kvadrat reda  $n$ , pretpostavimo da su dva elementa u retku  $i$  ista. Tada bismo imali da je  $a_{ij}^{(h)} = a_{il}^{(h)} =: m$ , za neke  $j \neq l$ . Dakle, postoje dva bloka (bez smanjenja općenitosti neka su to  $B_1$  i  $B_2$ ) tako da je

$$\{x_{hm}, x_{k-1,i}, x_{k,j}\} \subseteq B_1 \text{ i } \{x_{hm}, x_{k-1,i}, x_{k,l}\} \subseteq B_2.$$

S obzirom da je  $x_{k,j} \neq x_{k,l}$ ,  $B_1$  i  $B_2$  su međusobno različiti blokovi koji oba sadrže  $x_{hm}$  i  $x_{k-1,i}$ , odakle slijedi da je  $\lambda \geq 2$ , što je kontradikcija. Dakle, matrica  $A^{(h)}$  je latinski kvadrat po retcima, a slično bi se pokazalo da je i latinski kvadrat po stupcima. Dakle, za svaki  $h = 1, \dots, k - 2$ ,  $A^{(h)}$  je latinski kvadrat.

Pretpostavimo da za neke  $h \neq l$  latinski kvadrati  $A^{(h)}$  i  $A^{(l)}$  nisu ortogonalni. Tada postoje  $(i, j) \neq (u, v)$  tako da vrijedi:

$$a_{ij}^{(h)} = a_{uv}^{(h)} =: d \text{ i } a_{ij}^{(l)} = a_{uv}^{(l)} =: e.$$

Dakle, postoje blokovi  $B_1, B_2, B_3, B_4$  tako da je:

$$\{x_{hd}, x_{k-1,i}, x_{kj}\} \subseteq B_1,$$

$$\{x_{hd}, x_{k-1,u}, x_{kv}\} \subseteq B_2,$$

$$\{x_{le}, x_{k-1,i}, x_{kj}\} \subseteq B_3,$$

$$\{x_{le}, x_{k-1,u}, x_{kv}\} \subseteq B_4.$$

Kako je  $\lambda = 1$ , znamo da je  $B_1 = B_3$  i  $B_2 = B_4$ . Iz toga slijedi da je

$$\{x_{hd}, x_{le}, x_{k-1,i}, x_{kj}\} \subseteq B_1, \{x_{hd}, x_{le}, x_{k-1,u}, x_{kv}\} \subseteq B_2.$$

Uočimo da se elementi  $x_{hd}$  i  $x_{le}$  pojavljuju u oba bloka, a to je kontradikcija. Slijedi da su  $A^{(h)}$  i  $A^{(l)}$  međusobno ortogonalni latinski kvadrati reda  $n$ .

Obratno, počevši od  $k - 2$  MOLS-a reda  $n$  možemo inverznim postupkom konstruirati transverzalni dizajn  $T[k, 1; n]$  čime je teorem dokazan.  $\square$

Primijenimo prethodni teorem na transverzalni dizajn iz primjera 2.2.19.

**Primjer 2.2.21.** *Ako na transversalni dizajn  $T[4, 1; 3]$  iz primjera 2.2.19 primijenimo prethodni teorem, dobit ćemo matrice  $A^{(1)}$  i  $A^{(2)}$  koje čine skup MOLS-a reda 3. Odredimo simbole na poziciji  $(1, 1)$  ovih matrica. S obzirom da su (po prethodnom teoremu)  $i, j = 1$ , pogledajmo elemente  $x_{31}$  i  $x_{41}$ . Oba elementa nalaze se u bloku  $B_1$  zajedno s elementima  $x_{11}$  i  $x_{21}$ . Dakle, u matrici  $A^{(1)}$  na poziciji  $(1, 1)$  bit će simbol 1, a u matrici  $A^{(2)}$  na poziciji  $(1, 1)$  bit će simbol 1. U sljedećoj tablici prikazana je potpuna konstrukcija matrica  $A^{(1)}$  i  $A^{(2)}$ .*

Tablica 2.2

Pozicija	Koordinatni elementi	Elementi presjeka	Matrice
(1, 1)	$x_{31}, x_{41} \in B_1$	$x_{11}, x_{21}$	$A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$
(1, 2)	$x_{31}, x_{42} \in B_6$	$x_{12}, x_{23}$	
(1, 3)	$x_{31}, x_{43} \in B_8$	$x_{13}, x_{22}$	
(2, 1)	$x_{32}, x_{41} \in B_9$	$x_{13}, x_{23}$	
(2, 2)	$x_{32}, x_{42} \in B_2$	$x_{11}, x_{22}$	
(2, 3)	$x_{32}, x_{43} \in B_4$	$x_{12}, x_{21}$	
(3, 1)	$x_{33}, x_{41} \in B_5$	$x_{12}, x_{22}$	
(3, 2)	$x_{33}, x_{42} \in B_7$	$x_{13}, x_{21}$	
(3, 3)	$x_{33}, x_{43} \in B_3$	$x_{11}, x_{23}$	

## Poglavlje 3

# Grafovi i latinski kvadrati

### 3.1 Latinski kvadrati i bipartitni grafovi

Pretpostavimo da imamo potpuni bipartitni graf  $G$  čiji je skup vrhova  $V$  particioniran u dva podskupa  $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$  i  $W = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$  tako da nijedan brid ne povezuje dva vrha iz  $U$  ili dva vrha iz  $W$ . Pretpostavku da vrijedi  $|U| = |W| = n$  uzimamo kako bismo retke latinskog kvadrata  $L$  reda  $n$  mogli reprezentirati elementima iz  $U$ , a stupce ćemo reprezentirati elementima iz  $W$ . Naime, ako je na poziciji  $(i, j)$  matrice  $L$  simbol  $k$ , tada brid boje  $k$  spaja vrhove  $u_i$  i  $w_j$ . Dakle, bridovi su obojeni jednom od  $n$  boja, ali na način da svaki vrh ima točno jedan incidentan brid svake boje.

Iskažimo (i dokažimo) teoremom povezanost latinskih kvadrata reda  $n$  i potpunih bipartitnih grafova  $K_{n,n}$ .

**Teorem 3.1.1.** *Latinski kvadrat reda  $n$  ekvivalentan je 1-faktorizaciji od  $K_{n,n}$ .*

*Dokaz.* S obzirom da se svaki simbol pojavljuje točno jednom u svakom retku i stupcu latinskog kvadrata, svaki vrh u izvedenom bipartitnom grafu ima po točno jedan incidentni brid svake od  $n$  boja. Stoga svaki simbol stvara jednobojni 1-faktor.

Obratno, neka je  $G$  potpuni bipartitni graf  $K_{n,n}$  i neka je zadana njegova 1-faktorizacija. Primijetimo da se ona sastoji od  $n$  1-faktora. Obojimo bridove grafa  $G$  s  $n$  boja tako da bridovi koji pripadaju međusobno različitim 1-faktorima budu obojeni međusobno različitim bojama. Neaka je skup vrhova  $V$  particioniran u skupove  $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$  i  $W = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$  kao gore. Postavimo li za sve  $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$  simbol  $k$  na poziciju  $(i, j)$  kvadratne matrice reda  $n$ , ako postoji brid boje  $k$  koji spaja vrhove  $u_i$  i  $w_j$ , tada očito svaki redak i stupac nastale matrice sadrži svaki od  $n$  simbola za boje točno jednom, dakle konstruirana kvadratna matrica je latinski kvadrat reda  $n$ .

S obzirom da su opisana pridruživanja 1-faktorizacije grafa  $K_{n,n}$  latinskom kvadratu reda  $n$  i obratno očito međusobno inverzna, tvrdnja slijedi.  $\square$

Ukoliko bipartitni graf  $G$  ima skup vrhova  $V$  koji je particioniran u dva podskupa koji nisu jednakobrojni, potrebna je struktura tzv. latinskog pravokutnika kako bismo mogli dobiti ekvivalenciju iz prethodnog teorema.


**Definicija 3.1.2.** *Latinski pravokutnik s  $r$  redaka i  $n \geq r$  stupaca je  $r \times n$  matrica  $R$  koja sadrži  $n$  simbola tako da svaki redak sadrži sve simbole, a niti jedan stupac ne sadrži niti jedan simbol više od jedanput.*

Pokažimo na primjeru ekvivalenciju između latinskog pravokutnika s 2 retka i 4 stupca i potpunog bipartitnog grafa  $K_{2,4}$ .

**Primjer 3.1.3.** *Neka je zadan latinski pravokutnik*

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

*Odgovarajuća 1-faktorizacija potpunog bipartitnog grafa  $K_{2,4}$  prikazana je na slici 3.1.*



Slika 3.1: 1-faktorizacija potpunog bipartitnog grafa  $K_{2,4}$

Pokažimo da je moguće svaki latinski pravokutnik dimenzija  $r \times n$ , gdje je  $r < n$ , dopuniti do latinskog kvadrata reda  $n$  tako da latinskom pravokutniku dodamo odgovarajućih  $n - r$  redaka.

**Lema 3.1.4.** *Neka je  $R$  latinski pravokutnik s  $r$  redaka i  $n$  stupaca ( $r < n$ ). Tada se u bilo kojem skupu od  $k \leq n$  stupaca barem u jednom od tih  $k$  stupaca ne pojavljuje barem  $k$  simbola iz latinskog pravokutnika  $R$ .*

*Dokaz.* U svakom stupcu  $i$  latinskog pravokutnika  $R$  ne pojavljuje se  $n-r$  simbola. Označimo sa  $S_i$  skup tih simbola za svaki stupac  $i = 1, 2, \dots, n$ . S obzirom da se u svakom retku svaki simbol pojavljuje točno jedanput, tj. pojavljuje se  $r$  puta u latinskom pravokutniku  $R$ , slijedi da svaki simbol nedostaje u  $n-r$  stupaca. Dakle, svaki simbol se pojavljuje  $n-r$  puta kroz sve skupove  $S_i$ . Ako izaberemo  $k$  ( $1 \leq k \leq n$ ) stupaca, pripadajući skupovi  $S_i$  će zajedno sadržavati ukupno  $k(n-r)$  simbola. S obzirom da se svaki simbol pojavljuje  $n-r$  puta kroz sve skupove  $S_i$ , nijedan simbol neće se pojaviti više od  $n-r$  puta u izabranim  $k$  skupova  $S_i$ . Stoga možemo zaključiti da će od svih  $k(n-r)$  simbola u izabranim  $k$  skupova  $S_i$  njih barem  $k$  različitih biti zastupljeno.  $\square$

**Lema 3.1.5.** *Neka je  $G = (V, E)$  bipartitni graf s konačnim skupom vrhova  $V = U \cup W$ , pri čemu svaki brid  $e \in E$  povezuje neki vrh iz  $U$  s nekim vrhom iz  $W$ , i vrijedi  $|U| = |W|$ . Pretpostavimo da vrijedi sljedeći uvjet:*

(\*) *Za svaki prirodan broj  $k \leq |U|$ , bilo kojih  $k$  vrhova iz  $U$  kolektivno je povezano barem s  $k$  vrhova iz  $W$ . Preciznije, za svaki  $S \subseteq U$  vrijedi*

$$|\{w \in W : \{u, w\} \in E \text{ za neki } u \in S\}| \geq |S|.$$

*Tada postoji 1-faktor grafa  $G$ .*

*Dokaz.* Indukcijom po  $n := |U|$ . Za  $n = 1$  tvrdnja očito vrijedi.

Neka je  $n \in \mathbb{N}$ , i pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za sve bipartitne grafove kao u lemi tako da je  $|U| \leq n$ . Neka je  $G$  graf kao u lemi takav da je  $|U| = n + 1$ . Razlikujemo dva slučaja:

(i) Za svaki prirodan broj  $k \leq n$ , bilo kojih  $k$  vrhova iz  $U$  kolektivno je povezano barem s  $k + 1$  vrhova iz  $W$ . U ovom slučaju, izbacimo li iz grafa  $G$  jedan brid  $\{u_p, w_q\}$  i njemu incidentne vrhove  $u_p$  i  $w_q$ , dobivamo bipartitni graf  $G'$  u kojem vrijedi:

Za svaki prirodan broj  $k \leq n$ , bilo kojih  $k$  vrhova iz  $U' = U \setminus \{u_p\}$  kolektivno je povezano s barem  $k$  vrhova iz  $W' = W \setminus \{w_q\}$ .

S obzirom da je  $|U'| = |W'| = n$ , po pretpostavci indukcije postoji 1-faktor grafa  $G'$ . Dodamo li mu brid  $\{u_p, w_q\}$ , dobivamo 1-faktor grafa  $G$ .

(ii) Postoji prirodni broj  $k \leq n$  i  $k$  vrhova  $u_j$  iz  $U$  koji su kolektivno povezani točno s  $k$  vrhova  $w_j$  iz  $W$ . Neka su:

- $G'$  bipartitni graf koji se iz grafa  $G$  dobije izbacivanjem gore spomenutih  $k$  vrhova  $u_j$  i pripadnih  $k$  vrhova  $w_j$
- $G''$  bipartitni graf koji se iz grafa  $G$  dobije izbacivanjem svih vrhova osim gore spomenutih  $k$ -vrhova  $u_j$  i pripadnih  $k$  vrhova  $w_j$ .

Da bismo pronašli 1-faktor grafa  $G$ , dovoljno je pronaći 1-faktore grafova  $G'$  i  $G''$  (oni će zajedno činiti 1-faktor grafa  $G$ ). 1-faktori  $G'$  i  $G''$  postoje po pretpostavci indukcije. Primijetimo da je indukcija primjenjiva na graf  $G''$  jer on od grafa  $G$  očito nasljeđuje uvjet (\*). Preostaje pokazati da uvjet (\*) zadovoljava i graf  $G'$ , tj. da je za svaki prirodan broj  $h \leq n + 1 - k$  bilo kojih  $h$  vrhova  $u_j \in U$  u  $G'$  kolektivno povezano barem s  $h$  vrhova  $w_j \in W$  u  $G'$ . Pretpostavimo suprotno, tj. da postoji prirodan broj  $h \leq n + 1 - k$  i  $h$  vrhova  $u_j \in U$  u  $G'$  koji su kolektivno povezani sa strogo manje od  $h$  vrhova  $w_j \in W$  u  $G'$ . Pridodamo li ovih  $h$  vrhova  $u_j$  iz  $G'$   $k$  vrhova  $u_j$  koje smo izbacili prilikom konstrukcije grafa  $G'$ , dobivamo  $h + k$  vrhova  $u_j$  iz  $U$  koji su u grafu  $G$  kolektivno povezani sa strogo manje od  $h + k$  vrhova  $w_j \in W$ , a to je kontradikcija.

□

**Teorem 3.1.6.** *Neka je  $R$  latinski pravokutnik dimenzija  $r \times n$ , pri čemu su  $r$  i  $n$  prirodni brojevi za koje vrijedi  $r < n$ . Latinskom pravokutniku  $R$  uvijek možemo dodati novi redak tako da dobijemo novi latinski pravokutnik  $R'$  dimenzija  $(r + 1) \times n$ .*

*Dokaz.* Bez smanjenja općenitosti pretpostavimo da je  $R$  popunjen simbolima  $1, \dots, n$ . Neka je  $G(R)$  bipartitan graf sa skupom vrhova  $V = U \cup W$ , gdje je  $U = \{u_1, \dots, u_n\}$  i  $W = \{w_1, \dots, w_n\}$ , a brid  $\{u_i, w_j\}$  je prisutan ako i samo ako se u  $i$ -tom stupcu latinskog pravokutnika  $R$  ne pojavljuje simbol  $j$ . Po lemi 3.1.4 graf  $G(R)$  zadovoljava uvjet (\*) leme 3.1.5 pa po toj lemi postoji 1-faktor  $F$  grafa  $G(R)$ . Pomoću 1-faktora  $F$  sad možemo konstruirati redak čijim dodavanjem latinski pravokutnik  $R$  prelazi u latinski pravokutnik  $R'$ , po sljedećem principu: za svaki brid  $\{u_i, w_j\}$  1-faktora  $F$  u  $i$ -ti stupac novog retka stavimo simbol  $j$ .

□

Ako postupak iz prethodnog teorema ponovimo  $n - r$  puta počevši od latinskog pravokutnika dimenzija  $r \times n$  ( $r < n$ ), dobit ćemo latinski kvadrat. Iskažimo to u sljedećem korolaru.

**Korolar 3.1.7.** *Neka za prirodne brojeve  $r$  i  $n$  vrijedi  $r < n$ . Latinski pravokutnik dimenzija  $r \times n$  može se dopuniti do latinskog kvadrata reda  $n$  dodavanjem  $n - r$  redaka.*

Iskažimo sada još jedan rezultat povezanosti latinskih kvadrata reda  $n$  i potpunih bipartitnih grafova  $K_{n,n}$ .

**Teorem 3.1.8.** *Neka je zadan latinski kvadrat reda  $n$ . Postoji latinski kvadrat s kojim je on ortogonalan ako i samo ako za pripadajući potpuni bipartitni graf  $K_{n,n}$  postoji 1-faktorizacija tako da svaki 1-faktor sadrži bridove svih boja.*



## 3.2 Latinski kvadrati i faktorizacija potpunih grafova

U ovom poglavlju proučit ćemo vezu između broja različitih latinskih kvadrata i faktorizacije (potpunih) grafova. Promotrimo sljedeći primjer.

**Primjer 3.2.1.** *Neka su zadane sljedeće matrice:*

$$L_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, L_2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, L_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}, L_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vidimo da smo matricu (tj. latinski kvadrat reda 4)  $L$  dobili superponiranjem matrica  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$  i  $L_4$ . Prikažimo matrice  $L_i$ ,  $i = 1, 2, 3, 4$  pomoću usmjerenih grafova, pri čemu su vrhovi usmjerenog grafa pridruženog matrici  $L_i$  brojevi 1, 2, 3, 4, a brid  $(j, k)$  u tom grafu postoji ako i samo ako je  $(L_i)_{j,k} \neq 0$ .


Pogledamo li svaku od matrica  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$  i  $L_4$  u pripadnim grafičkim reprezentacijama (slika 3.2), uočavamo da je svaka od njih 1-faktor potpunog usmjerenog grafa s 4 vrha. Obojimo bridove svakog od tih 1-faktora jednom bojom, pri čemu bridove međusobno različitih 1-faktora obojimo međusobno različitim bojama.

Kvadratnu matricu (latinski kvadrat)  $L$  reda  $n$  dobili smo superponiranjem matrica  $L_1, L_2, L_3$  i  $L_4$ , slijedi da bismo pripadni graf za matricu  $L$  dobili superponiranjem grafova prikazanih na slici 3.2 i za takav graf vrijede sljedeća svojstva:

- (i) Postoji usmjereni brid iz svakog vrha  $i$  u svaki vrh  $j$ , za  $i, j = 1, 2, 3, 4$ .
- (ii) Svaki usmjereni brid je u jednoj od 4 boje.
- (iii) Točno jedan brid svake boje ulazi u svaki od vrhova i točno jedan brid svake boje izlazi iz svakog od vrhova.

**Napomena 3.2.2.** U prethodnom primjeru uočavamo da naš usmjereni graf sadrži petlje koje smo definirali u definiciji 1.4.1. Potpuni usmjereni graf (koji sadrži petlje) s  $n$  vrhova označavat ćemo s  $\vec{K}_n$ .

Dakle, slika 3.2 prikazuje 1-faktorizaciju od  $\vec{K}_4$  dobivenu iz latinskog kvadrata  $L$ . Za svaki od dobivenih 1-faktora možemo reći da su mu bridovi jednobojni jer su određeni istim



Slika 3.2: Grafički prikaz matrica  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$  i  $L_4$

simbolom iz matrice  $L$ . Na isti način, za svaki latinski kvadrat reda  $n$  možemo odrediti pripadnu 1-faktorizaciju potpunog usmjerenog grafa  $\vec{K}_n$  s označenim vrhovima.

U sljedećem primjeru ćemo pokazati da dva različita latinska kvadrata istog reda mogu imati istu pripadnu 1-faktorizaciju potpunog usmjerenog grafa.

**Primjer 3.2.3.** *Neka su zadani latinski kvadrati (reda 4):*

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ukoliko u latinskom kvadratu  $A_1$  zamijenimo simbole 1 i 2, dobit ćemo upravo latinski kvadrat  $A_2$ . Stoga su 1-faktorizacije dobivene iz ovih latinskih kvadrata ekvivalentne. Naime, jednu 1-faktorizaciju možemo dobiti iz druge permutacijom boja bridova.

Kako bismo izbjegli slučajeve kao u gornjem primjeru, ponovno ćemo koristiti reducirane (standardne) latinske kvadrate.

**Teorem 3.2.4.** *Neka je  $\vec{K}_n$  potpuni usmjereni graf s  $n$  vrhova. Broj 1-faktorizacija od  $\vec{K}_n$  dan je s  $\vec{F}_n = L(n)/n! = (n-1)!l(n)$ , gdje je  $L(n)$  broj latinskih kvadrata reda  $n$ , a  $l(n)$  broj reduciranih latinskih kvadrata reda  $n$ .*

*Dokaz.* Po teoremu 2.1.7 znamo da je  $L(n) = n!(n-1)!l(n)$ . Za svaku 1-faktorizaciju 1-faktore možemo obojiti u  $n$  boja na  $n!$  načina. S obzirom da različito obojeni 1-faktori u 1-faktorizaciji određuju različite latinske kvadrate, slijedi  $\vec{F}_n = L(n)/n! = (n-1)!l(n)$ .  $\square$

**Korolar 3.2.5.** *Broj 1-faktorizacija od  $\vec{K}_n$  jednak je broju latinskih kvadrata reda  $n$  s fiksim prvim retkom.*

*Dokaz.* Prvi redak latinskog kvadrata reda  $n$  možemo odabrati na  $n!$  načina, stoga slijedi da je broj latinskih kvadrata reda  $n$  s fiksim prvim retkom upravo  $L(n)/n!$ .  $\square$

Označimo sada s  $\vec{K}'_n$  potpuni usmjereni graf bez petlji. Obojimo njegove 1-faktore na način da brid iz vrha 1 do vrha  $i$  bude obojen bojom  $i-1$  (pri čemu je  $i = 1, 2, \dots, n$ ). Matrični zapis dobiven postavljenjem simbola  $k$  na poziciju  $(i, j)$ , ako brid boje  $k$  ide iz vrha  $i$  u vrh  $j$ , je latinski kvadrat reda  $n$ . Takav latinski kvadrat ima prvi redak u prirodnom poretku i nule na glavnoj dijagonali (nule predstavljaju odsutnost petlji).

**Definicija 3.2.6.** *Za latinski kvadrat s istim simbolom na glavnoj dijagonali kažemo da je unipotentan.*

Ako spomenutom matričnom zapisu (latinskom kvadratu) 1-faktorizacije od  $\vec{K}'_n$  permutiramo retke tako da prvi stupac ima simbole u prirodnom poretku, dobit ćemo reducirani latinski kvadrat. Dakle, iz svakog unipotentnog latinskog kvadrata kojemu je prvi redak u prirodnom poretku permutiranjem redaka možemo dobiti točno jedan reducirani latinski kvadrat istog reda i obratno. Naime, od svakog reduciranog latinskog kvadrata točno jednom permutacijom redaka možemo dobiti unipotentan latinski kvadrat istog reda.

**Primjer 3.2.7.** *Neka je zadan reducirani latinski kvadrat*

$$L_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ako na retke tog latinskog kvadrata primijenimo permutaciju  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ , dobit ćemo unipotentni latinski kvadrat

$$L_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Iz prethodnog primjera i korolara 3.2.5 prirodno slijedi sljedeći teorem.

**Teorem 3.2.8.** *Neka je  $\vec{K}'_n$  potpuni usmjereni graf. Sljedeći brojevi su jednaki:*

- (i) broj 1-faktorizacija od  $\vec{K}'_n$ ,
- (ii) broj unipotentnih latinskih kvadrata reda  $n$  sa simbolima prvog retka u prirodnom poretku,
- (iii) broj reduciranih latinskih kvadrata reda  $n$ .

Promotrimo sada potpune grafove s  $n$  vrhova ( $K_n$ ). Počnimo s egzistencijom 1-faktorizacije potpunog grafa.

**Teorem 3.2.9.** *1-faktorizacija potpunog grafa  $K_n$  s  $n$  vrhova postoji ako i samo ako je  $n$  paran broj.*

*Dokaz.* S obzirom da u 1-faktoru potpunog grafa svaki vrh ima stupanj 1, slijedi da ne postoji par bridova u 1-faktoru koji su incidentni s istim vrhom. Dakle, svaki brid 1-faktora je incidentan s dva vrha, koji su onda susjedni, tj. svaki vrh ima točno jedan susjedni vrh. Ako uzmemo da je broj bridova u 1-faktoru jednak  $m$ , tada imamo  $2m$  vrhova.


Pretpostavimo sada da za broj vrhova  $n$  vrijedi  $n = 2m$ , gdje je  $m$  prirodni broj. Označimo vrhove s  $\{\infty, 0, 1, 2, \dots, 2m-2\}$ . Tada bridove 1-faktora  $F_i$ , za  $i = 0, 1, \dots, 2m-2$ , možemo odrediti na sljedeći način:

$$F_i = \{\{\infty, i\}, \{i+1, 2m-2+i\}, \{i+2, 2m-3+i\}, \dots, \{m-1+i, m+i\}\},$$

gdje se zbrajanje izvodi modulo  $2m-1$ . Uočimo da takvih 1-faktora ima  $2m-1$ .  $\square$

Pokažimo prethodni teorem na primjeru.

**Primjer 3.2.10.** Neka je zadan potpuni graf sa 6 vrhova, tj.  $K_6$ . Neka su njegovi 1-faktori prikazani na slici 3.3.



Slika 3.3: 1-faktori od  $K_6$ , koji čine jednu 1-faktorizaciju grafa  $K_6$

Tada bi pripadni latinski kvadrat reda 6 pridružen ovoj 1-faktorizaciji na način analogan ranijem bio:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 3 & 4 & 5 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 5 & 1 & 4 \\ 3 & 4 & 5 & 0 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 1 & 2 & 0 & 3 \\ 5 & 2 & 4 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Uočimo da je ovaj latinski kvadrat reduciran, unipotentan i simetričan.

**Napomena 3.2.11.** Ako vrhove označimo i poredamo, a bridove obojimo na isti način kao u prethodnom teoremu i primjeru za bilo koji potpuni graf  $K_{2m}$ , uvijek ćemo dobiti reducirani, simetrični i unipotentni latinski kvadrat reda  $2m$ .

Dakle, vrijedi sljedeći teorem.

**Teorem 3.2.12.** Broj 1-faktorizacija potpunog grafa s  $2m$  vrhova ( $K_{2m}$ ) jednak je broju reduciranih, simetričnih i unipotentnih latinskih kvadrata reda  $2m$ .

### 3.3 Latinski kvadrati potpunog retka i putevi u grafu

U ovom poglavlju proučavat ćemo latinske kvadrate potpunog retka (stupca) i njihovu povezanost s putevima usmjerenih grafova.

**Definicija 3.3.1.** Neka je dan latinski kvadrat  $L$  reda  $n$  i neka uređeni par  $(i, j)$  predstavlja poziciju u  $i$ -tom retku i  $j$ -tom stupcu tog latinskog kvadrata. Za latinski kvadrat kažemo da je **potpunog retka** ako za svaki uređeni par  $(a, b)$  različitih simbola postoji redak  $i$  i stupac  $j$  tako da se simbol  $a$  nalazi na poziciji  $(i, j)$ , a simbol  $b$  na susjednoj poziciji u istom retku  $(i, j + 1)$ .

**Primjer 3.3.2.** Primjer latinskog kvadrata potpunog retka je:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

**Definicija 3.3.3.** Za latinski kvadrat kažemo da je **potpunog stupca** ako za svaki uređeni par  $(a, b)$  različitih simbola postoji redak  $i$  i stupac  $j$  tako da se simbol  $a$  nalazi na poziciji  $(i, j)$ , a simbol  $b$  na susjednoj poziciji u istom stupcu  $(i + 1, j)$ .

**Definicija 3.3.4.** Latinski kvadrat koji je potpunog retka i stupca zovemo **potpuni latinski kvadrat**.

Neka je zadan potpuni usmjereni graf bez petlji s  $n$  vrhova  $(\vec{K}'_n)$ . Proizvoljan (nezatvoren) Hamiltonov put u tom grafu je niz od  $n$  vrhova, što je zapravo permutacija od  $n$  simbola koji predstavljaju vrhove. S obzirom da potpuni usmjereni graf bez petlji  $\vec{K}'_n$  ima  $n(n - 1)$  bridova, a svaki Hamiltonov put u tom grafu ima  $n - 1$  različitih bridova, tada bridove od  $\vec{K}'_n$  možda možemo particionirati u  $n$  skupova tako da svaki od njih sadrži bridove koji zajedno s pripadajućim incidentnim vrhovima čine Hamiltonov put.

Iskažimo teoremom povezanost egzistencije latinskih kvadrata potpunog retka i dekompozicije  $\vec{K}'_n$  u  $n$  disjunktnih Hamiltonovih puteva.

**Teorem 3.3.5.** Ako postoji latinski kvadrat potpunog retka reda  $n$ , onda postoji dekompozicija od  $\vec{K}'_n$  na  $n$  disjunktnih Hamiltonovih puteva.

*Dokaz.* Neka postoji latinski kvadrat potpunog retka reda  $n$ . Tada svaki redak takvog latinskog kvadrata možemo promatrati kao permutaciju vrhova koji određuju jedan Hamiltonov put. S obzirom da se svaki uređeni par simbola pojavljuje točno jednom u latinskom kvadratu (u nekom od redaka), svaki od bridova grafa  $\vec{K}'_n$  pojavljuje se u točno jednom od Hamiltonovih puteva.  $\square$

Egzistenciju latinskih kvadrata potpunog retka parnog reda dokazat ćemo u sljedećem teoremu.

**Teorem 3.3.6.** *Neka je latinski kvadrat  $L$  reda  $2m$  za prirodan broj  $m$ . Neka je prvi red latinskog kvadrata  $L$  dan s*

$$0, 1, 2m - 1, 2, 2m - 2, 3, 2m - 3, \dots, m - 1, m + 1, m$$

*i neka za svaki sljedeći redak  $k$ ,  $k = 2, \dots, 2m$ , elemente dobivamo tako da svakom elementu prethodnog retka dodajemo 1 modulo  $2m$ . Tako dobiven latinski kvadrat  $L$  je potpunog retka.*

*Dokaz.* Očito je  $L$  latinski kvadrat s obzirom da se svaki redak (stupac) mora sastojati od elementa  $0, 1, \dots, 2m - 1$ . Pogledajmo razlike (modulo  $2m$ ) između uzastopnih članova prvog retka:

$$1, 2m - 2, 3, 2m - 4, 5, 2m - 6, \dots, 2, 2m - 1.$$

Uočavamo da su razlike dobivene na ovaj način međusobno različite. Označimo li s  $l_{i,j}$  element latinskog kvadrata  $L$  na poziciji  $(i, j)$ , možemo primijetiti da modulo  $2m$  vrijedi

$$(*) \quad l_{i,j+1} - l_{i,j} = l_{1,j+1} - l_{1,j} \text{ za svaki } i = 2, \dots, 2m \text{ i } j = 1, \dots, 2m - 1.$$

Neka je  $a$  simbol latinskog kvadrata  $L$ . S obzirom da se u svakom stupcu simbol  $a$  mora pojaviti točno jednom, simbol desno od  $a$  jednoznačno je određen s  $(*)$  ovisno u kojem se stupcu simbol  $a$  nalazi.  $\square$

Za latinske kvadrate neparnog reda egzistencija latinskog kvadrata potpunog retka proučava se za svaki red posebno. Za latinske kvadrate reda 3, 5 i 7 ne postoje latinski kvadrati potpunog retka, ali zato postoji latinski kvadrat reda 9 koji je potpunog retka.

Sada možemo pokazati kako iz latinskih kvadrata potpunog retka možemo dodatno dobiti latinski kvadrat potpunog stupca, tj. potpuni latinski kvadrat.

**Teorem 3.3.7.** *Neka je  $L$  latinski kvadrat potpunog retka reda  $n$  iz teorema 3.3.6. Ako se retci od  $L$  permutiraju tako da prvi stupac novodobivenog latinskog kvadrata  $L'$  bude jednak prvom retku od  $L$ , tada je  $L'$  potpuni latinski kvadrat.*

*Dokaz.* Ako retke latinskog kvadrata  $L$  iz teorema 3.3.6 permutiramo, nećemo narušiti potpunost po retcima. U  $L'$  razlike između susjednih članova unutar prvog stupca su različite i vrijedi

$$l'_{i+1,1} - l'_{i,1} = l'_{i+1,j} - l'_{i,j},$$

gdje je  $l'_{i,j}$  simbol na poziciji  $(i, j)$  od  $L'$ . Analogno dokazu iz teorema 3.3.6 slijedi da je  $L'$  latinski kvadrat potpunog stupca, tj. da je potpuni latinski kvadrat.  $\square$

Pokažimo na primjeru prethodno dobivene rezultate.

**Primjer 3.3.8.** *Latinski kvadrat  $L$  potpunog retka reda 6 dobiven pomoću teorema 3.3.6 je:*

$$L = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 5 & 2 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 5 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 0 & 5 \\ 3 & 4 & 2 & 5 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 3 & 0 & 2 & 1 \\ 5 & 0 & 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad (3.1)$$


*a odgovarajući Hamiltonovi putevi dobiveni iz redaka ovog latinskog kvadrata su prikazani na slici 3.4.*

*Ako na taj latinski kvadrat primijenimo teorem 3.3.7, dobit ćemo potpuni latinski kvadrat reda 6:*

$$L' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 5 & 2 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 5 & 4 \\ 5 & 0 & 4 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 0 & 5 \\ 4 & 5 & 3 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 & 5 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Do sada smo proučavali Hamiltonov put kao redak latinskog kvadrata potpunog retka, proširimo sada to na Hamiltonove cikluse. Neka je  $\vec{K}'_{2m}$  potpuni usmjereni graf bez petlji s  $2m$  vrhova. S obzirom da smo do sada vrhove ovakvog grafa označavali s  $0, 1, \dots, 2m - 1$ , ako mu dodamo novi vrh (u oznaci  $2m$ ) i pripadajuće bridove od (do) svih dosadašnjih vrhova, dobit ćemo potpuni usmjereni graf bez petlji s  $2m + 1$  vrhova, tj.  $\vec{K}'_{2m+1}$ . Ako je put  $v_{i_0}, v_{i_1}, \dots, v_{i_{2m-1}}$  Hamiltonov u  $\vec{K}'_{2m}$ , tada je očito put  $v_{i_0}, v_{i_1}, \dots, v_{i_{2m-1}}, v_{i_{2m}}, v_{i_0}$  Hamiltonov ciklus u  $\vec{K}'_{2m+1}$ .





Slika 3.4: Hamiltonovi putevi iz redaka latinskog kvadrata  $L$  danog formulom 3.1

Kada bismo isto htjeli primijeniti na latinske kvadrate potpunog retka, Hamiltonove puteve bismo zatvorili, tj. pretvorili u Hamiltonove cikluse tako da latinskom kvadratu potpunog retka reda  $2m$  dodamo  $(2m + 1)$ -vi stupac sa svim istim elementima, tj. popunjen elementom  $2m$ . Tada dobivamo pravokutnu matricu  $R$  dimenzija  $2m \times (2m + 1)$ . Svaki od redaka tako dobivene pravokutne matrice interpretiramo kao permutaciju koja je ciklus, tj. interpretiramo kao Hamiltonov ciklus kao i gore. Pokažimo na primjeru.

**Primjer 3.3.9.** *Neka ja dan latinski kvadrat potpunog retka reda 4:*

$$L = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

*Pripadna pravokutna matrica dimenzija  $4 \times 5$  je:*

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 0 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 3 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

*Ova pravokutna matrica daje dekompoziciju od  $\vec{K}'_5$  na Hamiltonove cikluse.*

Gornja diskusija dokazuje sljedeći teorem.

**Teorem 3.3.10.** *Neka je  $m \in \mathbb{N}$ . Postoji dekompozicija:*

(i) *od  $\vec{K}'_{2m}$  u  $2m$  disjunktних Hamiltonovih puteva;*

(ii) *od  $\vec{K}'_{2m+1}$  u  $2m$  disjunktних Hamiltonovih ciklusa.*

**Lema 3.3.11.** *Neka je  $L$  latinski kvadrat potpunog retka reda  $2m$  iz teorema 3.3.6. Prvih  $m$  redaka od  $L$  u obrnutom poretku su isti kao posljednjih  $m$  redaka od  $L$ .*

*Dokaz.* Po teoremu 3.3.6 znamo konstruirati drugi, treći, ...,  $(2m)$ -ti redak pribrajujući 1 (modulo  $2m$ ) elementima prethodnog retka, pri čemu je prvi redak:

$$0, 1, 2m - 1, 2, 2m - 2, 3, 2m - 3, \dots, m - 1, m + 1, m.$$

Prema tome, ako svakom od elemenata prvog retka dodamo  $m$  (modulo  $2m$ ), dobijemo elemente  $(m + 1)$ -og retka:

$$m, m + 1, m - 1, \dots, 2m - 3, 3, 2m - 2, 2, 2m - 1, 1, 0.$$

Uočimo da su to elementi prvog retka u obrnutom poretku. Dakle, elementi prvog i elementi  $(m + 1)$ -vog retka su u međusobno suprotnom poretku. Primijetimo sad da, za svaki  $k \in \{1, 2, \dots, m\}$ , pribrajanjem prvom odnosno  $(m + 1)$ -om retku broja  $k - 1$  (modulo  $m$ ) dobivamo  $k$ -ti odnosno  $(m + k)$ -ti redak. Slijedi da su i  $k$ -ti i  $(m + k)$ -ti redak u međusobno suprotnom poretku. Dakle,  $(m + k)$ -ti redak je obrnutog redosljeda s obzirom na  $k$ -ti redak iz čega slijedi tvrdnja leme.  $\square$

**Napomena 3.3.12.** *Po prethodnoj lemi možemo zaključiti da za svaki Hamiltonov put u gornjoj dekompoziciji usmjerenog grafa  $\vec{K}'_{2m}$  postoji put u istoj toj dekompoziciji koji je njemu suprotan.*

Ako u prethodnim rezultatima svaka dva međusobno suprotna Hamiltonova puta identificiramo jedan s drugim, tj. smatramo ih istim putem, dobivamo sljedeći teorem.

**Teorem 3.3.13.** *Neka je  $K_{2m}$  odnosno  $K_{2m+1}$  jednostavni potpuni graf s  $2m$  odnosno  $2m + 1$  vrhova. Tada postoji dekompozicija:*

(i) *od  $K_{2m}$  na  $m$  disjunktних Hamiltonovih puteva;*

(ii) *od  $K_{2m+1}$  na  $m$  disjunktних Hamiltonovih ciklusa.*

*Dokaz.* Traženi putevi dobiveni su iz prvih  $m$  redaka latinskog kvadrata  $L$  iz teorema 3.3.6, a traženi ciklusi su dobiveni iz istih  $m$  redaka s dodanim elementom  $2m$  kao zadnjim (u svakom retku to će biti  $(2m + 1)$ -vi element).  $\square$

Pokažimo još kako konstruirati Eulerovu turu u jednostavnom potpunom grafu s  $n$  vrhova ( $K_n$ ), gdje je  $n$  neparan prirodan broj. Naime, s obzirom da je Euler pokazao da Eulerova tura postoji ako i samo ako su svi vrhovi grafa parnog stupnja, jednostavni potpuni grafovi s  $2m$  vrhova ne dopuštaju Eulerovu turu (svaki vrh je stupnja  $2m - 1$ ). Dakle, proučavat ćemo jednostavne potpune grafove s  $2m + 1$  vrhova ( $K_{2m+1}$ ), gdje je  $m \in \mathbb{N}$ .

Eulerovu turu konstruirat ćemo pomoću pravokutne matrice  $R$  definirane ranije u ovom potpoglavlju i nizanjem odgovarajućih Hamiltonovih ciklusa dobivenih iz  $R$ .

**Teorem 3.3.14.** *Neka je  $m \in \mathbb{N}$ . Neka je  $K_{2m+1}$  jednostavan potpun graf s  $2m + 1$  vrhom. Označimo njegove vrhove sa  $0, 1, 2, \dots, 2m$ . Eulerova tura od  $K_{2m+1}$  dana je s prvih  $m$  redaka  $(2m) \times (2m + 1)$ -matrice  $R$  dobivene tako da latinskom kvadratu potpunog retka reda  $2m$  popunjenom simbolima  $0, 1, 2, \dots, 2m - 1$  dodamo  $(2m + 1)$ -vi stupac u kojem je na svakoj poziciji element  $2m$ .*


*Dokaz.* Neka su pozicije u prvih  $m$  redaka od  $R$  linearno uređene tako da za svaku poziciju  $(i, j)$ , pri čemu je  $i < m$ , vrijedi da je neposredni prethodnik od  $(i, j + 1)$  i da je također  $(i, 2m + 1)$  neposredni prethodnik od  $(i + 1, 1)$ . Pretpostavimo da poziciji  $(m, 2m + 1)$  slijedi pozicija  $(1, 1)$ . Tada gornja diskusija pokazuje da je šetnja dobivena nizanjem elemenata iz prvih  $m$  redaka od  $R$  u skladu s ovim uređajem Eulerova tura.  $\square$

Pokažimo prethodni teorem na primjeru.

**Primjer 3.3.15.** *Neka je  $2m = 4$  i neka su prva dva retka matrice  $R$  dana s  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ . Tada linearnim uređajem iz prethodnog teorema dobivamo sljedeći niz vrhova:*

$$0, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 0, 2, 4.$$

*Ako pretpostavimo da nakon posljednjeg pojavljivanja vrha 4 slijedi vrh 0, dobit ćemo Eulerovu turu prikazanu na sljedećoj slici (strelice pokazuju redosljed Eulerove ture, a ne usmjerenje bridova).*



Slika 3.5: Eulerova tura

## Poglavlje 4

# Magični kvadrati i Roomovi kvadrati

### 4.1 Magični kvadrati

**Definicija 4.1.1.** *Magični kvadrat reda  $n$  je kvadratna matrica dimenzije  $n \times n$  koja sadrži  $n^2$  cijelih brojeva  $0, 1, \dots, n^2 - 1$  tako da zbroj brojeva u svakom retku, stupcu i na obje dijagonale bude isti.*

**Primjer 4.1.2.** *Primjer magičnog kvadrata reda 4 je:*

$$\begin{pmatrix} 0 & 10 & 15 & 5 \\ 7 & 13 & 8 & 2 \\ 9 & 3 & 6 & 12 \\ 14 & 4 & 1 & 11 \end{pmatrix},$$

*gdje je zbroj u svakom retku, stupcu i na dijagonalama jednak 30.*

Jedna metoda konstruiranja magičnih kvadrata reda  $n$  je korištenjem parova ortogonalnih dijagonalnih latinskih kvadrata reda  $n$ .

**Definicija 4.1.3.** *Dijagonalni latinski kvadrat reda  $n$  je latinski kvadrat kojemu obje dijagonale imaju međusobno različite elemente.*

**Teorem 4.1.4.** *Neka je  $n$  neparan broj, ali takav da nije djeljiv s 3. Tada postoji dijagonalni latinski kvadrat reda  $n$ .*

*Dokaz.* Neka su  $a$  i  $b$  prirodni brojevi takvi da vrijedi:

- (i)  $a > b$ ,
- (ii)  $a, b, a + b, a - b$  su relativno prosti s  $n$ .

Pokažimo da je tada kvadratna matrica:

$$L = \begin{pmatrix} 0 & a & 2a & \cdots & (n-1)a \\ b & b+a & b+2a & \cdots & b+(n-1)a \\ 2b & 2b+a & 2b+2a & \cdots & 2b+(n-1)a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (n-1)b & (n-1)b+a & (n-1)b+2a & \cdots & (n-1)b+(n-1)a \end{pmatrix},$$

gdje zbrajanje izvodimo modulo  $n$ , dijagonalni latinski kvadrat reda  $n$ . Uočimo da je simbol u  $i$ -tom retku ( $0 \leq i \leq n-1$ ) i u  $j$ -tom stupcu ( $0 \leq j \leq n-1$ ) dan s  $ib+ja$ . Pretpostavimo da za dva simbola u istom retku vrijedi  $ib+ja \equiv ib+la \pmod{n}$ . Tada vrijedi  $(j-l)a \equiv 0 \pmod{n}$ . S obzirom da je  $M(a,n) = 1$  i  $j, l < n$ , slijedi da je  $j = l$ , dakle ne postoje dva ista simbola unutar istog retka ovog latinskog kvadrata (ovdje koristimo oznaku  $M(x,y)$  za najveći zajednički djelitelj brojeva  $x$  i  $y$ ). Analogno, zbog  $M(b,n) = 1$ , ne postoje dva ista simbola unutar istog stupca ovog latinskog kvadrata. Na glavnoj dijagonali pretpostavimo da vrijedi  $ib+ia \equiv jb+ja \pmod{n}$ , iz čega slijedi  $i(b+a) \equiv j(b+a) \pmod{n}$ . S obzirom da je  $M(b+a,n) = 1$ , slijedi  $i = j$ . Dakle, svi simboli na glavnoj dijagonali su međusobno različiti. Analogno, zbog  $M(a-b,n) = 1$ , simboli na sporednoj dijagonali su također međusobno različiti. Prema tome,  $L$  je dijagonalni latinski kvadrat reda  $n$ .

Da bismo završili dokaz teorema, trebamo još pokazati da postoje prirodni brojevi  $a$  i  $b$  sa svojstvima s početka dokaza. Primijetimo da brojevi  $a = 2$  i  $b = 1$  imaju tražena svojstva. Naime, s obzirom da je  $n$  neparan i nije djeljiv s 3, brojevi  $a = 2$ ,  $b = 1$ ,  $a + b = 3$  i  $a - b = 1$  su relativno prosti s  $n$ .  $\square$

**Teorem 4.1.5.** *Neka je  $n$  neparan broj, ali takav da nije djeljiv s 3. Tada postoji par međusobno ortogonalnih dijagonalnih latinskih kvadrata reda  $n$ .*

*Dokaz.* Kao i u prethodnom teoremu, tj. u njegovom dokazu, neka su  $a$  i  $b$  prirodni brojevi tako da je  $a > b$  i da su  $a, b, a - b, a + b$  relativno prosti s  $n$ . Znamo da je tada latinski kvadrat  $L$  iz prethodnog teorema dijagonalan. Označimo s  $L^T$  transponiranu matricu od  $L$ . Uočimo da je  $L^T$  također dijagonalni latinski kvadrat reda  $n$ . Pretpostavimo da  $L$  i  $L^T$  nisu ortogonalni. Tada postoje pozicije  $(i_1, j_1)$  i  $(i_2, j_2)$  tako da je

$$(i_1b + j_1a, i_1a + j_1b) = (i_2b + j_2a, i_2a + j_2b).$$

Odavde slijedi da je  $i_1 = i_2$  i da je  $j_1 = j_2$  tako da su  $L$  i  $L^T$  ortogonalni.  $\square$

**Teorem 4.1.6.** *Neka je  $n$  prirodan broj za koji postoji par međusobno ortogonalnih dijagonalnih latinskih kvadrata reda  $n$ . Tada se može konstruirati magični kvadrat reda  $n$ .*

*Dokaz.* Neka su  $L_1$  i  $L_2$  dijagonalni, međusobno ortogonalni, latinski kvadrati reda  $n$ . Magični kvadrat  $M$  reda  $n$  tada možemo dobiti kao

$$M = nL_1 + L_2.$$

Naime, neka je element  $r$  na poziciji  $(i, j)$  matrice  $L_1$  i neka je element  $s$  na poziciji  $(i, j)$  matrice  $L_2$ . S obzirom da je  $0 \leq r, s \leq n - 1$ , za element na poziciji  $(i, j)$  matrice  $M$  vrijedi  $0 \leq rn + s \leq n^2 - 1$ . Također, s obzirom da su  $L_1$  i  $L_2$  ortogonalni, elementi  $rn + s$  na međusobno različitim pozicijama  $(r, s)$  međusobno su različiti. S obzirom da je zbroj elemenata u svakom retku, stupcu i dijagonalama jednak  $(\sum_{r=0}^{n-1} r)n + \sum_{s=0}^{n-1} s$ , slijedi da je  $M$  magičan kvadrat reda  $n$ .  $\square$

Pokažimo prethodni teorem na primjeru.

**Primjer 4.1.7.** Neka su  $L_1$  i  $L_2$  sljedeći međusobno ortogonalni dijagonalni latinski kvadrati reda 4:

$$L_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}, L_2 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Po konstrukciji iz prethodnog teorema, odgovarajući magični kvadrat je:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 11 & 5 & 14 \\ 6 & 13 & 3 & 8 \\ 15 & 4 & 10 & 1 \\ 9 & 2 & 12 & 7 \end{pmatrix}.$$

Spomenimo još neke magične objekte, ali prije toga definirajmo pojam izlomljene dijagonale.

**Definicija 4.1.8.** Neka je dana kvadratna matrica reda  $n$ . **Izlomljena dijagonala** je skup od  $n$  pozicija kvadratne matrice koje čine dvije paralelne dijagonalne linije u matrici.

**Definicija 4.1.9.** Magični kvadrat je **pandijagonalan** ako je zbroj u svakoj njegovoj izlomljenoj dijagonali jednak zbroju u svakom retku, stupcu i u svakoj od dijagonala.

**Definicija 4.1.10.** Magični kvadrat reda  $n$  je **simetričan** ako svaki par centralno simetričnih elemenata u zbroju daje  $n^2 + 1$ .

**Definicija 4.1.11.** Za magični kvadrat kažemo da je **bimagičan** ako kvadriranjem svakog od njegovih elemenata dobijemo novi magični kvadrat. Slično, za magični kvadrat kažemo da je **m-multimagičan** ako potenciranjem svih elemenata do  $m$ -te potencije dobivamo magične kvadrate.

**Definicija 4.1.12.** Za magični kvadrat kažemo da je **obrubljen** ako uklanjanjem prvog i posljednjeg retka i prvog i posljednjeg stupca ponovno dobivamo magični kvadrat.

## 4.2 Roomovi kvadrati

Motivacija za Roomove kvadrate dolazi iz organiziranja turnira. Naime, neka se na nekom turniru natječe  $2n$  ekipa na način da svaka ekipa igra sa svakom točno jednom. Tada je očito da imamo  $2n - 1$  natjecateljskih krugova. Dodatno, u svakom krugu, svaka ekipa mora biti na jednoj od  $2n - 1$  lokacija tako da kroz natjecanje svaku lokaciju posjeti točno jednom. Ovakvi problemi rješavaju se upravo Roomovim kvadratima.

**Definicija 4.2.1.** *Roomov kvadrat reda  $2n$  je kvadratna matrica reda  $2n - 1$  u kojoj je na svakoj poziciji ili prazan skup ili neuređeni par (tj. dvočlani skup) simbola odabranih iz zadanog skupa  $S$  od  $2n$  elemenata, pri čemu vrijedi:*

- (i) svaki redak (stupac) sadrži  $n$  neuređenih parova (s elementima iz  $S$ ) i  $n - 1$  praznih ćelija (tj. pozicija na kojima je prazan skup),
- (ii) svaki redak (stupac) sadrži svaki od  $2n$  elemenata iz  $S$  točno jednom i svaki od  $n(2n - 1)$  neuređenih parova se pojavljuje točno jednom u cijelom kvadratu.

**Napomena 4.2.2.** *Bez smanjenja općenitosti, skup od  $2n$  elemenata iz definicije ćemo definirati kao skup  $S = \{1, 2, \dots, 2n - 1, \infty\}$ .*

**Primjer 4.2.3.** *Primjer jednog Roomovog kvadrata reda 8 je:*

$$\begin{array}{ccccccc}
 \{\infty, 1\} & & \{6, 2\} & & \{5, 7\} & \{3, 4\} & \\
 \{4, 5\} & \{\infty, 2\} & & \{7, 3\} & & \{6, 1\} & \\
 \{7, 2\} & \{5, 6\} & \{\infty, 3\} & & \{1, 4\} & & \\
 & \{1, 3\} & \{6, 7\} & \{\infty, 4\} & & \{2, 5\} & \\
 \{3, 6\} & & \{2, 4\} & \{7, 1\} & \{\infty, 5\} & & \\
 & \{4, 7\} & & \{3, 5\} & \{1, 2\} & \{\infty, 6\} & \\
 & & \{5, 1\} & \{4, 6\} & \{2, 3\} & \{\infty, 7\} & 
 \end{array}$$

Pokažimo teoremom jedan način konstruiranja Roomovih kvadrata.

**Teorem 4.2.4.** *Neka je  $L$  latinski kvadrat reda  $2n - 1$  s elementima iz skupa  $\{1, 2, \dots, 2n - 1\}$ . Neka za  $L$  također vrijedi da je ortogonalan s obzirom na svoj transponirani latinski kvadrat  $L^T$  te neka su na glavnoj dijagonali od  $L$  elementi  $1, 2, \dots, 2n - 1$  u prirodnom poretku. U latinskom kvadratu  $L^T$  zamijenimo elemente na glavnoj dijagonali s  $\infty$ . S  $M$  označimo kvadratnu matricu reda  $2n - 1$  čiji su elementi uređeni parovi dobiveni uparivanjem elemenata na istim pozicijama u  $L$  i modificiranoj matrici  $L^T$ . Roomov kvadrat reda  $2n$  možemo dobiti iz  $M$  brisanjem  $n - 1$  izlomljenih dijagonala (paralelnih glavnoj dijagonali) uz uvjet da:*

- (i) se svaki element iz  $L$  pojavljuje točno jednom u preostalim parovima prvog retka od  $M$  nakon brisanja
- (ii) ako se obriše izlomljena dijagonala koja sadrži  $(1, j)$ , neće se obrisati izlomljena dijagonala koja sadrži  $(j, 1)$ .

*Dokaz.* Ako s  $(i, j)$  označimo poziciju u  $M$  koja se nalazi u  $i$ -tom retku i  $j$ -tom stupcu, tada ćelija na poziciji  $(i, j)$  sadrži uređeni par  $(a, b)$  ako i samo ako ćelija na poziciji  $(j, i)$  sadrži uređeni par  $(b, a)$  što je očito iz ortogonalnosti  $L$  i  $L^T$ . Iz definicije ortogonalnosti latinskih kvadrata reda  $k$  znamo da se svaki od  $k^2$  uređenih parova simbola u paru takvih latinskih kvadrata pojavljuje točno jednom. Dakle, nakon brisanja  $n - 1$  izlomljene dijagonale, zbog uvjeta (ii), svaki od preostalih uređenih parova pojavljuje se točno jednom. Ako je zadovoljen i uvjet (i), tako dobivena kvadratna matrica, u kojoj na kraju sve preostale uređene parove pretvorimo u neuređene, očito će biti Roomov kvadrat.  $\square$

Pokažimo na primjeru prethodni teorem.

**Primjer 4.2.5.** Neka je dan latinski kvadrat reda 7 tako da zadovoljava pretpostavke prethodnog teorema:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 7 & 6 & 5 & 4 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 7 & 6 \\ 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 7 & 6 & 5 \\ 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 7 \end{pmatrix},$$

tada je po prethodnom teoremu:

$$M = \begin{pmatrix} (1, \infty) & (7, 3) & (6, 5) & (5, 7) & (4, 2) & (3, 4) & (2, 6) \\ (3, 7) & (2, \infty) & (1, 4) & (7, 6) & (6, 1) & (5, 3) & (4, 5) \\ (5, 6) & (4, 1) & (3, \infty) & (2, 5) & (1, 7) & (7, 2) & (6, 4) \\ (7, 5) & (6, 7) & (5, 2) & (4, \infty) & (3, 6) & (2, 1) & (1, 3) \\ (2, 4) & (1, 6) & (7, 1) & (6, 3) & (5, \infty) & (4, 7) & (3, 2) \\ (4, 3) & (3, 5) & (2, 7) & (1, 2) & (7, 4) & (6, \infty) & (5, 1) \\ (6, 2) & (5, 4) & (4, 6) & (3, 1) & (2, 3) & (1, 5) & (7, \infty) \end{pmatrix}.$$

Sada trebamo obrisati 3 izlomljene dijagonale. Izlomljene dijagonale ćemo označavati s  $\Delta_j$ ,  $j = 0, 1, \dots, 6$ , a koordinate, tj. pozicije koje izlomljena dijagonala  $\Delta_j$  sadrži, možemo dobiti na sljedeći način:

$$\Delta_j = \{(i, i + j)\}, \text{ za } i = 0, 1, \dots, 6, \text{ modulo } 7.$$



Ukoliko obrišemo  $\Delta_3, \Delta_5$  i  $\Delta_6$ , dobit ćemo Roomov kvadrat:

$\{1, \infty\}$	$\{7, 3\}$	$\{6, 5\}$		$\{4, 2\}$			
	$\{2, \infty\}$	$\{1, 4\}$	$\{7, 6\}$		$\{5, 3\}$		
		$\{3, \infty\}$	$\{2, 5\}$	$\{1, 7\}$		$\{6, 4\}$	
$\{7, 5\}$			$\{4, \infty\}$	$\{3, 6\}$	$\{2, 1\}$		
	$\{1, 6\}$			$\{5, \infty\}$	$\{4, 7\}$	$\{3, 2\}$	
$\{4, 3\}$		$\{2, 7\}$			$\{6, \infty\}$	$\{5, 1\}$	
$\{6, 2\}$	$\{5, 4\}$		$\{3, 1\}$			$\{7, \infty\}$	

Postoje i drugi načini konstruiranja Roomovih kvadrata, ali mi ćemo još samo spomenuti za koje redove postoje, tj. za koje redove je moguće konstruirati Roomove kvadrate. Naime, Wallis [5] je pokazao da za svaki prirodni broj, osim 2 i 3, postoji Roomov kvadrat reda  $2n$ .

# Bibliografija

- [1] Z. Bujanović i B. Muha, *Elementarna matematika 1, skripta, PMF - Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu*, <https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/em/em1/materijali/EM1-skripta.pdf>, (kolovoz 2023.).
- [2] T. Debelac i S. Gračan, *Magični kvadrati - čarolija u brojevima*, Matematika i Škola (2004), br. 26, 33–39.
- [3] J. Dénes i A. D. Keedwell, *Latin Squares and Their Applications*, Academic Press, New York, 1974.
- [4] Z. Franušić i J. Šiftar, *Linearna algebra 1, skripta, PMF - Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu*, <https://web.math.pmf.unizg.hr/~fran/predavanja-LA1.pdf>, (kolovoz 2023.).
- [5] C.F. Laywine i G. L. Mullen, *Discrete Mathematics Using Latin Squares*, A Wiley Interscience Publication, 1998.
- [6] I. Nakić, *Diskretna matematika, skripta, PMF - Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu*, <https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/komb/predavanja/predavanja.pdf>, (kolovoz 2023.).
- [7] D. Sejdinović i A. Kopic, *O Oberwolfach problemu*, Hrvatski matematički elektronski časopis, br. 7, <http://e.math.hr/old/oberwolfach/index.html>.

# Sažetak

U ovom radu proučavamo osnovna svojstva i neke od primjena latinskih kvadrata. Uvodimo pojmove usko vezane uz latinske kvadrate i razmatramo njihova svojstva i međusobnu povezanost. Povezujemo latinske kvadrate s teorijom grafova, tj. s potpunim grafovima, Hamiltonovim putevima i Eulerovim turama. Na kraju rada uvodimo pojmove magičnog kvadrata i Roomovog kvadrata te opisujemo i provodimo neke od načina njihove konstrukcije.

# Summary

In this thesis, we study the basic properties and some applications of Latin squares. We introduce terms closely related to Latin squares and consider their properties and inter-relationships. We connect Latin squares with graph theory, i.e. with complete graphs, Hamiltonian paths and Euler tours. At the end of the thesis, we introduce the concepts of a magic square and a Room square, and describe and implement some ways of their construction.

# Životopis

Rođen sam 6. studenog 1998. godine u Karlovcu. U rodnom gradu završio sam Osnovnu školu Grabrik i Gimnaziju Karlovac prirodoslovno - matematičkog smjera. Na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu u Zagrebu 2020. godine stekao sam zvanje sveučilišnog prvostupnika matematike i upisao diplomski studij Financijska i poslovna matematika.