

Biljni makrofosili iz antičke luke u Zatonu kraj Nina

Krajačić, Mirna

Master's thesis / Diplomski rad

2009

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Faculty of Science / Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:217:980891>

Rights / Prava: [In copyright](#)/[Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-07-23**



Repository / Repozitorij:

[Repository of the Faculty of Science - University of Zagreb](#)



Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek

Mirna Kraja i

**BILJNI MAKROFOSILI IZ ANTIČKE LUKE U
ZATONU KRAJINA**

Diplomski rad

Zagreb, 2009. godina

Ovaj rad, izrađen u Botaničkom zavodu,
pod vodstvom doc. dr. sc. Renate Šoštarić,
predan je na ocjenu Biološkom odsjeku
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
radi stjecanja zvanja prof. biologije

Prije svega, najljepše se zahvaljujem voditeljici diplomskog rada, doc. dr. sc. Renati Šoštari, na danonojnoj strpljenju i podršci, a pogotovo na pruženim korisnim savjetima u izradi i pisanju rada.

Svim mojim profesorima i kolegama zahvaljujem se na lijepim godinama studija i na pomoći u stjecanju znanja.

Zahvaljujem se i cijeloj ekipi Odjela za podmorsku arheologiju Arheološkog muzeja Zadar, na prekrasnim tjedan dana terenskog istraživanja u Zatonu, na dobrom druženju i povećanju količini novosteno g znanja.

Također, posebno se zahvaljujem voditelju Odjela za podmorsku arheologiju, dr. sc. Smiljanu Gluševiću, na susretljivosti, literaturnim podacima i dokumentaciji vezanoj za istraživanje antičke luke u Zatonu.

Velika hvala roditeljima, bratu i prijateljima za potporu kroz cijeli život, a pogotovo u stresnim situacijama vezanima uz školovanje, a time i ovaj rad.

Posebno veliko hvala bratu na prijevodu i Grgi na satima provedenima uz photoshop.

Mirna Kraja i

TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek

Diplomski rad

BILJNI MAKROFOSILI IZ ANTIKE LUKE U ZATONU KRAJ NINA

Mirna Kraja i
Rooseveltova trg 6/I, 10000 Zagreb

U ovom radu primjenjena je arheobotanička metoda analize biljnih makrofosila na ukupno 52 uzorka iz podmorskog arheološkog lokaliteta – antičke luke u Zatonu kraj Nina. Iz uzoraka je izdvojeno ukupno 2575 sjemenki, plodova i drugih biljnih ostataka, od kojih je determinirano njih 2403, najviše u dijelom do nivoa vrste.

Analiza dobivenih rezultata pokazala je da su najvažniji poljoprivredni proizvodi bili vinova loza (*Vitis vinifera*), maslina (*Olea europaea*) i smokva (*Ficus carica*). Uzgajali su se i/ili bili predmetom trgovine i trešnja/višnja (*Prunus avium/cerasus*), breskva (*Prunus persica*) i badem (*Prunus amygdalus*), te različite povrće i začinjske bilje. U antičko doba bila je razvijena sredozemna vegetacija sive *Quercion ilicis* i antropogenim djelovanjem već tada degradirana u makiju, garigu i pašnjake.

Ostatci rotkve (*Raphanus sativus*) najstariji su do sada na našem materijalnom dokazu koji potvrđuje pretpostavke o njenom uzgoju već od antičkih vremena. Zanimljiv je i nalaz vrste *Glaucium cormiculatum*, koja recentno nije zabilježena za Hrvatsku.

(105 stranica, 47 slika, 10 tablica, 52 literaturna navoda, jezik izvornika: hrvatski jezik)

Rad je pohranjen u Središnjoj biološkoj knjižnici

ključne riječi: arheobotanika, biljni makrofosili, Aenona, antika, kultivirane biljke

Voditelj: Dr. sc. Renata Šoštarić, doc.

Ocjenitelji: Dr. sc. Zdravko Dolenc, doc.

Dr. Dubravka Hranilović, doc.

Rad prihvaćen: 11. veljače 2009.

BASIC DOCUMENTATION CARD

University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Biology

Graduation Thesis

PLANT MACROFOSILS FROM ROMAN HARBOUR IN ZATON NEAR NIN

Mirna Kraja i
Rooseveltova trg 6/I, 10000 Zagreb

The archaeobotanical method of analyzing herbal macrofossils was applied to a total of 52 samples from an undersea archaeological locality - an ancient port in Zaton near Nin. Out of the collected samples, a total of 2575 seeds, fruits and other herbal remains have been separated, out of which 2403 have been determined, mostly up to species level.

An analysis of the results illustrated that the most important agricultural products were the grape vine (*Vitis vinifera*), olives (*Olea europaea*) and figs (*Ficus carica*). The sweet/sour cherry (*Prunus avium/cerasus*), peach (*Prunus persica*) and almond (*Prunus amygdalus*), some vegetables and seasoning plants were cultivated or traded as well. Mediterranean vegetation of alliance *Quercion ilicis* was established in ancient times. Under anthropogenic influence it then already degraded into maquis, garigues and pastures.

Remains of radish (*Raphanus sativus*) are the oldest material evidence found so far that confirms the assumptions about its cultivation dating back to Roman times. Finding of *Glaucium cormiculatum* species is also interesting, which has not recently been documented in Croatia.

(105 pages, 47 figures, 10 tables, 52 references, original in: croatian)

Thesis deposited in Central biological library

Key words: archaeobotany, plant macro-fossils, *Aenona*, antiquity, cultivated plants

Supervisor: Dr. Renata Šoštari , Asst. Prof.

Reviewers: Dr. Zdravko Dolenc, Asst. Prof.

Dr. Dubravka Hranilovi , Asst. Prof.

Thesis accepted: February 11th 2009

SADRŽAJ

1. UVOD	1
1.1. Zadatci i cilj rada	2
1.2. Opće karakteristike istraživanog područja	3
1.2.1. Geografske osobitosti	3
1.2.2. Geomorfološke osobitosti	5
1.2.3. Klima	7
1.2.4. Flora i vegetacija	9
1.3. Antičko razdoblje na području Hrvatske	13
1.4. Poljodjelstvo u prapovijesno i povijesno doba	15
1.5. Povijest arheoloških istraživanja na području Nina	17
1.6. Promjene morske razine Jadrana	26
1.7. Arheobotaničke metode – analiza biljnih makrofosila	30
2. MATERIJAL I METODE	32

3. REZULTATI	39
3.1. Tabelarni prikaz rezultata	40
3.2. Morfološka analiza kritičnih svojstvi i njihova determinacija	44
3.3. Ekološko – etnološka analiza determiniranih makrofosila	64
3.3.1. Kultivirane i korisne zeljaste biljke	70
3.3.2. Kultivirane i korisne drvenaste biljke	75
3.3.3. Korovi i ruderalne biljke	87
3.3.4. Biljke vodenih i vlažnih staništa	89
3.3.5. Elementi (polu) prirodne vegetacije	90
4. RASPRAVA	91
5. ZAKLJUČCI	97
6. LITERATURA	100
7. PRILOZI	105

1. UVOD

Na spomen naselja Zaton kraj Nina i njegova okruženja, prva asocijacija je turizam i poznato turistima kao naselje. No važnost tog područja također je i povijesna, posebice za razdoblje antike. Naime, na samom rubu uvale u kojoj se danas odvijaju brojne turističke aktivnosti, u antika doba bila je smještena antička luka *Aenona*. Danas, nakon 2000 godina, područje luke je oko dva metra pod morem. Arheološki nalazi ovog lokaliteta vrlo su vrijedni, prvenstveno stoga što pružaju sliku o tadašnjem načinu života.

Istraživanja potopljene antičke luke započeta su 60-ih godina prošlog stoljeća (Brusi 1968). Lociran je lukobran dug otprilike 150 metara, koji se pruža u smjeru sjever-sjeveroistok od rta Kremenjača, nekoliko stotina metara zapadno od Turističkog naselja Zaton. Na njemu su također i dva plovila, jedno pripada rimskoj brodogradnji, drugo liburnskoj.

Istraživanja su nastavljena krajem 70-ih godina, i sada se provode skoro 10 godina. Na njemu je ogromna količina keramičkog materijala i ostatci plovila koje je rađeno osobitom tehnikom tzv. „šivanja“. O takvim plovilima govore već i antički pisci Pakuvije (II. st. pr. Kr.), a zatim i M. Verije Flak (I. st.) i Sekst Pompej Fest (II. st.), nazivajući ih *serilia* ili *serila* (Glušević 2004).

Odjel za podmorsku arheologiju, Arheološkog muzeja Zadar, započeo je 2002. godine s novom serijom hidroarheoloških istraživanja antičke luke *Aenona*. Istraživanja se metodološki znatno razlikuju od prijašnjih, jer se temelje na preciznoj rađenoj stratigrafskoj metodi. Na njemu je traženo liburnsko plovilo koje nije sačuvano u cijelosti, ali su ostatci u puno boljem stanju. Iskopavani su slojevi debeli svega 10 centimetara, a istraživano polje podijeljeno je u kvadrante, radi preciznijeg i jednostavnijeg evidentiranja. Iz gotovo svakog sloja uzorkovani su i uzorci za arheobotaničku analizu (Glušević 2004).

1.1. Zadatci i cilj rada

Analiza biljnih makrofosila u Hrvatskoj se poela primjenjivati u novije vrijeme. Ovaj diplomski rad doprinos je nastavku i unaprijeenju ovakvih istraživanja u Hrvatskoj.

Zadatci rada:

- primijeniti metodu analize biljnih makrofosila na uzorke iz antičke luke u Zatonu kraj Nina
- izraditi popis determiniranih biljnih svojti na enih u arheološkim slojevima s podacima o njihovom broju u pojedinim uzorcima i prikazati ih tabelarno
- naju estalije i najznajnije makrofosile opisati i dokumentirati fotografijama
- opisati morfološke karakteristike po kojima se razlikuju vrste problematizirane za determinaciju
- napraviti ekološko-etnološku analizu determiniranih biljnih vrsta.

Cilj rada je rekonstrukcija paleookoliša antičke luke u Zatonu kraj Nina, odnosno odrediti:

- koje su se poljoprivredne kulture uzgajale i/ili su bile predmetom trgovine
- koji je tip vegetacije prevladavao
- koliki je antropogeni utjecaj na prirodni okoliš bio prisutan.

Zadarska regija obuhvaća preko 10 % hrvatskog mora, koje je od velike prometne i gospodarske važnosti od najstarijih vremena. Tako je i izuzetno povoljan zemljopisni položaj glavnog grada regije, Zadra, osigurao je tom gradu kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti vrlo važnu namjenu u pomorskom prometu.


Oko 15 kilometara sjeverozapadno od glavnog grada zadarske regije, smješten je gradić Nin (sl. 2). Centar drevnog grada, kojeg su u antičkom razdoblju nazivali *Aenona* je otok koji je s dva mosta povezan s kopnom, a nastao je na pješčanom sprudom nekadašnjeg ušća rijeke Miljaši Jaruge u more. Sa sjeverne strane okružen je pješčanim sprudom i vikend naseljem Ždrijac, s iste strane nalazi se solana, a na južnoj i zapadnoj strani nalaze se noviji dijelovi samog mjesta (<http://hr.wikipedia.org/wiki/Nin>).



Slika 2. Nin danas (Foto: Boris Kačanin, http://www.mm-commerce.hr/assets/images/sv_petar/nin.jpg)

1.2.2. Geomorfološke osobitosti

Reljefom i sastavom tla zadarska regija se prilično razlikuje od ostalih dijelova Hrvatskog primorja. Uz obalu prevladava ravno, humovito i valovito zemljište, dok su otoci većinom brdoviti (sl. 3). U pozadini zadarske regije nalazi se Velebit.



Slika 3. Geološko-petrografska skica Dalmacije: 1-pijesci i jezerske naslage mlađeg neogena, 2-mladi riječni nanosi, 3-mlade šljunkovite i pjeskovite drobine, 4-kvartarne naplavine i crvenica u krškim poljima, 5-jezerske glinovite i laporovite naslage mlađeg neogena, 6-vapnena i konglomerati paleogena s proslojcima pješnjaka i lapora, 7-plošasti i slojeviti paleogeni fliš, 8-lapori i konglomerati paleogena, 9-flišolike naslage mezozoika, 10- vrste vapnena koje su pretežno gornje i donje krede, 11-slojeviti i bankoviti okršeni vapnenci mezozoika, 12-vapnenci i dolomiti pretežno mezozojski, 13-dolomiti pretežno mezozojski (Friganovi 1974)

Otoci koji slijede dinarsko pružanje i gra u Kotara, poredani su negdje u tri, a negdje u pet redova, razdvajaju i unutrašnji kanal od središnjeg, a središnji kanal od pu inske plovne rute. Od zadarskog arhipelaga, koji broji oko 140 otoka, oto i a i nadmorskih grebena brojnija je jedino šibensko-kornatska oto na skupina. Iz vrlo složene oto ne i obalne razvedenosti zadarskog prostora proizašla je velika prirodna raznolikost, ali i neprohodnost pomorskih putova (Friganovi 1974).


U sastavu stijena postoji zonalnost kao nigdje drugdje u našem primorju. U Kotarima prevladavaju vapnena ke stijene gornjokredne i tercijarne starosti s izrazitim pružanjem sjeverozapad – jugoistok, dok se u pravcu jugozapad – sjeveroistok izmjenjuju vapnena ke uzvisine i rastresite laporovito – pjeskovite udoline. Bukovica je vapnena ka zaravan u kojoj prevladavaju tercijarne vapnenci, vapnena ke bre e i konglomerati, uz nešto lapora i boksitnih rudišta. Otoci su izrazito vapnena kog sastava kredne starosti s uskim pojasom mekših i plodnijih dolomita. Takav je sastav utjecao na gospodarsko iskorištavanje otoka od davnih dana (Friganovi 1974).

1.2.3. Klima

U klimatskom pogledu, zadarska regija nosi obilježja nekoliko područja. Obala i otoci pripadaju mediteranskoj klimi, sa preko 2500 sunanih sati godišnje. Zaleđe pripada kontinentalnoj klimi, dok područje Velebita pripada planinskoj klimi.

Glavni grad zadarske regije, Zadar, ima vrlo blagu klimu. Većinski rimski pjesnik Marcus Annaeus Lucanus (I. st. posl. Kr.) u svom spjevu *De bello civili*, spominje Zadar, te koristi atribut „*tepidus*“, odnosno blag, što se odnosi na klimatsku umjerenost, prije svega blagost zime (Kraljev 1995). Zemljopisna širina određuje prvenstveno količinu sunčeve svjetlosti i zračenja, a o tome ovisi raspoloživa toplinska energija, odnosno toplina zraka. Na klimu utječu i Jadransko more, Velebit, kopnena zaravan Ravni kotari i brojni otoci zadarskog arhipelaga. Zime su blage (srednja temperatura najhladnijeg mjeseca je 7,4 °C), a ljeta nisu pretopla (srednja temperatura najtoplijeg mjeseca je 22,6 °C). Jesen s prosječnom temperaturom 17,1 °C, toplija je od proljeća (13,2 °C). Najhladniji mjesec je siječanj, s prosječnom temperaturom od 6,7 °C. Središnja godišnja temperatura mora je oko 16 °C, s maksimumom u kolovozu (22,7 °C), i minimumom u veljači (10,8 °C). Godišnje u Zadru padne prosječno 917 mm oborine. Zadar pripada dijelu istočnojadranske obale s najmanje oborine, uz dalmatinske otoke i zapadnu obalu Istre. Maksimum oborina je u studenom (119 mm), a minimum u srpnju (35 mm). Snijeg je u Zadru rijetka pojava. Prosječna relativna vlažnost zraka je 72%, a nijedan mjesec ne pada ispod 67% (Kraljev 1995).

Prema Köppenovoj klasifikaciji klime zadarska regija pripada području umjereno tople vlažne klime s vrućim ljetom (srednja temperatura najtoplijeg mjeseca 22 °C), sa padalinama tijekom cijele godine, pa sušno razdoblje izostaje (Šegota i Filipić 1996) (sl. 4).



Slika 4. Klimadijagram prema Walteru za Zadar za razdoblje 1948. do 1960. godine (Bertovi 1975)

1.2.4. Flora i vegetacija

Današnja vegetacija Hrvatske, kao i vegetacija ostalih zemalja Europe, rezultat je recipro nih aktivnosti prirodnih i antropogenih imbenika koji su trajali kroz dugi vremenski period. Hrvatska pripada tzv. refugijalnom području i karakterizira je velika raznolikost svojti.

Prate i rezultate raznih arheobotani kih istraživanja, koja uključuju analizu polena i biljnih makrofosila, izvršena je analiza postglacijalnog razvoja vegetacije obalnog dijela Hrvatske. Najstarije dostupne informacije pripadaju Borealnom periodu (otprilike 8000 godina pr. Kr.). Obalna područja tada su bila prekrivena miješanim listopadnim šumama u kojima je prevladavao hrast medunac (*Quercus pubescens*). Prisutne su bile i ostale termofilne listopadne vrste poput *Carpinus orientalis/Ostrya carpinifolia*, *Fraxinus ornus*, zatim rodovi *Corylus* i *Ulmus*. Klima je bila ili hladnija zimi ili vlažnija ljeti od današnje. U razdoblju od otprilike 6000 do 4400 godine pr. Kr. listopadne hrastove šume postepeno zamjenjuju *Phillyrea* i *Juniperus*. Do takve promjene vegetacije najvjerojatnije je dovela promjena klime u pravu mediteransku klimu. U slijede em razdoblju (otprilike 4400. godine pr. Kr. – 0. godine posl. Kr.) vegetacija se ponovno mijenja, i dominantnim postaje *Quercus ilex*. S obzirom da nema dokaza o klimatskim promjenama, a utjecaj neolitskih ljudskih nastambi vjerojatno je zanemariv, ova promjena vegetacije obalnog područja vjerojatno je rezultat širenja ve postoje ih vrsta. *Q. ilex* je dominantna vrsta tog perioda, ali se pridružuju a vegetacija mijenjala nekoliko puta. Na po etku je prisutan rod *Juniperus*, koji postepeno zamjenjuje rod *Erica*. Krajem tog razdoblja pojavljuju se *Pinus halepensis*, *Juglans*, *Ceratonia*, *Castanea*, *Punica*, prvenstveno djelovanjem ljudskih aktivnosti (Šoštari 2005).

Dublje u unutrašnjosti dalmatinske obale, u periodu od otprilike 5050 godine pr. Kr. do rimskih vremena, dominiraju submediteranske listopadne šume sa tipičnim vrstama *Quercus pubescens*, *Carpinus orientalis/Ostrya carpinifolia* i *Fraxinus ornus*.

U sjevernojadranskom području u periodu od otprilike 3800 godine pr. Kr. do dolaska Rimljana također su dominirale submediteranske listopadne šume, dok su vazdazelene mediteranske šume imale manji značaj i bile su rasprostranjene u uskom obalnom pojasu.

Rane ljudske aktivnosti nisu imale utjecaja na gubitak šumskog pokrivača velikih razmjera, ali dolaskom Rimljana počinje razdoblje izrazitih promjena te značajnog smanjenja šumskog pokrivača (Šoštari 2005) (tab. 1).

Tablica 1. Pojednostavljeni prikaz razvoja vegetacije obalnog područja Hrvatske u postglacijalnom razdoblju. Crne linije prikazuju trajanje pojedine vegetacijske faze prema dostupnim podacima arheoloških istraživanja (Šoštari 2005)

Time scale (BC/AD)	Historical ages	North Adriatic	Islands of Dalmatia and coastal part of mainland area	Further inland of Dalmatian mainland
0	Antiquity	↑ + <i>Juglans</i> , <i>Castanea</i> , <i>Cerealia</i> , <i>Olea</i> , <i>Vitis</i> , <i>Phillyrea</i> , <i>Juniperus</i>	↑ + <i>Pinus halepensis</i> , <i>Castanea</i> , <i>Juglans</i> , <i>Olea</i> , <i>Vitis</i> , <i>Cerealia</i> , <i>Cerastium</i> , <i>Punica</i> , <i>Juniperus</i> , <i>Pistacia</i> , <i>Faliscus</i> , <i>Cistaceae</i>	↑ + <i>Castanea</i> , <i>Juglans</i> , <i>Olea</i> , <i>Vitis</i> , <i>Cerealia</i> , <i>Juniperus</i> , <i>Paliurus</i> , <i>Cistaceae</i>
1000	Bronze Age	<i>Quercus pubescens</i> = <i>Carpinus orientalis</i> / <i>Ostrya carpinifolia</i> , <i>Fraxinus ornus</i>	<i>Quercus</i> + <i>Erica</i>	<i>Quercus pubescens</i> + <i>Carpinus orientalis</i> / <i>Ostrya carpinifolia</i> , <i>Fraxinus ornus</i>
2000	Enolithic	(<i>Quercus ilex</i> + <i>Phillyrea</i> , <i>Pistacia</i> , <i>Juniperus</i>)	<i>ilex</i>	<i>Quercus pubescens</i> + <i>Carpinus orientalis</i> / <i>Ostrya carpinifolia</i> , <i>Fraxinus ornus</i>
3000			+ <i>Juniperus</i>	
4000	Neolithic			
5000			<i>Phillyrea</i> , <i>Juniperus</i> + <i>Quercus ilex</i>	
6000				
7000			<i>Quercus pubescens</i> + <i>Corylus</i> , <i>Ulmus</i> , <i>Carpinus orientalis</i> / <i>Ostrya carpinifolia</i> , <i>Fraxinus ornus</i>	
8000				

Današnja vegetacija u Hrvatskoj (sl. 5) pripada šumskom području dviju regija sjevernoga umjerenog pojasa: sredozemnoj (mediteranskoj) i eurosibirsko – sjevernoameričkoj (kopnenoj) regiji (Bertović 1975).

Podru je zadarske regije pripada mediteranskoj regiji koja je pod utjecajem mediteranske klime, s blagim, kratkim i kišovitim zimama te suhim i vrućim ljetima. Konkretno, podru je uz samo more pripada eumediteranskoj zoni sa središnjom godišnjom temperaturom od 13,7 do 16,5 °C, dok podru je vertikalno i horizontalno udaljenije od mora pripada submediteranskoj zoni sa nešto nižom temperaturom (10,8 – 15,0 °C) (Bertović 1975).

Klimazonalnu vegetaciju eumediteranske zone predstavlja vazdazelena šumska vegetacija sveže *Quercion ilicis*, kojoj pripada najznačajnija zajednica *Orno-Quercetum ilicis*, vešinom razvijena u obliku degradacijskog stadija makije. Makija je građena od istih karakterističnih vrsta ove zajednice (*Quercus ilex*, *Rosa sempervirens*, *Cyclamen repandum*), ali je karakteriziraju guste i neprohodne šikare. Daljnjom degradacijom razvijaju se trajni vegetacijski stadiji – garizi, travnjaci i kamenjare. Za to su podru značajne i dijelom endemične zajednice u pukotinama stijena, na toplima, na slanim staništima uz obalu mora, stajaćim i tekućim vodama te druge pionirske i antropogeno uvjetovane zajednice na ruderalnim staništima i kultiviranim površinama (Šegulja i Topić 2000).

Submediteranskoj zoni pripada submediteranski pojas listopadne vegetacije. Klimatski je ta zona različita od eumediteranske po nižim temperaturama u zimskim mjesecima i većoj količini oborina. Niži pojas karakterizira klimazonalna šumska zajednica *Quercus-Carpinetum orientalis* (*Carpinetum orientalis croaticum*), s karakterističnim vrstama poput *Carpinus orientalis*, *Pistacia terebinthus* i *Ruscus aculeatus*, dok je u mediteransko-montanom pojasu razvijena klimazonalna zajednica *Ostrya-Quercetum pubescentis* s vrstama *Ostrya carpinifolia* i *Quercus pubescens* (Šegulja i Topić 2000).



Slika 5. Vegetacijska karta Hrvatske (Bertović 1975)

1.3. Antičko razdoblje na području Hrvatske

Pod antikom se obično podrazumijeva kulturna povijest stare Grčke i Rima, iako polaze i od značenja latinske riječi *antiquus* /star ili drevan/ (Kale (1981) u antičkoj civilizaciji uključuje sve stare ili drevne civilizacije koje su se u raznim područjima Zemlje javile prije ili u vrijeme stare Grčke ili Rima, poput Sumerana i Egipćana. Pod pojmom antika, u ovom radu također se misli na europske stare civilizacije, prvenstveno rimsku, koja je na ovim prostorima imala velik utjecaj.

Ishodište svega onoga što danas nazivamo antičkom civilizacijom bila je Egeja. Iskra egejske civilizacije širi se s Kiklada i Krete na veliki dio Grčke i Male Azije. Zbog oskudice prirodnih resursa, Grci su bili prisiljeni tražiti nova područja za uspješniji gospodarski život, pa napreduju šire i se cijelim Sredozemljem. Iz Grčke se civilizacija oko sredine VII. st. pr. Kr. širila i na zapadne negričke narode, poput Etrušćana i Rimljana. Malo pomalo ti su narodi unosili vlastita iskustva i nadahnuća, odstupajući od izvora. Teritorijalnim proširenjem i jačanjem političke moći ti su narodi, svaki u svoje vrijeme, doprinosili rastu i preoblikovanju grčkih poticaja, doradi i proširenju onoga što smatramo antikom. Tako je antička civilizacija prodrla daleko na sjever, udarivši temelje europskoj civilizaciji (Cambi 2002).

Itava je Hrvatska dugo bila rubni, ali integralni dio antičkog svijeta, obalni dio odavno, a unutrašnjost nešto kasnije. Uzrok tome je dijagonalni položaj Jadrana koji spaja Sredozemlje sa srednjom Europom, a plovidba je zbog razvedenosti, pravca vjetrova i struja pogodnija na hrvatskoj, istočnoj obali. Stoga tom obalom u antička vremena pulsiraju civilizacijski tokovi. Razdvojeni Dunavom, Savom i Dravom od „barbarskog“ svijeta, panonski su krajevi u kasnoj antici bili u središtu vojnih i političkih zbivanja. Na antičkoj baštini razvijala se i hrvatska srednjovjekovna civilizacija (Cambi 2002).

Kada je Rim u zadnjim stoljeima stare ere postao gospodar tadašnjeg svijeta, rimska civilizacija najprije je zadržala sve porobljene gradove na Jadranu. Rim se infiltrirao među jadranske Grke kao njihov zaštitnik u sukobima s Ilirima. U prvoj polovici I. st. pr. Kr. osnivaju se u ilirskim gradovima na obali konventi rimskih građana, a otuda kreću i rimski napadi na Ilire, a zatim i na Panone. Od II. st. pr. Kr. jugoistočna Europa (osim Grčke i Bugarske) pripadala je rimskoj provinciji Iliriku. Istra je također pripadala Iliriku, a kasnije je priključena Italiji, dok je sjeverni dio Hrvatske pripadao Panoniji. Tako je Hrvatska bila podijeljena između tri rimske provincije (Dalmacija, Ilirik, Panonija). Brdski lanci bili su zapreka da civilizacijske tekovine intenzivno prodru s obale u unutrašnjost. Rimska civilizacija je, unatoč tome, ipak stizala u jadransko zaleđe te bivala prihvaćana i ugrađivana u život i kulturu tih krajeva na njima svojstven način (Cambi 2002).

1.4. Poljodjelstvo u prapovijesno i anti ko doba

U doba neolita obrada zemlje u starom Rimu obavljala se uz pomoć vrlo primitivnih pomagala i oruđa, uz trošenje silne ljudske i životinjske energije, koja je tada jedina bila raspoloživa, a sa skromnim učincima. Dolaskom grčkih kolonista te kasnije punskom kolonizacijom obalnog pojasa tirenskih otoka poljoprivreda se počela usmjeravati prema drugoj namjeni. U početku okrenuta samo osiguranju hrane za obitelj, poljoprivredna proizvodnja sada je namijenjena opskrbi stanovništva u gradskim središtima u nastanku. Pretvorbom izvornog prirodnog stanja tla povoljnog za ispašu u obradivo, plodnije zemljište za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, posebice žitarica, obradive površine zauzimaju sve veća područja (Salopek 2007).

Tijekom II. st. pr. Kr. na širokom prostranstvu nastaju brojna gospodarstva, a nestaju šumarci, pašnjaci i baruštine, kako bi se stvorio prostor za žitarice, te zasadila stabla, maslinici, loza i vinnjaci (sl. 6). U I. st. posl. Kr. postignuto je poljoprivredno blagostanje Italije, o kojima pozitivnu sliku daje Polibije. Žito se proizvodilo, potvrđuje Polibije, u velikim količinama, baš kao i vino, oboje po cijenama mnogo nižim nego u drugim mjestima. Osim žitarica i vinograda, bio je raširen uzgoj bobica (*Vicia faba*), maka (*Papaver somniferum*), prosa (*Panicum miliaceum*), lana (*Linum usitatissimum*) i različitog voća. Katon, u dijelu *O poljoprivredi* također ističe uzgoj vinove loze (*Vitis vinifera*), ali i nasada vrba (*Salix sp.*) za izradu košara i koševa, nasada maslina (*Olea europaea*), livada, pšenice (*Triticum sp. div.*), šuma za sječu, voćka i hrasta. Uzgoj poljoprivrednih kultura imao je prednosti ne samo zbog rasteće potrošnje i potreba u novonastalim gradskim središtima, nego i zbog mogućnosti koje su se kao posljedica šireg prostora političkog djelovanja Rima u sredozemnom svijetu, otvarale za plasman proizvoda na tržišta izvan Italije (Salopek 2007).

Proširenje poljoprivredne djelatnosti i uzgoj stoke doveli su do velikih promjena prehrambenih navika. Dok su se u pretpovijesno doba ljudi hranili isključivo produktima lova i ribolova te samoniklim plodovima, u antičko doba omogućeno je korištenje brašna i raznog jestivog raslinja, ali i upotreba velike količine mesa, životinjske masti te mliječnih proizvoda. Osnova prehrane bila je kaša (*puls*), gusti pripravak od gnjevenih žitarica (najčešće proso) uzavrelog u vodi i mlijeku, i pogača (*maza*) od ječmenog brašna pomiješanog s vodom, vinom, uljem i medom. Kruh se počinje upotrebljavati kasnije, a u početku je bio u obliku dvopeka od nedizane tijesta. S vremenom su se proširile razne vrste kruha: *plebeius*, crni kruh slabije kvalitete, *secundarius* koji je bijeli i malo bolje kvalitete i *candidus*, izrazito bijeli i fini kruh.

Italici su narodi osim kaše, jeli sirovo ili kuhano povrće, često začinjeno uljem i octom, a najrasprostranjeniji su bili salata (*Lactuca sativa* var. *capitata*), kupus (*Brassica oleracea* var. *capitata*), poriluk (*Allium porrum*) i blitva (*Beta vulgaris* subsp. *vulgaris* var. *vulgaris*). Jeli su i voće različitih vrsta i mahunarke. Meso je bilo izvanredna i rijetka hrana, dok je u središtima duž morskih i riječnih obala bila nešto veća potrošnja ribe (Salopek 2007).




Slika 6. Uzgoj voćaka široko je rasprostranjen, o čemu svjedoče i freske u Dvorani Triklinija iz Livijine kuće u Rimu (I. st. pr. Kr.) (Salopek 2007)

1.5. Povijest arheoloških istraživanja na području Nina


Krajem 60-tih godina prošlog stoljeća i u Hrvatskoj se povećala uvidati važnost istraživanja arheoloških lokaliteta pod morem. Prije svega ta nalazišta pružaju uvid u način života mornara i trgovinu, a time i u kulturu tadašnjeg stanovništva. Naime kopnena istraživanja vrše se pretežito na zatvorenim nalazima, poput grobnica i nastambi, u kojima se većinom nalaze izabrani predmeti. Takvi nalazi ne daju potpunu sliku materijala, bilo da je riječ o predmetima koji su pokopani s pokojnikom ili predmetima manje važnosti koji su preostali nakon bijega od neke opasnosti.

Od podvodnih nalaza vrlo su vrijedni brodski tereti, kao zatvorena nalazišta. Uz našu obalu, koja se od antike do danas snizila za oko dva metra, nalaze se i arheološki značajne luke i lučke instalacije. Upravo takvo jedno nalazište je u selu Zaton, 15-ak kilometara od Zadra (sl. 7), u okolici Nina, u moru ispred rta Kremenjača, nedaleko od uvale Dražnik (sl. 8). Ostatci se nalaze na dubini od 2 do 4,5 metra.

Prva istraživanja ove potopljene antičke luke započeta su 1968. godine, od strane prof. dr. sc. Zdenka Brusića, tada kustosa u arheološkoj zbirci grada Nina. Prilikom prvog ronjenja uočen je nasip, dužine oko 200 metara, koji se pruža prema jugu. Na nasipu su uočene četiri gomile jajolikog kamenja, fragmenti keramike i nekoliko grupa tesanih blokova bijelog kamena. Sa istočne strane nasipa uočene su dvije kolone djelomično zatrpane pijeskom. Na samoj obali i u gomilama u moru nalaze se jajoliki nukleusi kremenjača, koji su vjerojatno importirani, a po kojima je rt Kremenjača najvjerojatnije dobio naziv (Brusić 1968).



Slika 7. Geografski položaj Zatona (Gluš evi i sur. 2006)




Slika 8. Položaj arheološkog lokaliteta u uvali Dražnik (Brusi 1968)

Nasip zapravo predstavlja lukobran koji je na isto noj, odnosno unutrašnjoj strani imao operativnu obalu za pristajanje brodova. Lukobran je ra en od nabacanog kamenja, a pružao se otprilike 200 metara izvan rta Kremenja a i zatvarao veliki prostor štite i luku od zapadnih i jugo – zapadnih vjetrova. Gomile jajolikog kamenja su vjerojatno gomile balasta koji se ostavljao na obali u slu aju da je u brod ukrcan teži teret.

Rije o luci anti kog Nina, za što ve 60-tih godina Brusi (1968) daje više dokaza. Naime na avionskoj snimci uo ena je trasa ceste koja je vodila od rta Kremenja a do Nina. Zanimljivo je da Nin ima svoju luku na udaljenosti od 2,5 kilometara, na drugoj obali, okrenutoj prema zadarskom kanalu. Razlozi za to su neprikladnost ninske obale i težak plovni put.

Prvim sondiranjem utvr en je ispod sloja pijeska (20-30 centimetara debljine) kulturni sloj, koji obiluje rimskom keramikom, staklom, metalom i drvom. U ovom sloju (20-60 centimetara dubine) na eni su i botani ki ostatci, poput koštica maslina, grož a, bresaka, ešera pinije, oraha i badema. Tako er, taj sloj pun je i obra enog drva. Po kerami kom materijalu, ovaj sloj datira se od I do III st. posl. Kr. (Brusi 1968).


Fragmenti obra enog drva ra eni su tehnikom koju rabi rimska brodogradnja. Drvo je spojeno tako da su na oblim daskama koje su se spajale bili urezani utori u koje su ulazile drvene daš ice, koje su fiksirane s dva drvena avli a. Na eni su i dijelovi amca spajani tada neuobi ajenom tehnikom „šivanja“ (sl. 9). Tehnika spajanja ovog amca sastoji se u tome da su se obje strane daske koje su se spajale izbušile u razmaku od 2,5 cm i 1 cm od ruba. Na spoj daske nalijegala je deblja traka. Kroz izbušene rupe na daskama provla ila bi se uzica koja je preko trake ulazila u rupice u drugoj dasci i spajala elemente. Natezanjem uzice preko trake formirale su se udubine sli ne pletenici. Sve rupice za provla enje uzice zatvarale su se drvenim avli ima, a preko toga premazivana je smola (Brusi 1968).



Slika 9. 1. Skica spoju dviju dasaka, 2. Skica spoja kobilice s daskama (Brusi 1968)

Dimenziju plovila moguće je odrediti prema debljini kobilice, koja presjekom od 7,5 cm odgovara plovnom objektu dužine otprilike 10 metara. Prilikom prvog istraživanja pretpostavlja se da je riječ o liburnskoj brodograđevnoj tehnici, što je kasnije i potvrđeno.

Daljnja, intenzivna istraživanja provedena su u razdoblju od 1979. do 1987. godine, uz prekide. Nađena je ogromna količina prvenstveno keramičkog materijala, koji nam govori o vremenu i porijeklu brodova koji su pristizali u luku (Mala Azija, Bliski Istok, sjeverna Afrika, sjeverna Italija ili Grčka). U manjem obimu pronađeni su i staklo i koštani materijali poput igala i ukosnica, te metalni materijali poput novca i udica, drveni materijali, komadi kože i konopa. 1979. godine izvađeni su ostatci plovila pronađeni 60-tih godina, a potom 80-tih otkriveno je drugo plovilo, koje je puno bolje sačuvano. Ostatci su također rađeni specifičnom, ranije opisanom tehnikom, tzv. „šivanja“, koja se sada sigurno može atribuirati Liburnima. Naime, već antički pisci Pakuvije (II. st. pr. Kr.), a zatim i M. Verije Flak (I. st.) i Sekst Pompej Fest (II. st.) govore o tim plovilima, nazivajući ih *serilia* ili *serilla* (Glušević 2004) (sl. 10).



Slika 10. Liburnska serilia (Ilakovac 1995/96b)


Nastavak istraživanja slijedi 2002. godine. Metodološki je to istraživanje uvelike različit od istraživanja koja su provedena 80-tih godina, prvenstveno stoga što je riječ o preciznoj stratigrafskoj metodi. Upotreba te metode daje bolji uvid u sliku o životu stanovništva i preciznije kronološko opredjeljenje luke. Još jedna inovacija ovih istraživanja je 3D izrada slike nalazišta. Tijekom istraživanja osim mnoštva keramičkog materijala, stakla, kosti, drva, kože i konopa, nađeno je i treće liburnsko plovilo. Plovilo nađeno na dubini od 2,5 metra nije sačuvano, ali su ostatci u puno boljem stanju od ostataka prethodna dva plovila. Riječ je o šest rebara debljine 5-7,5 centimetara međusobne udaljenosti 32,7-41 centimetar. S donje strane rebara nalaze se polukružni otvori kroz koje prolazi „pletenica“, odnosno spojevi dasaka oplata, dok se s vanjske strane rebara vide daske oplata spojene „pletenicom“. Za izradu plovila korištena je žilava i savitljiva brštrina (*Spartium junceum*) (Glušević 2002).

Ranije je rečeno da je riječ o luci antičkog grada *Aenona*, današnjeg grada Nina. Postavlja se pitanje zašto je grad uz obalu imao svoju luku na udaljenosti od 2,5 kilometara? Iako su ve 60-tih godina navedeni neki razlozi zašto je tome tako, sredinom 90-tih o tome se vode detaljnije rasprave (Ilakovac 1995/96b).

U toku istraživanja isto ne obale Jadrana otkriveno je dosta rimskih zidanih pristaništa, koja su većinom sagrađena uz privatno privredno gospodarstvo. Rimsko pristanište Kremenjača posebno je upravo po tome što nije sagrađeno uz privredno dobro, niti uz pripadajuće naselje, nego čak 2,5 kilometara dalje od antičkog grada *Aenona*.

Nagli razvoj privrede i trgovine, zajedno sa imperijalnim pothvatima, potisnuli su ranoantičku brodogradnju, zahtijevaju i izgradnju velikih i teških brodova, a paralelno s time i zidanih pristaništa. Manja i lagana plovila koja su se nakon plovidbe izvlačila na prirodna morska žala u zaštićenoj luci, nisu više zadovoljavala potrebe rimskog društva. Odgovor na pitanje zašto je pristanište sagrađeno baš na tom mjestu i koja je bila njegova prvotna namjena leži u razvoju urbanizma grada *Aenona*, provođenog od strane Rimljana.

Kamena gradnja za urbanizaciju tada liburnskog grada *Aenona* dopremana je iz rimskih kamenoloma na obližnjim zadarskim otocima, poput Mrtenjaka, Tukošćana, Lavadre (sl. 11). Taj teret morao je biti prevezen tjesnacem Veliki Ždrelac, između otoka Ugljana i otoka Rivnja, obilazno oko poluotoka, danas otoka Vira, pa kroz uzak, plitak i dugačak kanal Nova Poveljana, te kroz ninski zaljev do grada *Aenona*. Taj plovni put imao je više mana: bio je dug, plitkih i hridima ispunjenih kanala, bez prirodno zaklonjenih uvala za sklanjanje brodova za nevremena i izložen snažnoj Velebitskoj buri. Upravo zbog neostvarenih brodoloma, gubitaka mornara i brodova i zgotovljene kamene gradnje, carska građevinska ekipa morala je potražiti sigurnije i ekonomičnije rješenje. Rješenje je bilo izgradnja novog pristaništa, uz obalu Virskog mora, na najužem dijelu kopna što dijeli Nin od Virskog mora. Prednosti novosagrađenog pristaništa bile su višestruke. Dužina plovnog puta Veliki Ždrelac – Kremenjača skraćena je za više od 70 %, pristanište je zaštićeno od južnih i zapadnih vjetrova, nema opasnosti od hridi, izvor pitke vode je u neposrednoj blizini pristaništa, a tlo između pristaništa i grada je skoro vodoravno – jedina prepreka transportu građevinskog materijala je korito snažne rijeke Rijeke (Ilakovac 1995/96b).




Slika 11. Otoki zadarskog arhipelaga. Slovom K označeni su otoci na kojima su se nalazili kamenolomi (Iakovac 1995/96b)

S obzirom na količinu kamene građe koja je trebala biti dopremljena, a riječ je o 163 000 tona, može se zaključiti da je rimsko pristanište Kremenja prvotno i po funkciji sagrađeno u vezi s rješavanjem mnogih teškoća oko dovoza tolike kamene građe sa zadarskih otoka do liburnskog grada *Aenona* (Ilakovac 1995/96b).

Kod izgradnje rimskog grada *Aenona* preuzet je od ranije zatečen položaj gradskih zidova (GZ), kao i položaj dvaju gradskih vrata (GV-1 i GV-2). Zadržan je i položaj glavne gradske prometnice kao i stare ulice koja će kasnije postati *cardo maximus* (CM). Na uzvišenom položaju sagrađeno je forum (F) i hram (T), a uz južne gradske zidove tržnica, tj. *emporium* (E). Na položaju nekadašnjeg liburnskog drvenog mosta sagrađeno je rimski kameni most, a akvaduktom je dovedena tekuća voda u naselje. Na sjeveru se nalazila stara liburnska nekropola, a na jugu nova liburnsko-rimska (sl. 12).

Rimski urbanisti u slučaju grada *Aenona* nisu primijenili ortogonalni koordinatni sustav kao osnovu za rješavanje i uklapanje pojedinih planiranih objekata u gradsko tkivo. To im je bilo onemogućeno prihvaćanjem dijela urbanog naselja starog grada *Aenona*. U urbanizaciji su primjenjivane već uhodane građevinske tehnike poput zidanja klesanim kamenom u vapnenoj malti, oblaganje zidova vapnenom žbukom, pokrivanje podova kamenim pločama i slično. Jedan od bitnih čimbenika koji je uvjetovao urbano oblikovanje grada *Aenona* bio je njegov geografski položaj. S južne strane nalazila se rijeka *Riina* koja je ujedno bila i prirodna granica naselja. Prometnice su stvarane na najpovoljnijem položaju, a s obzirom da je jedina poveznica s kopnom bila na sjeverno-istočnoj strani, prvotna vrata liburnskog grada *Aenona* sagrađena su upravo tamo (GV-2) (sl. 12). Druga, južna vrata, sagrađena su kad je *Jader* (Zadar) stasao kao metropola svijeta Liburna. Važna činjenica koja objašnjava urbanizaciju i modernizaciju liburnskog grada *Aenona* je suživot domaćeg stanovništva s rimskim došljacima (Ilakovac 1995/96b).



Slika 12. Tlocrt Nina iz 19. stolje a (Ilakovac 1998)
 GZ – gradski zidovi, GV-1 i GV-2 – gradska vrata, CM – cardo maximus, F – forum, T – hram, E -
 emporium

1.6. Promjene morske razine Jadrana

Jadransko more svoj današnji oblik poprima u kvartaru, iako je sama jadranska zavala starija, nastala kao posljedica nabiranja Dinarida i Apenina. Prema Alfiveri u (1965), Jadransko more, odnosno njegov južni dio, nastalo je kao posljedica približavanja kontinentalnih blokova i orogenetskih procesa, kao i Sredozemno more. Tim procesima stvoreni su mladi planinski sustavi koji okružuju ova mora, a naglim uleknu em nastala je prolomna linija Jadranskog mora, koja i danas dijeli jadranski bazen u dva morfološka dijela. Tadašnja prolomna linija protezala se od Monte Gargana u Italiji, preko otoka Tremiti, Pianosa, Palagruže i Mljeta na današnje dalmatinsko kopno. Sjeverno od ove linije nalazilo se prostrano kopno, prekriveno nanosima alpskih rijeka.

U toku tercijara došlo je da zna ajnih kolebanja isto ne i zapadne obale Jadrana. itav obalni pojas dinarskog kopna, od So e do Albanije, u eocenu je bio prekriven morem. U miocenu i pliocenu Jadranska obala pomakla se prema zapadu, zbog ega je apeninska strana bila duboko poplavljenamorem, dok je isto na strana, sa svojim otocima, bila kopno (sl. 13). U toku pliocena, more se ponovno približilo isto noj strani zbog njenog spuštanja, dok se istovremeno izdizala zapadna strana.

itav jadranski oto ni pojas do posljednjeg interglacijalnog doba bio je spojen s kopnom. Tek krajem pleistocena obalni dio dinarskog kopna se spušta, uslijed ega je more preplavilo dijelove kopna i formira današnji oblik Jadranskog mora. Tako je sjeverni, odnosno pli i dio Jadrana nastao tek u kvartaru, to nije pleistocenu (Alfiveri 1965).

Kolebanja morske razine izmjenom glacijala i interglacijala u holocenu sveop a su pojava na Zemlji. Paleogeografske posljedice na Jadran bile su zna ajne jer je ve i dio Jadranskog mora relativno plitak, a na isto noj obali ima mnogo otoka i pli ina izme u njih. Za

vrijeme posljednjeg ledenog doba (Würm) razina Jadranskog mora spustila se čak za do 100 m (sl. 14). Za toplije klime, led se počeo otapati i voda pritjecati u more, pa se morska razina opet izdigla. Nalazi morskih pleistocenskih naslaga u okolini Zadra mogu se dovesti u vezu s izdizanjem morske razine u međuledenim razdobljima.



Slika 13. Jadran u pliocenu (Alfiveri 1965)



Slika 14. Jadran u pleistocenu (Alfiveri 1965)

Izdizanje morske razine je proces koji se nastavlja i u najmlađe geološko doba te su prva opažanja tog procesa starija od okeanog. Osobito je zanimljivo zapažanje A. Fortisa (1774): „More neprekidno osvaja Zadar; ako to ne dokazuju plime što preplavljaju ona mjesta do kojih voda nije smjela doprijeti kada su građena, dokazuju stari pločnici trga koji su mnogo niži od sadašnje srednje razine vode... Količina činjenica što se susreću duž jadranskih obala, činjenica koje dokazuju postepeno podizanje vode, ne dopušta da se o tome više može i nama sumnja... Bila je močvara, pjeskovita ili gorovita i mramorna, uz obalu našeg Zaljeva nalaze se potopljene razvaline drevnih građevina, a iz dana u dan množe se dokazi o podizanju razine... Ali budući da je podizanje razine od rimskih vremena do naših dana neosporna činjenica...“ Većina prvih dokaza bazirana je na upoznavanju građevinskih i arhitektonskih objekata poput lučkih objekata i zgrada, a kasnije se traže dokazi i u samoj prirodi, poput postojanja vrulja, koje su nastale kada je more preplavilo krški reljef (Šegota i Filipić 1991).

Dokaz o podizanju razine mora od antike je i nalaz antičke luke kraj Nina (Brusić 1968). Naime, sondiranjem je utvrđeno da se obala u antici nalazila 180 cm ispod današnje razine mora. Kulturni sloj nalazi se u sloju pijeska debelom 20-30 cm, a potječe iz I.-III. st. posl. Kr. Dakle, (180 + 25 = 205), oko dva metra ispod današnje površine. S obzirom na tu činjenicu i na plitkost Nininske lagune, Nina u antičko vrijeme nije mogao biti ni otok ni poluotok. Međutim, već tada je bio hidrografski izoliran jer je ispred njega tekla Ričina koja se tada ulijevala u more dalje od Nina nego danas. Budući da je sedimentiranje mulja holocenski proces, more je bilo vrlo plitko što nije bilo povoljno za plovidbu brodova. Također, potrebno je naglasiti da je današnji otok Vir tada bio spojen s kopnom, što je uvelike produživalo eventualnu zaobilaznu plovidbu do Nina. Navedene činjenice uvelike objašnjavaju prednost izgradnje antičke luke *Aenona* na 2,5 km udaljenom rtu Kremenjača (Šegota i Filipić 1991).

Na temelju ovog, ali i brojnih drugih istraživanja, formirana je kronologija izdizanja razine mora. U tablici 2. prikazana je kronologija Š. Batovića (1966), koju od mnogih kao

ponajbolju izdvajaju i koriste Šegota i Filip i (1991). Istraživanja su pokazala da se spuštanje isto nojadranske obale nastavlja i danas. Od osobitog značaja je mareografska metoda, kojom je dokazano postojanje konstantnog izdizanja srednje razine mora. Prema mjerenjima mareografskih stanica, na našoj obali ono iznosi 2,5 mm godišnje.

Tablica 2. Kronologija izdizanja razine mora Š. Batovića (Šegota i Filip i 1991)

GEOLOŠKO RAZDOBLJE	VREMENSKO RAZDOBLJE	RAZINA MORA
		NIŽA JE ZA:
stariji neolit	6 000 – 4 800 prije Krista	18,8 – 13,5 m
srednji neolit	4 800 – 3 500 prije Krista	13,5 – 9,0 m
mlađi neolit	3 500 – 2 600 prije Krista	9,0 – 6,5 m
eneolitik	2 600 – 2 000 prije Krista	6,5 – 5,0 m
bronzano doba	2 000 – 900 prije Krista	5,0 – 3,1 m
željezno doba	900 – 100 prije Krista	3,1 – 1,96 m

1.7. Arheobotani ke metode – analiza biljnih makrofosila

Uvjeti koji su vladali u prapovijesnim naseljenim područjima uvelike su utjecali na floru i vegetaciju. Upravo zato su biljni ostatci, na neki način na arheološkim lokalitetima, od velike važnosti za određivanje ekoloških promjena u prirodnim ekosustavima. Do tih promjena tijekom povijesti došlo je antropogenim ili prirodnim djelovanjem.

Znanost koja se bavi analizom biljnih ostataka recentnih vrsta naziva se arheobotanika, za razliku od paleobotanike koja proučava biljne ostatke izumrlih vrsta (Pearsal 2000).

Arheobotaničke metode uključuju analizu biljnih mikrofosila, poput spora i polena, te analizu biljnih makrofosila – sjemenki, plodova i ostalih generativnih i vegetativnih dijelova.

Vrlo popularna arheobotanička metoda, primjenjena i u ovom radu, je analiza makrofosila, golom oku vidljivih biljnih ostataka koji mogu biti determinirani pod malim povećanjem. Identifikacija pougljenog, osušenog ili vodom natopljenog drva, sjemenki, cvjetnih stapki, ljuski i kultiviranih biljaka uvelike je doprinijela razumijevanju ljudske prehrane i povijesti domestikacije biljaka.

Osim što doprinosi analizi prehrane i zdravlja ljudi kroz povijest, analiza biljnih makrofosila može dati odgovore na različita ekološka pitanja, poput:

- podrijetla i širenja kultiviranih biljaka i prateće korovne flore
- rekonstrukcije prirodne vegetacije i antropogenih promjena u okolini prapovijesnih i povijesnih naselja
- promjene nivoa i slanosti mora i dr. (Behre 1991).

Analiza uzoraka s arheoloških lokaliteta daje podatke o biljnim vrstama koje vode podrijetlo s različitih staništa u prijašnjem okolišu. Najčešće je riječ o tzv. tanatocenzama, biljnom materijalu različitog porijekla, koji je nataložen na istom mjestu djelovanjem ljudskih aktivnosti. Rjeđe se javljaju paleobiocenoze, biljni materijal dostupan u izvornom kontekstu (Behre 1991).

Uzorci za analizu biljnih makrofosila mogu se uzimati s različitih mjesta, suhih i vlažnih, a veličina uzorka ovisi prvenstveno o cilju istraživanja i o raznolikosti mjesta koje se istražuje. Svim uzorcima potrebno je i precizno odrediti starost.

Za analizu su osobito pogodni pougljeni ili karbonizirani ostaci. Do karboniziranja materijala dolazi pri izlaganju velikim temperaturama uz vatru, uslijed čega se biljne organske komponente pretvaraju u ugljen. Prednost ugljena je ta da nije osjetljiv na tzv. organizme razgrađivače, poput bakterija i gljivica, pa takvi biljni ostatci opstaju u većini tipova staništa. Biljni materijal koji je sačuvan isušivanjem, također je zaštićen od razgradnje, ali takvi procesi javljaju se samo pri ekstremnoj suhoći, odnosno u vrlo aridnim područjima (Zohary i Hopf 1988).

Najbolje sačuvani arheobotanički materijal u Europi dolazi iz mjesta koja su zasićena vodom, poput cretova, muljevitih dna jezera, izvora ili mora. Na takvim staništima vladaju anaerobni uvjeti koji djeluju kao vrlo efikasna zaštita biljnog materijala (Zohary i Hopf 1988).

2. MATERIJAL I METODE

Primjena arheobotaničke metode analize biljnih makrofosila ovisi prvenstveno o suradnji s arheolozima. Budući da je u ovom radu bila primijenjena na podvodni lokalitet, istraživanje je izvršeno u suradnji s hidroarheolozima.

Uzimanje uzoraka za analizu biljnih makrofosila ovog lokaliteta izvršeno je u suradnji s hidroarheolozima Odjela za podmorsku arheologiju Arheološkog muzeja Zadar, pod vodstvom dr. sc. Smiljana Gluševića.

Tijekom istraživanja antičke luke u Zatonu kraj Nina, u razdoblju od 2005. do 2007. godine, iskopavanja su obuhvatila 7 kvadrata: A1, A2, A3, B1, B2, B3 i C1. Razlučeno je ukupno 9 slojeva, u kojima je sakupljeno 52 uzorka, koji su numerirani (prilog, tab. 3, 4 i 5).

Godine 2002. i 2003. istraživanje u suradnji s hidroarheolozima provodi doc. dr. sc. Renata Šoštar, čiji su rezultati uklopljeni u rezultate daljnjih godina istraživanja (prilog, tab. 9). Godine 2004. arheološka istraživanja su iz financijskih razloga prekinuta, pa ni uzorci za arheobotaničku analizu nisu uzeti, a 2005. godine započela je nova iskopavanja, koja se nastavljaju sve do 2007. godine.

Istraživanje se obavljalo unutar kvadratne mreže veličine 250 x 250 cm sastavljene od aluminijskih cijevi (sl. 15). Na odabranoj poziciji prvo je očišćeno sve kamenje, nakon čega je mreža pravilno postavljena na dno i pričvršćena kako bi se onemogućilo njezino pomicanje (Glušević 2004).

Kvadranti su naknadno elastičnom gumenom trakom podijeljeni svaki na po četiri podkvadranta, dimenzija 125 x 125 cm (npr. B1/1, B1/2, B1/3 i B1/4). Dimenzije mrežišta uvjetovane su lakšom obradom pomoću posebnog softvera, koji je u vlasništvu poduzeća DFG Consulting iz Ljubljane, koje se bavi geodetskom dokumentacijom. Pomoću tog softvera i referentnih točaka stavljenih prema potrebi, moguće je dobiti digitalni model reljefa istraženog dijela slojeva u luci i samih ostataka broda (Glušević 2004).



Slika 15. Ronioci uzimaju uzorak iz označenog kvadranta
(<http://www.amzd.hr/images/stories/zaton/slika4.jpg>)

Za istraživanje su korištene klasične „mamuti“ sisaljke, ali i nove sisaljke razvijene po iskustvima i nacrtima arheologa iz Bavarske. Riječ je o sisaljka s pet metara dugim vrstnim dijelom, na koji se nastavlja pomični dio dug 2,5 metra (sl. 16). Prednost ovih sisaljki je u tome da se postiže bolja preglednost, jer je izbacivanje materijala prebačeno čak pet metara dalje od mjesta usisa. Uz to, pomični dio dijelom je mnogo sigurnije oistiti osjetljive dijelove (Glušević 2004).



Slika 16. Ronioci pažljivo mamutom uzima uzorak
(<http://www.amzd.hr/images/stories/zaton/slika3.jpg>)

U razdoblju od 2005. do 2007. godine, sakupljeno je ukupno 52 uzorka: 20 uzorka 2005. godine (tab. 3), 15 uzorka 2006. godine (tab. 4) i 17 uzorka 2007. godine (tab. 5). Godine 2005. analizirana je i mješavina dodatno sakupljenog biljnog materijala, koja potječe iz različitih rimskih slojeva (označen brojem 16, tab. 3) i sadržaj uzet iz pletene košarice (broj 20, tab. 3), dok je 2006. godine analiziran sadržaj nađen u vrhu (broj 10, tab. 4).

Kao što je ranije spomenuto, riječ je o arheološkom lokalitetu koje se nalazi na dubini 2,5 do 4 metra, pa su uzorke uzimali ronioci (sl. 15 i 16). Uzorci su uzimani u plastične kutije i označavani pripadajućim šifrom. Količine uzoraka variraju od 0,15 do 0,8 litara (tab. 3, 4 i 5).

Obrada uzoraka započeta je na terenu, u naselju Zaton. Svaki je uzorak pažljivo ispiran vodom preko tri sita s različitim mrežama od 2,5, 1,0 i 0,315 mm (sl. 17) složenih po veličini jedno na drugo s najkrupnijim sitom na vrhu (sl. 18). Na taj način odvojene su 3 frakcije uzorka:

1. frakcija – najkrupniji ostatci zadržani na situ s velikom mrežom 2,5 mm
2. frakcija – srednje veliki ostatci zadržani na situ s velikom mrežom 1,0 mm
3. frakcija – najfiniji ostatci u situ s finom mrežom 0,315 mm.



Slika 17. Sita veli ine mreža od 2.5, 1.0 i 0.315 mm za odvajanje pojedinih frakcija uzoraka



Slika 18. Sita postavljena jedno na drugo kako se koriste pri ispiranju uzoraka

Svaka od tih frakcija pažljivo je uz pomoć mlaza vode sakupljena u zasebnu posudu, natopljena vodom i tako pripremljena za daljnju obradu. Na terenu su uz pomoć lupe pregledane prve dvije frakcije i izdvojeni su i preliminarno determinirani biljni ostatci, koliko su to uvjeti na terenu dopustili. Izdvojeni biljni materijali 1. i 2. frakcije spremeni su u male kutijice, označeni šiframa i pažljivo transportirani u Zagreb, gdje su kasnije bili i detaljno pregledani i potpunije determinirani. Najfinija, treća frakcija sadrži fini sediment i je pregledavanje oduzima najviše vremena, u odnosu na ostale frakcije. U nedostatku vremena, treća frakcija nije pregledana, ali je natopljena vodom i pažljivo pohranjena (sl. 19).



Slika 19. Treća frakcija natopljena vodom i pohranjena u vrećice

Najveći dio obrade uzoraka napravljen je u Botaničkom zavodu PMF-a u Zagrebu. Na temelju biljni ostatci prve i druge frakcije determinirani su uz pomoć lupe povećanja 10-20x. Plodovi, sjemenke i drugi biljni ostaci poput grančica i fragmenata listova i kore determinirani su uz pomoć literature, komparativne zbirke recentnih sjemenki i plodova doc. dr. sc. Renate Šoštarić i herbarijske zbirke Botaničkog zavoda PMF-a u Zagrebu. Budući da specijalizirani ključevi za determinaciju biljnih taksona na temelju samo plodova i sjemenki ne postoje,

determinacija se temelji na metodi pokušaja i pogrešaka. Od velike pomoći za približno određivanje taksona su atlas i radovi koji sadrže crteže i/ili fotografije vrsta (kao npr. Bijernik 1997, Cappers i sur. 2006). Ukoliko je makrofossil sačuvan u dobrom stanju, od ključne je važnosti usporedba sa recentnim materijalom komparativne zbirke. Za određivanje pojedinih vrsta potrebna je usporedba finih površinskih struktura, za što je potrebno veće povećanje lupe, odnosno kvalitetnija oprema i spretnija ruka. Dio biljnih ostataka ostao je nedeterminiran, prvenstveno zbog toga što je riječ o vrlo loše sačuvanim ostatcima, ili o fragmentima granica i kore (tab. 10).

Najzanimljivije i najbolje sačuvane vrste su fotografirane i opisane su njihove glavne karakteristike. Nakon toga biljni ostaci konzervirani su u malim, tzv. „Eppendorf“ epruvetama, koje su složene u plastične čaše i 3 plastične kutije s poklopcem, po jedna za svaku godinu (sl. 20), a čuvaju se u Botaničkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao dokumentacija vezana za ovaj rad. Bitno je naglasiti da je materijal također dostupan za daljnju analizu.



Slika 20. Razvrstani, konzervirani i pohranjeni makrofosili

Konzervans kojim je materijal konzerviran sadrži:

2 dijela etanola,

1 dio glicerola,

1 dio vode i

1 % timola.

Makrofosili determinirani do razine vrste korišteni su u rekonstrukciji paleokoliša antičke luke u Zatonu, pri čemu su primijenjene spoznaje iz područja ekologije, etnologije i fitocenologije.

Unatoč činjenici da su slojevi s uzorcima taloženi stratigrafskim poretkom, arheolozi mogu detaljnije datirati samo uzorke pojedinih slojeva. Npr. dvije zdjele nađene u 3. sloju (zdjela porijeklom iz Afrike datirana 100-160 godine posl. Kr. i unjasta zdjela istog porijekla datirana 80-150 godine posl. Kr.) smještaju treći sloj u drugu četvrtinu II. st. posl. Kr. Općenito, slojevi iskopani u Zatonu daju materijalne dokaze aktivnosti negdašnjih rimskih luka tijekom perioda između I. st. i III. st. (eventualno IV. st.) poslije Krista (Gluševići 2004).

3. REZULTATI

Obradom ukupno 52 uzorka iz anti ke luke u Zatonu (prilog, tab. 6, 7 i 8) izolirano je ukupno 2575 makrofosila. Oni su analizirani i prikazani tabelarno, u četiri tablice (prilog, tab. 6 – 10) koje uključuju:

- popis biljnih makrofosila s brojem na enih sjemenki, plodova i dr. biljnih ostataka u svakom od uzoraka; svaka od ukupno tri tablice prikazuje pojedinu godinu istraživanja (2005, 2006 i 2007) – tab.6, 7 i 8

- popis biljnih makrofosila s brojem na enih sjemenki, plodova i dr. biljnih ostataka u svakom sloju, kroz sve godine istraživanja (2002 – 2007) – obuhvaća i rezultate doc. dr. sc. Renate Šoštari – tab. 9

- broj determiniranih taksona i biljnih ostataka u pojedinom uzorku i ukupan broj nedeterminiranih biljnih ostataka po uzorcima – tab. 10

Rezultati morfološke analize biljnih ostataka prezentirani su popisom determiniranih taksona, raspoređeni u pet skupina s obzirom na stupanj determinacije, zatim fotografijama najznačajnijih makrofosila determiniranih do nivoa vrste i njihovim opisima, te opisima na inačicu determinacije i morfoloških karakteristika vrsta koje se teže određuju.

Nakon toga, izvršena je ekološko – etnološka analiza determiniranih vrsta koja je u konačnici poslužila za rekonstrukciju paleoekoliša istraživanog lokaliteta, trgovine i prehrane mornara.

3.1. Tabela prikaz rezultata

Rezultati determinacije makrofosila i njihove analize na po etku su prikazani tabelarno, zbog bolje preglednosti i njihove lakše interpretacije.

Tablica 6 (u prilogu) sadrži popis biljnih makrofosila determiniranih tijekom analize 20 uzoraka iz 2005. godine i broj pojedinih makrofosila u pojedinom uzorku. Najprije su abecednim redom nanizane sigurno determinirane vrste i tzv. cf.-vrste (lat. confer = usporedi, izjedna i, napravi sli nim), koje nisu potvr ene sa sigurnoš u. Nakon vrsta nanizani su rodovi i cf.-rodovi, a zatim porodice i cf.-porodice. Na dnu su prikazani razli iti tipovi nedeterminiranih biljnih ostataka, ozna eni sa INDET. Tako er, prikazan je i zbroj makrofosila pojedinog tipa i makrofosila pojedinog uzorka.

Tablice 7 i 8 (u prilogu) sadrže jednako sastavljene podatke, ali ti podatci odnose se na 2006. godinu u slu aju tablice 7, odnosno 2007. godinu u slu aju tablice 8.

Pri usporedbi podataka treba obratiti pozornost na razli ite koli ine pojedinog uzorka, odnosno na injenicu da su analizirane razli ite koli ine uzoraka (prilog, tab. 3, 4 i 5). S obzirom da je ipak rije o približno jednakoj koli ini uzorka, odnosno ve a odstupanja prisutna su u svega nekoliko uzoraka, brojevi makrofosila svakog uzorka nisu prera unavani u broj makrofosila po jednoj litri uzorka.

Tablica 9 (u prilogu) donosi pregled biljnih makrofosila svih stupnjeva determinacije po slojevima. Obuhva eni su rezultati cjelokupnog istraživanja od 2002. do 2007. godine, ali su zbog preglednosti brojevi koji ozna avaju makrofosile determinirane i pobrojane od strane doc. dr. sc. Renate Šoštari ozna eni sa * i dodani rezultatima 2005. do 2007. godine istraživanja (npr. 5 + 3*).

Tablica obuhvaća ukupno 9 slojeva, dok su rezultati uzorka 16 i uzorka 20 iz 2005. godine prikazani u jednom stupcu (mix/koš), a odnose se na miješani uzorak koji je prikupio mamut i uzorak sadržaja košarice (prilog, tab. 3).

Prikazana je tako i suma brojeva makrofosila u pojedinom sloju i suma brojeva pojedinog makrofosila u svim slojevima i mix/koš. Najvažnija karakteristika ove tablice jest da prikazuje sveobuhvatne rezultate svih 5 godina istraživanja (od 2002. do 2007. godine).

Pregledom tablice 9 uočava se da su analizom ukupno 3561 makrofosila (kroz svih 5 godina istraživanja) determinirane 62 biljne vrste (3169 biljnih ostataka), 20 rodova (65 biljnih ostataka), 3 porodice (72 biljna ostatka), 1 red (7 biljnih ostataka) i 31 približno determiniranih vrsta, odnosno rodova (46 biljnih ostataka).

Budući da određeni broj makrofosila iz razdoblja 2005. – 2007. nije determiniran (172 makrofosila), tablica 10 donosi pregled broja nedeterminiranih biljnih ostataka po uzorcima, u usporedbi sa ukupnim brojem determiniranih taksona i determiniranih biljnih ostataka po uzorku. Riječ je samo o uzorcima obrađenima u razdoblju od 2005. do 2007. godine, jer podatci o ranije obrađenim uzorcima dostupni su samo u prikazu po slojevima, pa su stoga uključeni samo u tablicu 9 koja rezultate prikazuje po slojevima. S obzirom da je sloj 1 isključivo, a sloj 2 djelomično obrađivan 2002. i 2003. godine, ti slojevi analizirani su samo u smislu broja taksona pojedinog sloja, dok podatci o točnom broju makrofosila u pojedinom uzorku nisu dostupni.


Uzorci su sačuvani u dobrom stanju u velikom postotku jer potječu iz morskog sedimenta, odnosno sredine zasićene vodom. To je omogućilo identifikaciju tako velikog broja makrofosila. Skoro svi makrofosili su nekarbonizirani, a budući da podatak o karbonizaciji nije presudan za interpretaciju rezultata, u tablicama nije označavano da li je riječ o karboniziranom ili nekarboniziranom biljnom materijalu.

Analizom odnosa broja determiniranih taksona po uzorcima i slojeva iz kojih uzorci potječu, može se uočiti da su najbogatiji različitim taksonima slojevi 6 i 7, dok su površinski slojevi (1-5) te dublji slojevi (8-9) siromašniji različitim taksonima (sl. 21).


Što se tiče odnosa ukupnog broja biljnih makrofosila po uzorcima i slojeva iz kojih potječu, uglavnom se ponavlja slika na pravilnost kao i u prethodno opisanom odnosu. Pogotovo su brojčano siromašni slojevi 1, 2 i 9 (sl. 22).

Iako je planirano da se arheobotanički uzorci uzimaju ravnomjerno iz svih slojeva i u podjednako velikim količinama, zbog zahtjevnosti podvodnog arheološkog iskopavanja to nije bilo moguće realizirati željenom preciznošću. Najveći broj uzoraka uzet je iz sloja 6 i sloja 7, stoga je logično da su ti slojevi i općenito najbogatiji makrofosilima i različitim taksonima.

Različitim taksonima najbogatiji je uzorak 6, iz 2007. godine, s determiniranim 21 različitim taksonom te sa ukupno 171 makrofosila (prilog, tab. 10). Taj uzorak odgovara sloju 7, kvadranta C1/3. Od svih uzoraka iz 2005., 2006. i 2007. godine, uzorak 6 iz 2007. godine ujedno je i najbrojniji makrofosilima.



Slika 21. Dijagram ukupnog broja deterniranih taksona po slojevima



Slika 22. Dijagram ukupnog broja makrofosila po slojevima

3.2. Morfološka analiza kritičnih svojti i njihova determinacija

Makrofosili su determinirani na temelju njihovih morfoloških karakteristika. Za identifikaciju su na raspolaganju bili samo plodovi, sjemenke ili pojedini vegetativni dijelovi (vrlo rijetko), pa su morfološke karakteristike tih biljnih ostataka pažljivo analizirane i uspoređene s recentnim materijalom i fotografijama i crtežima u literaturi.

Prije prikaza rezultata morfološke analize kritičnih svojti izrađen je popis svih determiniranih taksona. Znanstveni nazivi biljnih taksona usklađeni su prema Erhardt i sur. (2002), dok su hrvatski nazivi usklađeni prema Domac (2002). Po abecednom redu poredane su najprije vrste, zatim rodovi, porodice, razredi i na kraju tzv. cf.-taksoni. Taksoni su numerirani, a brojem su preskočeni oni koji su već spomenuti kao preciznije determinirani taksoni (npr. vrsta *Castanea sativa* je numerirana brojem 11, a *C. cf. sativa* nije numerirana).

Makrofosili determinirani na razini vrste:

1. *Agrimonia eupatoria/procera* (*A. eupatoria* L. / *A. procera* Wallr.)
2. *Agrostemma githago* L.
3. *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb.
4. *Anagallis arvensis* L.
5. *Anethum graveolens* L.
6. *Anthemis arvensis* L.
7. *Anthemis tinctoria* L.
8. *Atriplex patula* L.

9. *Artiplex prostrata* Boucher ex DC
10. *Camelina sativa* (L.) Cr.antz
11. *Castanea sativa* Mill.
12. *Chenopodium album* L.
13. *Cichorium intybus* L.
14. *Cirsium arvense* (L.) Scop.
15. *Conium maculatum* L.
16. *Cordia myxa* L.
17. *Coriandrum sativum* L.
18. *Corylus avellana* L.
19. *Cucumis melo* L.
20. *Cucumis melo/sativus* (*C. melo* L. / *C.sativus* L.)
21. *Daucus carota* L.
22. *Euphorbia helioscopia* L.
23. *Ficus carica* L.
24. *Fumaria officinalis* L.
25. *Glaucium corniculatum* (L.) Rudolph
26. *Juglans regia* L.
27. *Juniperus phoenicea* L.
28. *Medicago arabica* (L.) Huds.
29. *Myosoton aquaticum* (L.) Moench
30. *Myrtus communis* L.
31. *Olea europaea* L.
32. *Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm.
33. *Panicum miliaceum* L.

34. *Physalis alkekengi* L.
35. *Pinus pinea* L.
36. *Polygonum aviculare* L.
37. *Polygonum hydropiper* L.
38. *Polygonum minus* Huds.
39. *Polygonum persicaria* L.
40. *Prunella vulgaris* L.
41. *Prunus amygdalus* Batsch.
42. *Prunus avium/cerasus* (*P. avium* L./ *P. cerasus* L.)
43. *Prunus cerasus* L.
44. *Prunus domestica ssp. domestica* L.
45. *Prunus persica* (L.) Batsch
46. *Quercus ilex* L.
47. *Ranunculus acris* L.
48. *Ranunculus repens* L.
49. *Raphanus sativus* L.
50. *Reseda phyteuma* L.
51. *Rubus fruticosus* L.
52. *Rumex acetosa* L.
53. *Rumex acetosella* L.
54. *Rumex obtusifolius* L.
55. *Rumex pulcher* L.
56. *Sambucus ebulus* L.
57. *Sambucus nigra* L.
58. *Silene vulgaris* (Moench) Garcke

59. *Typha angustifolia/latifolia (T. angustifolia / T. latifolia L.)*
60. *Urtica urens L.*
61. *Verbena officinalis L.*
62. *Vitis vinifera L.*

Makrofosili determinirani na razini roda:

63. *Atriplex/Chenopodium sp.*
64. *Bromus sp.*
65. *Citrus sp.*
66. *Fumaria sp.*
67. *Galeopsis sp.*
68. *Juncus sp.*
69. *Malus/Pyrus sp.*
70. *Malva sp.*
71. *Medicago sp.*
72. *Mentha sp.*
73. *Pinus sp.*
74. *Polygonum sp.*
75. *Quercus sp.*
76. *Ranunculus sp.*
77. *Rosa/Rubus sp.*
78. *Rubus sp.*
79. *Rumex sp.*
80. *Sambucus sp.*

81. *Thalictrum* sp.

82. *Triticum* sp.

Makrofosili determinirani na razini porodice:

83. *Apiaceae*

84. *Fabaceae*

85. *Poaceae*

Makrofosili determinirani na razini razreda:

86. *Bryatae*

Makrofosili determinirani na razini cf.-vrste ili cf.-roda:

cf. *Agrostemma githago* (usp. br. 2.)

cf. *Ajuga chamaepitys* (usp. br. 3.)

87. cf. *Brassica nigra*

. cf. *Castanea sativa* (usp. br. 11.)

88. *Chrysanthemum*=*Glebionis* cf. *coronarium*

89. cf. *Cistus salviifolius*

cf. *Corylus avellana* (usp. br. 17.)

cf. *Coriandrum sativum* (usp. br. 18.)

cf. *Ficus carica* (ups. br. 23.)

Fumaria cf. *officinalis* (usp. br. 24.)

cf. *Fumaria officinalis* (usp. br. 24.)

90. cf. *Linum usitatissimum*
cf. *Olea europea* (usp. br. 31.)
91. cf. *Panicum aviculare*
cf. *Physalis alkekengi* (usp. br. 34.)
Prunus cf. *dulcis* (usp. br. 45.)
cf. *Quercus ilex* (usp. br. 47.)
Ranunculus cf. *acris* (usp. br. 49.)
Ranunculus cf. *repens* (usp. br. 50.)
92. cf. *Reichardia picroides*
Rumex cf. *obtusifolius* (usp. br. 55.)
Silene cf. *vulgaris* (usp. br. 59.)
93. cf. *Zannichellia palustris*
94. cf. *Amaranthus*
95. cf. *Anthemis* sp.
96. cf. *Malus/Sorbus* sp.
97. cf. *Torilis* sp.
98. cf. *Typha* sp.
99. cf. *Xanthium* sp.
100. cf. *Apiaceae*
101. cf. *Lamiaceae*

Najznamenitiji biljni makrofosili prikazani su fotografijama, uz koje su navedeni i opisi pojedinog makrofosila koji upućuju na morfološke karakteristike po kojima se pojedine vrste prepoznaju na makrofosilnom nivou.

Ukoliko vrsta nije problematična, opis je kratak, no ako se radi o vrsti koja se može lako zamijeniti nekom drugom vrstom, morfološki sličnog makrofosila, tada su vrste komparirane i istaknute su morfološke karakteristike koje ih razlikuju.

Makrofosili su većinom sačuvani u dobrom stanju, ali ipak ne u toliko dobrom da je moguće odrediti usko shvaćene vrste ili podvrste. Na temelju geografske rasprostranjenosti ili ekoloških uvjeta ponekad je moguće pretpostaviti da se radi o određenoj uže shvaćenoj vrsti ili podvrsti, pa je to onda također naznačeno u opisu.

Na ovaj način opisan je i fotografijom prikazan 21 makrofosil determiniran do nivoa vrste. Makrofosili determinirani do nivoa roda nisu prikazani fotografijama i opisivani. Najčešće je riječ o oštećenim makrofosilima koji se iz tog razloga nisu mogli precizno odrediti, ili se radi o rodovima koje vrste imaju vrlo slične plodove ili sjemenke. U tom slučaju, bez obzira na to koliko je makrofosil dobro sačuvan, nije moguće izdvojiti ni široko shvaćene vrste.

Makrofosili determinirani na nivou porodice i razreda, te čf.-taksoni također nisu posebno opisivani niti predloženi fotografijom.



Slika 23. Ajuga chamaepitys

unjasti plod (merikarp) zaobljenog vrha i baze (sl. 23). Površinska struktura je vrlo specifična: u gornjoj polovici nižu se nepravilne poprečne brazde koje u donjoj polovici prelaze u izbočine sa astog izgleda. U gornjem dijelu, na jednoj strani merikarpa nalazi se ovalni ožiljak – mjesto klanja ploda na četiri merikarpa.



Slika 24. Cordia myxa

Endokarp ovalnog oblika, sa karakterističnim udubinama na oba vrha. Površinska struktura je karakteristična, nekoliko većih grebena i udubina koji se ne pružaju cijelom dužinom, nego od otprilike donje petine, pa skoro do vrha (sl. 24).



Slika 25. Coriandrum sativum

Okruglasti plod, vidljivih primarnih i sekundarnih rebara (sl. 25). Na površini se izmjenjuju ravna tanja rebra sa vijugavim debljim rebrima. Na vrhu ploda nalazi se stožasta uzvisina.



Slika 26. Cucumis melo

Svijetlo sme a sjemenka vretenastog oblika, blago spljoštena s izraženim oštrim rubom. Veli ina sjemenki dinja vrlo je varijabilna, kao i veli ina sjemenki srodne vrste *Cucumis sativus* L. Kako je to Küster (1988) prvi uo io, ove dvije vrste razlikuju se po površinskoj strukturi: *C. melo* (sl. 26) na površini ima fine ravne paralelne linije, dok su

površinske linije vrste *C. sativus* u srednjem dijelu paralelne i ravne, a od njih se odvajaju paralelne linije koje slijede vretenast oblik sjemenke. Na kraju gdje je pupani ožiljak, razlika se teško uočava, ali se zato dobro vidi na suprotnom, ušiljenom kraju.



Slika 27. *Euphorbia helioscopia*

Jajasta sjemenka crne boje, površina prekrivena nepravilno-sastim strukturama izbočenog ruba (sl. 27). Na vrhu sjemenke nalazi se nastavak koji nalikuje na pupini kljun, a riječ je o ostatku funikulusa. Uzdužno sjemenku obavija karakteristična tanka linija.



Slika 28. Ficus carica

Okruglasti, blago spljošten plodi (oraš i) relativno nepravilna oblika, s grebenom koji prolazi vršnim i bo nim dijelom. U bo nom dijelu plodi a greben prelazi u specifi an ožiljak (trbušni šav), koji prolazi jednom tre inom bo ne dužine. Veli ina ploda može znatno varirati. Plodi i su žuto-sme e boje. Vrlo sli ni su plodi i vrste *Fragaria vesca*, kod kojih trbušni šav prolazi cijelom dužinom plodi a. Cijeli plodi i vrste *Ficus carica* (sl. 28) obi no se javljaju u prvoj frakciji, a dijelovi u drugoj i tre oj frakciji, za razliku od vrlo sli nih plodova vrste *Fragaria vesca* koji su u prosjeku nešto manji i obi no ne dolaze u prvoj frakciji. Budu i da u uzorcima nije na en nijedan plodi jagode, na eni dijelovi plodi a determinirani su kao *Ficus carica*. Kada bi u uzorku bili prisutni i plodi i vrste *Fragaria vesca*, ne bi bilo mogu e razlikovati dijelove plodi a jedne i druge vrste.



Slika 29. *Glaucium corniculatum*

Tamno-smeđa sjemenka, polukružnog oblika. Na površini ima jasno izražene saaste tvorevine s izbočenim rubovima. Na bočnom dijelu uočljiva su dva izbočenja u obliku roga, koji su svaki na jednom kraju sjemenke. Vrlo je slična i srodna vrsta *G. flavum* ije su sjemenke slične veličinom i oblikom, ali je oblik površinskih stanica drugačiji. Vrsta *G. corniculatum* (sl. 29) nije recentno zabilježena za Hrvatsku, ali je prisutna u flori jugoistočnih krajeva, u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.



Slika 30. Juglans regia

U uzorcima je na en velik broj fragmenata orahove ljuske (sl. 30), lako prepoznatljive po specifi nim nepravilnim izbo inama i brazdama na vanjskoj površini sme e boje, te po manje kvrgavoj i gotovo crnoj unutrašnjosti ljuske.



Slika 31. *Medicago arabica* grupa TIP 1



Slika 32. *Medicago arabica* grupa TIP 2

Plod (mahuna) smotan je poput puževe kuice. Površina spljoštenih kolobara je mrežasta, rub je širok i na njemu su poredane kukasto svinute bodlje. Plod je tamno-smeđe boje. Postoji više vrsta roda *Medicago* sa smotanim mahunama koje nije moguće precizno razlikovati, a velika je vjerojatnost da se radi o vrsti *M. arabica*. Stoga su makrofosili označeni kao *Medicago arabica* grupa i svrstani u dvije grupe: *Medicago arabica* grupa TIP 1 (sl. 31) i *Medicago arabica* grupa TIP 2 (sl. 32) s malim razlikama u obliku mahune: TIP 1 ima duže i u više redova poredane tanje bodlje, dok su bodlje TIP 2 kraće i malobrojnije.



Slika 33. *Myrtus communis*

Sjemenke mirte (sl. 33) bubrežastog su, nepravilnog oblika. Većina sjemenke je smeđe boje, sjajna, s fino iscrtkanom površinom, dok je u sredini, na mjestu bubrežastog udubljenja, crni, hrapavi hilum.



Slika 34. *Olea europaea*

Koštice masline (endokarp) su unjastog do jajastog oblika, blago ušiljene na jednoj strani i odrezane na strani hiluma (sl. 34). Boja varira od smeđe do gotovo crne. Površina je blago naborana i uočavaju se plitke, uzdužne brazde sa žilicama koje se mjestimično isprepliću. Unutrašnja strana koštice je glatka, a debljina stijenke varira od 0,5-1,3 mm.



Slika 35. *Orlaya grandiflora*

Merikarp (sl. 35) je ovalno izdužen, plosnat, s jedne strane odrezan, a s druge izdužen u vrat s dvozubim kljunom. Površina je sivo-smeđe boje sa svjetlijim linijama. Na strani kalanja plod je gladak, s uzdignutim rubom, a s druge strane ploda izbočena su uzdužna rebra. Strše i trnovi na plodu, vidljivi na recentnim plodovima, eliminirani su mehaničkim djelovanjem sedimenta, morskih struja i/ili valova.



Slika 36. *Panicum miliaceum*

Na jednoj strani je pšeno s pljevicom (sl. 36) svijetlo-smeđe boje, široko jajoliko. Na oba kraja pšeno je blago ušiljeno. Pljevica je fino uzdužno isprugana, uvrnutih rubova.



Slika 37. Pinus pinea (sjiemenke)



Slika 38. Pinus pinea (plodne ljuste)

Sjiemenke pinije (pinjole) trokutaste su, ovalnih rubova, blago izdužene, glatke, smeđe boje, mjestimično tamne, skoro crne (sl. 37). Stjenke su debele oko 1,5 mm, s unutarnje strane su tamnije i glatke.

Ljuske ešera (sl. 38) imaju izbočinu, tamno-smeđu, sjajnu, grebenastu apofizu i izraziti pupak te dva krupna udubljena ležišta sjemenki.



Slika 39. *Prunus amygdalus*

Endokarp je ovalnog oblika, drvenast, na jednom kraju odrezan, a na suprotnom blago ušiljen (sl. 39). Površina je izbrazdana i mjestimično izbušena rupama uzvišenog ruba.




Slika 40. *Prunus avium/cerasus*

Okrugle koštice s jedne strane odrezane, a s druge strane blago ušiljene. Polovicom dužine koštice prolazi slojeviti rub (trbušni šav). Koštice vrsta *P. avium* i *P. cerasus* (sl. 40) vrlo su slične, a kao razliku Kroll (1977) navodi morfologiju hiluma i trbušnog šava. Kod vrste *P. avium* hilum je manji i trbušni šav slabije je izražen, odnosno ima slabije izražene brazde. S obzirom da je ovdje riječ o makrofosilima koji su dugo izloženi djelovanju valova i sedimenta, detalji koštica nisu uočljivi, pa nije moguće odrediti radi li se o trešnji ili o višnji.



Slika 41. Prunus domestica

Sjemenka je izdužena, asimetrična, spljoštena i ušiljena na oba vrha (sl. 41). Dorzalni rub jako je zaobljen, za razliku od ventralnog, koji je blago zaobljen. Prednji luk obično ima dva grebena i dvije sekundarne brazde. Površina je gruba, blago izbrazdana i naborana.



Slika 42. Prunus persica

Okrugla do izduženo jajasta sjemenka (sl. 42). S jedne strane je nepravilno odrezana, a s druge ušiljena. Uokvirena je grubim, nepravilnim slojevitim rubom. Površina je nepravilno naborana, s dubokim brazdama.



Slika 43. *Reseda phyteuma*

Sjemenka bubrežastog oblika, gornji i donji dio nisu jednake veličine (sl. 43). Crne je boje, karakteristične površinske strukture: nepravilne brazde nejasnih rubova pružaju se cijelom sjemenkom.



Slika 44. *Rubus fruticosus*

Teško je međusobno razlikovati pojedine vrste roda *Rubus* na temelju makrofosilnih ostataka. S velikom sigurnošću mogu se prepoznati vrste *R. idaeus* i *R. saxatilis*, dok se različite vrste crnih kupina mogu prepoznati samo kao agregat *Rubus fruticosus* (sl. 44).

Koštice te skupine su zaobljene i imaju površinske saaste tvorevine snažno izraženih rubova. Koštica *R. saxatilis* također je zaobljena, ali su rubovi površinskih saastih tvorevina slabo izraženi.

Koštica vrste *R. idaeus* je izdužena, sa snažno izraženim rubovima saastih tvorevina i vrlo uoljivim kljunom. Koštice naene u uzorcima imale su mjestimično slabije izražene rubove saastih tvorevina, što je vjerojatno posljedica djelovanja sedimenta i valova.



Slika 45. *Vitis vinifera*

Sjemenke su varijabilnog oblika i veličine, okruglasto kruškaste, blago spljoštene, crne ili smeđe boje (sl. 45). Imaju karakteristično udubljenje s jedne strane, a s druge strane su dva izdužena plika udubljenja. Jedan kraj sjemenke je blago zaobljen, a drugi kraj se produžuje u kvrgavo odsjeceni vrh. Moguće je razlikovati makrofosilne ostatke kultivirane vrste *Vitis vinifera* i divlje vrste *Vitis sylvestris*. Sjemenke vrste *V. sylvestris* su manje, kraće i okruglije, dok sjemenke vrste *V. vinifera* imaju duže vrhove i šire su (Renfrew 1973).

3.3. Ekološko-etnološka analiza determiniranih makrofosila

Ovim radom do razine vrste determinirana su 62 makrofosilna biljna ostatka. Provedena je njihova ekološko-etnološka analiza i rezultati te analize korišteni su u rekonstrukciji vegetacije i paleookoliša istraživanog lokaliteta u Zatonu kraj Nina, prehrane mornara te sadržaja brodskog tereta, odnosno trgovine.

Pregledom popisa determiniranih vrsta možemo uoiti da je rije uglavnom o tzv. tanatocenozi (Behre 1991), odnosno o biljnom materijalu koji je na istom mjestu nataložen djelovanjem ljudske aktivnosti. Mjesto sakupljanja uzoraka nalazi se u luci, koja se već u antičko vrijeme nalazila ispod razine mora. Većina otkrivenih makrofosila najvjerojatnije predstavljaju ostatke brodskog tereta, odnosno hranu rimskih moreplovaca. Ne može se isključiti ni mogućnost da je dio materijala donesen vjetrom, pogotovo kada je rije o korovnim i ruderalnim biljkama. Dio makrofosilnog materijala je vjerojatno u arheološke slojeve dospio kao otpadni materijal, odnosno smeće koje se ponekad bacalo u more.

Većina determiniranih vrsta ipak je autohtona u ovim prostorima. Da bi se šaroliki materijal grupirao u određene skupine i rekonstruirao paleookoliš, korišteni su različiti kriteriji. Najprije su izdvojene kultivirane i korisne zeljaste i drvenaste biljke. Pritom su korišteni literaturni podatci o upotrebi pojedinih biljnih vrsta u prošlosti i sadašnjosti. Korištena je sljedeća literatura: Renfrew (1973), Schoch i Schweingruber (1988), Zohary i Hopf (1988).

Zatim su na temelju ekoloških karakteristika formirane tri skupine: korovi i ruderalne biljke, biljke vodenih i vlažnih staništa, te elementi (polu)prirodne vegetacije. U obzir se uzimala i pripadnost pojedinih vrsta određenim biljnim zajednicama, odnosno fitocenozama.

Pritom je korištena slijedeća literatura: Horvati (1963), Horvat i sur. (1962) i Šegulja i Topić (2000).

Navedene kategorije determiniranih vrsta predložene su popisom, a zatim je u zasebnim poglavljima izvršena njihova detaljna ekološko-etnološka analiza. Brojem u zagradi naznačen je ukupan zbroj pojedinog makrofosilnog ostataka nađenog u svim uzorcima, odnosno slojevima kroz sve godine istraživanja (2002-2007).

Ekološke kategorije determiniranih vrsta:

1. Kultivirane i korisne zeljaste biljke

Anethum graveolens (5)

Daucus carota (1)

Camelina sativa (3)

Panicum miliaceum (9)

Coriandrum sativum (12)

Physalis ankekengi (6)

Cucumis melo (11)

Raphanus sativus (1)

Cucumis sativus (*Cucumis melo/sativus*) (26)

2. Kultivirane i korisne drvenaste biljke

Castanea sativa (2)

Prunus amygdalus (11)

Corylus avellana (9)

Prunus avium (*Prunus avium/cerasus*) (11)

Cordia myxa (1)

Prunus cerasus (2)

Ficus carica (997)

Prunus domestica ssp. domestica (2)

Juglans regia (286)

Prunus persica (4)

Myrtus communis (1)

Rubus fruticosus (61)

Olea europaea (396)

Sambucus nigra (1)

Pinus pinea (108)

Vitis vinifera (954)

3. Korovi i ruderalne biljke

Agrimonia eupatoria (*Agrimonia eupatoria/procera*) (1)

Agrimonia procera (*Agrimonia eupatoria/procera*)

Agrostemma githago (6)

Medicago arabica (103)

Ajuga chamaepitys (5)

Orlaya grandiflora (1)

Anagallis arvensis (1)

Polygonum aviculare (10)

Anthemis arvensis (1)

Polygonum hydropiper (1)

Anthemis tinctoria (2)

Polygonum minus (1)

Atriplex patula (1)

Polygonum persicaria (2)

Atriplex prostrata (1)

Ranunculus repens (10)

Camelina sativa (3)

Reseda phyteuma (10)

Chenopodium album (9)

Rumex acetosella (1)

Cichorium intybus (1)

Rumex obtusifolius (3)

Cirsium arvense (1)

Rumex pulcher (4+3)

Conium maculatum (1)

Sambucus ebulus (4)

Euphorbia helioscopia (31)

Urtica urens (3)

Fumaria officinalis (15)

Verbena officinalis (2)

Glaucium corniculatum (1)

4. Biljke vodenih i vlažnih staništa

Myosoton aquaticum (1)

Typha angustifolia (*Typha angustifolia* /*latifolia*) (3)

Typha latifolia (*Typha angustifolia* /*latifolia*)

5. Elementi (polu)prirodne vegetacije

Daucus carota (1)

Quercus ilex (2)

Juniperus phoenicea (1)

Ranunculus acris (4)


Myrtus communis (1)

Rumex acetosa (1)


Prunella vulgaris (1)

Silene vulgaris (1)

U svakoj od pet kategorija pobrojane su različite vrste iji su makrofosili na eni u uzorcima. Najveću raznolikost pokazuje kategorija korovnih i ruderalnih biljaka, s čak 30 različitim vrstama (sl. 46). U svakoj kategoriji pobrojan je ukupan broj makrofosila, dok je u zgradama uz pojedinu vrstu prikazan broj makrofosila te vrste. Najbrojnija skupina je skupina kultiviranih i korisnih drvenastih biljaka, s 2846 makrofosilnih ostataka, dok najmanje makrofosila broji skupina biljaka vodenih i vlažnih staništa (sl. 47).



Slika 46. Grafički prikaz broja različitih vrsta u pojedinim grupama



Slika 47. Grafički prikaz ukupnog broja na enih makrofosila u pojedinim grupama

3.3.1. Kultivirane i korisne zeljaste biljke

U ovu skupinu uključene su zeljaste biljke koje su se kultivirale kao za inske biljke ili povrće. Također u ovu skupinu pripada i jedna žitarica (jednogodišnja trava koja se uzgaja u prehrambene svrhe) – proso (*Panicum miliaceum*). Žitarice su od posebne važnosti kao glavni izvor hrane za čovječanstvo, ali i glavna kultura većine civilizacija. Prije otkrića Amerike i povezivanja Europe s Dalekim Istokom i južnijim dijelovima Afrike, različiti dijelovi svijeta ovisili su o različitim žitaricama: proizvodnja hrane u Europi i ne-tropskim dijelovima Azije temeljila se uglavnom na pšenici i ječmu, južna i jugo-istočna Azija imale su rižu, Amerika kukuruz, a južni dijelovi Afrike sirak i proso.

Uzgojna prednost žitarica jest što rastu na otvorenim terenima (kultivirana polja), životni ciklus završavaju u manje od godinu dana, a nutritivna vrijednost im je vrlo velika i mogu se sačuvati kroz duži period (Zohary i Hopf 1988).

Anethum graveolens (kopar)

Kopar je jednogodišnja aromatična štitarka srodna komora u (*Foeniculum vulgare*), koja se i danas vrlo često uzgaja, najčešće za pripravu različitih umaka (Grlić 1986). Postoje dokazi da kopar pripada rimskoj, ali i grčkoj agrikulturi, a postoje i informacije o ranim fazama kultiviranja. Nekoliko granica kopra nađeno je u grobnici Amonofisa II kod Tebe, a pretpostavlja se da granice potječu iz vremena otprilike 1500 godina pr. Kr. (Zohary i Hopf 1988).

Danas je kopar raširen cijelim Mediteranskim bazenom i u zapadnoj Aziji, a taj areal, uz kultivirane, obuhvaća i divlje i korovne tipove kopra (Zohary i Hopf 1988).

Coriandrum sativum (korijandar)

Uzgajana ve inom zbog aromati nih plodova, korijandar je poznat od anti kih vremena, što nam potvr uju biljni makrofosilni ostatci, ali i pisani dokazi. Jedan od najzna ajnijih arheoloških nalaza jest onaj iz Tutankamonove grobnice, koji se procjenjuje na XIV. st. pr. Kr. (Zohary i Hopf 1988).

Rimljani su korijandar upotrebljavali kao za in, dodavali su ga vinima, kompotima, juhama i mesnim jelima (Renfrew 1973).

Danas je *Coriandrum sativum* rasprostranjen širokim agrikulturalnim podru jima Starog Svijeta, pa je stoga teško procijeniti u kojim je podru jima rije o divljem tipu, a u kojima o korovu. Na podru ju Bliskog Istoka i isto nog dijela Mediterana, korijandar raste uz hrastove šume i šikare i pretpostavlja se da su ova podru ja izvorišta i kultiviranih i korovnih oblika (Zohary i Hopf 1988).

Cucumis melo (dinja)

Cucumis melo obuhva a veliki broj varijeteta, od slatkih vo nih, do danas rijetkih oblika koji više podsje aju na povr e, a konzumiraju se poput krastavaca. Ovim radom obuhva ena je vo na vrsta, rasprostranjena na podru ju Mediterana.

Iako su arheološki ostatci ove vrste rijetki, neki potvr uju da je ova vrsta kultivirana ve u Bron ano doba (Zohary i Hopf 1988).

Cucumis sativus (krastavac)

Prema navodima Zochary i Hopf (1988), krastavac ne pripada skupini autohtonog povrća Bliskog Istoka i Mediterana, već se kao divlja forma javlja jedino na Himalaji i pripadaju im područja jima istočno od planinskog pojasa.

Pretpostavlja se da je krastavac unesen u kulturu u sjevernoj Indiji, a da u Mediteransko područje stiže relativno kasno. Prvi poznati zapisi o njegovom uzgoju potječu iz antičke literature (Küster 1988). Već tada se uzgaja kao povrće, a ta tradicija nastavlja se na području Europe do današnjih dana.

Nekada su se u prehrani koristile i sjemenke dinje i krastavca. One su također imale primjenu i u liječenju bolesti želuca, crijeva i mokraćnog mjehura (Kušan 1956).

Daucus carota (mrkva)

Budući da se na temelju makrofosilnih merikarpa ne može točno odrediti uža shvaćena vrsta, podjednaka je vjerojatnost da je riječ o kultiviranoj, odnosno pitomoj mrkvi (*D. sativus*), ili o jednoj od šest samoniklih primorskih vrsta (*Daucus carota*, *D. major*, *D. maximus*, *D. hispidus*, *D. hispanicus*, *D. dentatus*) koje navode Pavletić i Škalamera (1983) i Pavletić (1988). Pitoma mrkva uzgaja se zbog zadebljalog korijena koji se nekad koristio i u narodnoj medicini, ali uglavnom u kulinarstvu, što je i danas njena najčešća upotreba (Kušan 1956). Mladi listovi, korijen i plodovi najčešće su se, zbog aromatičnih svojstava, koristili kao začini. Listovi i korijen koristili su se i kao povrće i ljekovita biljka (Grlić 1986).

***Panicum miliaceum* (proso)**

Proso pripada skupini najotpornijih žitarica, podnosi velike vrhine, siromašno tlo i sušna razdoblja. Životni ciklus završava u vrlo kratkom vremenu (60-90 dana) pa je pogodan i za područja s kratkim kišnim razdobljima. *Panicum miliaceum* je prava žitarica klasi nih vremena (Rimljani su je nazivali „miliun“, a Hebreji „dokhan“), dok se danas uzgaja uglavnom u istočnoj i središnjoj Aziji, Indiji i na Srednjem Istoku. Oljuštena zrna se kuhaju i pripremaju poput riže ili se od njih pravi kaša. Plodovi se također koriste kao hrana za ptice (Zohary i Hopf 1988).

Podaci sakupljeni proučavanjem živih biljaka i arheoloških ostataka pokazuju da je proso relativno stara kultura. Pretpostavlja se da bi *P. miliaceum* mogao biti centralno-azijski element koji je unesen u blisko-istočno područje i dodan pšenici i ječmu. Ne isključuje se mogućnost da vrsta *P. miliaceum* predstavlja neovisan pokušaj kultiviranja, započeo u središnjoj Aziji (Zohary i Hopf 1988).

***Physalis alkekengi* (mjehurica)**

Danas uzgajana i kao ukrasna biljka zbog dekorativnih plodova, pretpostavlja se da je šumska mjehurica imala ulogu u prehrani od davnih vremena. Sočne i ukusne bobice slatkastog okusa, a ujedno i kiselkasto gorke. Njihova najveća vrijednost je u velikoj količini vitamina C, čak dvostruko od one koju sadrži limun. Bobice se mogu jesti sirove, ali treba paziti da ne dođu u dodir s mjehurastim ovojem, koji je otrovan, a sadrži gorki glikozid fizalin. Bobama su od davnina mnogi narodi pripisivali i ljekovito djelovanje (Grlić 1986).

Raphanus sativus (rotkva)

Najstariji pisani zapis o ovoj vrsti nađen je u Dioskoridovom medicinskom Codex-u iz 60. godine posl. Kr. Prema Dioskriodu, rotkva se uzgaja u Egiptu, Italiji i Grčkoj (Körber-Grohne 1987). Neki ne sasvim pouzdani makrofosilni dokazi (tzv. cf. – nalazi) daju za pretpostaviti da je rotkva tijekom rimskog perioda kultivirana u Nizozemskoj (Kroll 1999) i Njemačkoj (Schultze-Motel 1993).

Rotkva se uzgaja prvenstveno zbog jestivog odebljalog hipokotila, ali se upotrebljava i u tradicionalnoj medicini, u liječenju kašlja i plućnih bolesti (Kušan 1956). Putove transporta sjemena vrste *Raphanus sativus* nije moguće odrediti, ali oni su ili transportirani u luku grada *Aenona* da bi bili kultivirani u poljima, ili je rotkva već bila kultivirana u tom području pa je sakupljeno sjeme prevoženo na druga odredišta (Glušević i sur. 2006).

3.3.2. Kultivirane i korisne drvenaste biljke

Drvenaste kultivirane biljke zauzimale su i još i danas zauzimaju važno mjesto u poljoprivredi mediteranskih zemalja. Grožice, smokve, maslinovo ulje i vino najvažniji su poljoprivredni proizvodi Bliskog istoka i Sredozemlja.

Prvi sigurni dokazi o kultiviranju drvenastih plodonosnih biljaka na Bliskom Istoku sežu u 4. tisu lje e pr. Kr., tj. nekoliko tisu lje a nakon što se udoma io uzgoj žitarica. Žitarice i mahunarke su jednogodišnje kulture iji se plodovi ubiru nekoliko mjeseci nakon sjetve. To su kulture za „kratkoro no ulaganje“ koje omogu uju uzgajiva ima prakticiranje tzv. pokretnog ratarstva, odnosno selidbu iz jednog mjesta u drugo. Nasuprot tome, drvenaste kulture su trajnice koje po inju donositi plodove i do osam godina nakon sa enja, a punu produktivnost dosežu nekoliko godina kasnije. Zbog toga su uzgajiva i drvenastih kultura manje pokretni, pa ne udi da se prvi nalazi kultiviranja drvenastih biljaka podudaraju s nalazima prvih povijesnih naselja (Zohary i Hopf 1988).

Biljni ostatci na eni tijekom arheoloških iskapanja ukazuju na injenicu da su maslina (*Olea europaea*), vinova loza (*Vitis vinifera*), smokva (*Ficus carica*), datulja (*Phoenix dactylifera*), morganj (*Punica granatum*) i egipatska smokva (*Ficus sycomorus*) prve drvenaste kultivirane biljke Starog Svijeta. Neke druge drvenaste kulture, poput jabuke (*Malus domestica*), kruške (*Pyrus communis*), šljive (*Prunus domestica*) i trešnje (*Prunus avium*), po ele su se uzgajati puno kasnije. Sigurna potvrda njihovog uzgoja seže u 1. tisu lje e pr. Kr., a ve i zna aj javlja se u gr ko i rimsko doba. Pretpostavlja se da je razlog kasnog pojavljivanja navedenih kultura nemogu nost jednostavnog vegetativnog razmnožavanja. Naime njihov uzgoj temelji se gotovo isklju ivo na cijepljenju, metodi kojoj su bili vješti tek Grci i Rimljani (Zohary i Hopf 1988).

Castanea sativa (pitomi kesten)

Pitomi kesten značajna je drvenasta kultura vlažnih područja Sredozemlja. Plod kestena imao je važnu ulogu u prehrani tradicionalnih ratarskih zajednica, a često je korišten i kao hrana za životinje (Zohary i Hopf 1988). Kesten kao hrana ima visoku energetske vrijednost. Za razliku od plodova oraha, lijeske i bukve, kojima je glavna sastojina masno ulje, glavni sastavni dio kestena je škrob, kojeg u sirovoj sjemenci ima 44 %. Plodovi kestena mogu se jesti kuhani ili pečeni, a od njih se mogu pripremati i juhe, pire, različiti slatkiši i dodaci jelima (Grli 1986).

Rod *Castanea* broji 10-12 vrsta koje su rasprostranjene područjima sjeverne hemisfere. Kultivirani pitomi kesten blisko je srodan s varijabilnim agregatom divljih formi koje se javljaju u sjevernom dijelu Mediterana, sjevernoj Turskoj i na Kavkazu. Ove forme prodrle su i duboko u klimatski blaža područja središnje i zapadne Europe. Zbog bliske srodnosti s kultiviranim oblicima, botanici divlje forme također uključuju unutar vrste *C. sativa*. Podatci o podrijetlu i vremenu udomaćivanja pitomog kestena još uvijek su nedostatni. Palinološki podatci pokazuju da vrsta *C. sativa* nije stigla u zapadnu Tursku, Grčku i zapadno-mediteranske zemlje samostalno, kao divlji element, već da je unesena djelovanjem čovjeka. Također je poznato da spontano rašireni kesten u Italiji, južnoj Francuskoj, Španjolskoj i susjednim područjima zapadne i srednje Europe, ne predstavlja populacije divljih formi već neutralizirane elemente kultiviranih oblika koje je uništio čovjek. Zato se pretpostavlja da su sjeverna Turska i Kavkaz područja gdje se pitomi kesten počeo kultivirati (Zohary i Hopf 1988).

Corylus avellana (lijeska)

Oblika razgranatog grma ili malog drveta, *C. avellana* uobičajena je komponenta hrastovih ili bukovih šuma umjerene Europe, Kavkaza, sjeverne Turske i kaspijskog područja Irana. Ukusni plodovi lako se sakupljaju pa su ostatci ljuske plodova nađeni na brojnim arheološkim lokalitetima diljem Europe iz neolitskog, bronanog, gčkog, rimskog i srednjovjekovnog doba (Zohary i Hopf 1988). Plodovi su vrlo hranjivi, sadrže preko 60 % masnog ulja, 15 % bjelanjaka i 10 % ugljikohidrata, a bogati su i željezom. Jedu se sirovi, a koriste se i za izradu slatkiša (Grlić 1986). Lijeska je udomaćena i uzgajana i zbog grana koje su se koristile za izradu ograda ili štapova za hodanje. Kada i gdje je započeo uzgoj lijeske još nije sasvim jasno, a najstarija potvrda o njenom uzgoju potječe iz rimskog doba (Zohary i Hopf 1988). *Corylus avellana* nije karakteristična vrsta mediteranskog područja. Moguće je da je lješnjak uzgajan u područjima grada *Aenona*, skupa s ostalim kultivarima, ali ne smije se zanemariti niti mogućnost uvoza iz drugih područja. Također je moguće da su se lješnjaci sakupljali u divljini hladnije unutrašnjosti i izvozili u druga odredišta upravo iz antičke luke *Aenona* (Glušević i sur. 2006).

Cordia myxa (asirijska šljiva)

Cordia myxa je vrlo zanimljiv i rijedak nalaz arheoloških lokaliteta ovog područja. Porijeklom iz istočne Azije, ova biljka danas je rasprostranjena širokim područjem od istočnog Mediterana do istočne Indije, ali također i tropskim dijelom Afrike, Azije i Australije. Nedavno je unesena i u Ameriku (http://database.prota.org/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll?AC=QBE_QUERY&BU=http://database.prota.org/search.htm&TN=PROTAB~1&QB0=AND&QF0=Species+Code&QI0=Cordia+myxa&RF=Webdisplay).

Prema dostupnim izvorima, nalazi iz arheoloških slojeva poznati su uglavnom iz Egipta (<http://www.archaeobotany.de/database.html>), dok za ovaj dio Sredozemlja ne postoje nalazi.

Plod ove vrste od davnina je poznat po svojoj ljepljivoj sluzavoj pulpi, koja je korištena kao lijek protiv kašlja i bolova u prsima. Zreli plodovi jedu se sirovi, dok se mladi plodovi sakupljaju i jedu svježi ili se kisele poput povrća (<http://www.haryana-online.com/flora/lasura.htm>).

Ficus carica (smokva)

F. carica je klasična drvenasta kultura koja se, zajedno s maslinama i vinovom lozom, povezuje s početkom hortikulture na području Mediterana. Pretpostavlja se da su smokve imale važno mjesto u proizvodnji hrane još u bronano doba osiguravajući i svježe plodove ljeti i suhe smokve bogate šećerom koje su se lako pohranjivale, tijekom ostatka godine. Smokva je brzorastuća kultura koja plodove počinje donositi tri do četiri godine nakon sadnje (Zohary i Hopf 1988).

Rano kultiviranje smokve započelo je u tipičnom mediteranskom okolišu, zajedno s maslinama i vinovom lozom. Kod divlje smokve prisutan je vrlo karakterističan način oprašivanja, odnosno oblik simbioze između smokvinog ploda i osice roda *Blastophaga*. Kod pitome smokve plod se razvija i u slučaju da nije došlo do oprašivanja istom osicom, ali ukoliko do oprašivanja dođe, plod je slađi. Zbog toga se koristi tzv. postupak „kaprifikacije“, koji je naziv dobio po starom nazivu za divlju smokvu – *Caprificus*. Uz pitome smokve vežu se grane s proljetnim cvatovima divlje smokve, koji u sebi sadrže ose koje nose polen i oprašuju cvjetove pitome smokve. Kaprifikacija je vrlo star proces kojeg su poznavali već i stari Rimljani i Grci. Kultivirane forme smokve pokazuju različite morfološke osobine, vrlo

sli ne zahtjeve glede klimatskih uvjeta i usku geneti ku povezanost s divljom smokvom koja je široko rasprostranjena Sredozemlju. Prema Zohary i Hopf (1988), ove samonikle smokve su divlji preci kultiviranih formi i uklju ene su unutar vrste *F. carica*. Podatci dobiveni iz arheoloških istraživanja i prou avanja živih biljaka dopuštaju zaklju ak da su najraniji po etci kultiviranja smokve prakticirani u isto nom Sredozemlju. Divlje forme vrste *F. carica* koje se nalaze na Bliskom Istoku, u južnoj Turskoj i egejskom podru ju mogle bi biti divlji preci iz kojih su uzgojene doma e forme smokve.

Osim u prehrani, plodovi smokve korišteni su i kao sredstvo protiv plu nih bolesti i upale grla, te antiseptik. So no meso ploda ublažava bolove i opekline. Mlije ni lateks iz liš a i grana dugo se koristio u lije enju bradavica na koži i uboda insekta, iako je zapravo otrovan i na suncu može izazvati alergijsku reakciju (Kušan 1956).

Juglans regia (orah)

Orah je tradicionalna kultura Starog Svijeta, koja se uzgaja od davnina zbog svojih plodova i drva. Sjemenke su vrlo hranjive, sadrže 55-65 % masnog ulja, oko 15 % bjelan evina, približno isto toliko ugljikohidrata i visok udio vitamina grupe B. Naj eš e se jedu sirove, ali koriste se i za prire ivanje peciva, tjestenina i kola a. Orahovo liš e, bogato treslovinama i manjim koli inama eteri nog i masnog ulja, koristi se u narodnoj medicini (Grli 1986).

Juglans regia raste u listopadnim šumama umjerenog podru ja južnih dijelova Balkana, sjeverne Turske, južnog kaspiskog podru ja, Kavkaza i srednje Azije. Divlje forme daju male plodove relativno debele ljuske, a okusa kao i plodovi kultiviranih oblika. Kultivirani oblici danas rastu u podru jima prirodne rasprostranjenosti *J. regia* kao i u srednjoj i zapadnoj Europi te toplijim podru jima Mediterana i zapadne Azije. Orah najbolje

uspijeva u umjerenim predjelima pa njegov uzgoj u toplijim područjima obično podrazumijeva povremeno navodnjavanje tijekom ljeta. Podatci o vremenu i mjestu po etka kultiviranja oraha još uvijek su oskudni, iako se prema palinološkim podacima može pretpostaviti da je orah mogao biti udomaćen na području sjeveroistočne Turske, Kavkaza i Sjevernog Irana (Zohary i Hopf 1988).

Myrtus communis (mirta)

Porijeklom s Istoka, mirta je u antičkih naroda bila sveta i osobito cijenjena biljka, kao i lovor. Često se i kultivirala, a samonikla raste samo po toplim i sunanim obalnim područjima. Mirtine bobice imaju ugodan, slatkast, aromatičan i smolast okus, a sadrže pored eteričnog ulja još i limunsku i jabučnu kiselinu, šećer, smole i treslovine. Mogu se jesti svježe, kao što su to radili stari Grci, ili se sušiti i koristiti kao začina, kako su to radili stari Rimljani. U nekim dijelovima Dalmacije jednu se plodovi mirte konzervirani u soli, a za vrijeme rata su ih sušili i mljeli u brašno. Od fermentiranih bobica proizvodi se alkoholno piće, a u nekim mediteranskim zemljama iz mirte se proizvodi eterično ulje koje ima primjenu u narodnoj medicini (Grlić 1986).

Olea europaea (maslina)

Maslina je najistaknutija i ekonomski vjerojatno najvažnija klasa drvenaste kultura Sredozemlja. Još od brončanog doba velik broj ljudi mediteranskog područja bavio se proizvodnjom maslinovog ulja koje je bilo prikladno za pohranjivanje isto kao i jestivi plodovi. Maslinovo ulje koristilo se za jelo i kuhanje, ali i za pomast i svjetiljke. Plodovi su se konzervirali i jeli (Zohary i Hopf 1988).

Kruh i masline nekad su, a i danas, davale glavno obilježje mediteranskoj prehrani. Masline rastu samo u tipično mediteranskim klimatskim uvjetima. Pripadaju u skupinu sporo rastu ih drvenastih kultura i počinju davati plodove pet do sedam godina nakon sadnje.

Kultivirana maslina (*Olea europaea*) pokazuje blisku povezanost s divljom maslinom (*O. sylvestris*) koja je sastavni dio makije sredozemnog područja. Divlja maslina može se bez problema križati s kultiviranim sortama i davati plodne hibride. Plodovi divlje masline imaju manji soćni mezokarp i sadrže manje ulja, a koštice su nešto manje od koštica kultivara. Uzimajući u obzir dostupne podatke, pretpostavlja se da je uzgoj masline započeo na području Bliskog Istoka (Zohary i Hopf 1988).

Pinus pinea (pinija)

Pinija je veoma dekorativno mediteransko drvo, koje se u sredozemnom području uzgaja već tisućlje ima zbog svojim krupnih sjemenki. Budući da je danas, zahvaljujući dugotrajnom uzgoju, široko rasprostranjena sredozemnim područjem, teško je sa sigurnošću utvrditi njeno podrijetlo. Što se tiče jadranske obale, pretpostavlja se da je pinija autohtona jedino na istočnom dijelu Mljetu (Šilić 1983).

Okus sjemenki je ugodan s blagim smolastim mirisom, koji se na povišenoj temperaturi gubi. Sjemenke se mogu jesti sirove, ili se upotrebljavaju kao dodatak jelima od mesa, osobito od divljači, a i različitim slatkišima. Služe i za dobivanje ulja, koje osim za jelo, ima primjenu i u narodnoj medicini (Grlić 1986).

Prunus amygdalus (badem)

Badem je jedna od najraširenijih drvenastih kultiviranih biljaka sredozemnog područja, a vjerojatno i jedan od najranijih primjera udoma ivanja plodonosnog drveta u poljoprivredi Starog Svijeta. Najbolje uspijeva u područjima sa relativno toplom mediteranskom klimom. U odnosu na masline i vinovu lozu, badem je otporniji na suhe uvjete.

Kultivirani badem pokazuje veliku morfološku sličnost sa varijabilnim agregatom divljih badema koji su rasprostranjeni u jugo-zapadnoj i središnjoj Aziji. Divlji badem ima manji plod, tvr u plodnu ljusku s manje udubina i intenzivno goroku sjemenku. Gorina predstavlja obrambeni mehanizam, a posljedica je glikozida amigdalina, koji se nakon oštećenja ploda pretvara u smrtonosnu cijanovodničku kiselinu.

Raniji arheološki dokazi još uvijek su oskudni i ne omogućuju jasno razdvajanje divljih i kultiviranih formi. Ipak, izgledno je da badem pripada skupini najranije kultiviranih plodonosnih drvenastih biljaka u Starom Svijetu. Najvjerojatnije njegov uzgoj započeo je na području istočnog Sredozemlja otprilike u isto vrijeme kada i uzgoj maslina i vinove loze (Zohary i Hopf 1988).

Prunus avium (trešnja)

Trešnja je karakteristična kultura hladnijih i umjerenih područja Starog Svijeta. Drvo trešnje visoko je do 20 metara, a plodovi su slatki, okrugli i crno-crvene boje. Kultivari trešnje blisko su srodni s grupom divljih formi široko rasprostranjenih umjerenim područjima Europe, sjeverne Turske, Kavkaza i Transkavkazije. Zreli plod divlje trešnje je manji od ploda

kultivara i više gorkog okusa (Zohary i Hopf 1988). Plodovi se koriste za jelo, a od njih se pravi i sok, kompot ili sirup (Grli 1986).

Plodovi trešnje sakupljani su u divljini davno prije nego što je trešnja kultivirana. Najraniji zapis o kultiviranju trešnje potječe iz rimskog doba (Zohary i Hopf 1988).

Prunus cerasus (višnja)

Drvo višnje manje je od trešnjinog, najviše do 8 metara visine, sa svjetlije crvenim plodovima karakterističnog kiselkastog okusa. *Prunus cerasus* je tetraploid koji se spontano javlja u Turskoj, zemljama Balkana i zapadnoj i središnjoj Europi. Kao i plodovi trešnje, plodovi su sakupljani u divljini davno prije nego što je višnja kultivirana, a koriste se većinom za jelo (Zohary i Hopf 1988).

Plodovne stapke trešnje i višnje koristile su se za pripremanje čaja koji je imao diuretička svojstva i djelovao je kao sredstvo za iskašljavanje. Smola, koja curi iz ozlijeđenog stabla, koristila se kao lijepilo, ali i u liječenju kašlja, kožnih alergija, te crijevnih nametnika (Kušan 1956.).

Prunus domestica ssp. domestica (šljiva)

Uz jabuke i kruške, šljiva također ima vodeću ulogu u proizvodnji voća hladnih i umjerenih područja. Plodovi šljive mogu se jesti svježi, kuhani ili sušeni. Tradicionalna šljiva Starog Svijeta bila je *Prunus domestica*, grupa koja obuhvaća više heksaploidnih kultivara, među kojima je i *P. domestica ssp. domestica*. Diploidni oblici, poput *P. salicina* kultiviraju se u istočnoj Aziji (Zohary i Hopf 1988).

Divlji oblici *P. domestica*, s malim plodovima, uobičajeni su u umjerenim područjima Europe i Turske. Arheološki nalazi upućuju na činjenicu da je voće sakupljano u divljini, a o poštima uzgoja šljive postoji vrlo malo podataka. Najraniji zapis o uzgoju i cijepljenju šljive potječe iz rimskih vremena (Zohary i Hopf 1988).

Prunus persica (breskva)

Breskva se kao hortikulturni element javlja u antičko doba. Njene karakteristične velike koštice iskopane su na nekoliko arheoloških lokacija u Sredozemlju. Breskva nije autohtona u mediteranskom području već je proširena na Bliski Istok i u Europu u grčko i rimsko doba. Divlje forme poznate su iz planinskog područja Tibeta i zapadne Kine, a postoje zapisi koji upućuju na kultiviranje breskve u Kini koje seže u 2. tisućlje pr. Kr. Prema zapisima breskva je u Grčku unesena oko 300. godine pr. Kr. iz Perzije, a Rimljani su je počeli kultivirati tek u I. st. posl. Kr. Ubrzo nakon toga breskva postaje važnom kulturom mediteranskog područja (Zohary i Hopf 1988).

Rubus fruticosus (crna kupina)

Crna kupina karakteristična je za Europu i zapadnu Aziju. Prema Zohary i Hopf (1988) nema dokaza o kultiviranju roda *Rubus* prije Srednjeg vijeka. Raste u šumama, na rubovima šuma, u grmlju, uz rubove cesta, po živicama i dr. *R. fruticosus* zapravo je zbirno ime, a obuhvaća mnoge botanički srodne vrste rodu *Rubus* s crnim plodovima. U ovim uzorcima vjerojatno je riječ o vrsti *Rubus ulmifolis* var. *heteromorphus* (syn. *R. dalmaticus*), koja je danas najraširenija vrsta u obalnim područjima Hrvatske (Grlić 1986).

Svježi plodovi crne kupine su so ni i imaju ugodan, kiselkasto-slatki okus. Suprotno raširenom vjerovanju, nisu osobito bogate vitaminima, ali sadrže dosta kalija, željeza i magnezija. Jedu se svježe, ali od njih se može pripravlјati i sok, sirup, kompot i sli no. Osim plodova, koristi se i liš e, koje sadrži veliku koli inu vitamina C. Antiskorbuti no djelovanje liš a poznato je od davnih vremena (Grli 1986).

Sambucus nigra (crna bazga)

Crna bazga je listopadni grm ili malo drvo, široko rasprostranjeno umjerenim podru jima Europe. Korištenje cvjetova i plodova crne bazge ima dugu tradiciju u Europi, tako da su njene koštice na ene na velikom broju arheoloških nalazišta. To pokazuje da su crna bazga, crna kupina i šumska jagoda najintenzivnije sakupljane vrste u staroj Europi (Zohary i Hopf 1988). Cvjetovi bazge naj eš e se koriste za pripremanje aja i sirupa, a plodovi nisu jestivi svježi, ve se prera uju u pekmeze, kompote i napitke (Grli 1986).

Vitis vinifera (vinska loza)

Vinova loza jedna je od klasi nih kultura Starog Svijeta. Još od bron anog doba vinova loza zauzima vrlo važno mjesto u proizvodnji hrane ovog podru ja, osiguravaju i svježe plodove bogate še erom, suhe grož ice koje se lako pohranjuju i mošt za dobivanje vina. Kasnije je postala važan trgova ki proizvod na podru ju cijelog Sredozemlja. Iako preferira mediteransku klimu, podnosi i hladnije i vlažnije uvjete, što je omogu ilo uspješno širenje i razvoj vinogradarstva izvan Sredozemlja, odnosno na podru ju srednje Europe i zapadne Azije. Kultivari vinove loze blisko su srodni s agregatom divljih formi raširenih Europom i zapadnom Azijom (Zohary i Hopf 1988).

Prije su botanici ovi grupu divljih oblika svrstavali pod zasebnu vrstu *V. sylvestris*, no danas većina botanika smatra da je to zapravo divlji oblik kultivirane vinove loze iz kojeg su uzgojeni današnji kultivari i svrstavaju ga u *Vitis vinifera* kompleks. Pretpostavlja se da je Bliski Istok područje na kojem se počela kultivirati vinova loza (Zohary i Hopf 1988).

Osim za jelo i piće, vinova loza koristila se i u medicinske svrhe. Njeni listovi, i to prije svega oni crveno obojeni, primjenjivali su se u obliku čajeva za liječenje proljeva, jakog menstrualnog krvarenja i želuca u usnoj šupljini (Kušan 1956).

3.3.3. Korovi i ruderalne biljke

Korovi i ruderalne biljke iji su makrofosilni ostatci na eni u uzorcima sakupljenima u anti koj luci u Zatonu, objedinjeni su i klasificirani prema karakteristi nim vrstama biljne sociologije temeljene na Braun-Blanquetovoj školi. Uzevši u obzir da fitocenološka istraživanja, osim kvalitativnog, uklju uju i kvantitativno vrednovanje vrsta, vrlo je teško na temelju makrofosilnih ostataka rekonstruirati biljne zajednice. Detaljna fitocenološka rekonstrukcija onemogu ena je i injenicom da makrofosilni materijal predstavlja tanatocenozu, odnosno materijal razli itog podrijetla. Stoga su u pomo literature (Horvat 1962, Horvati 1963, Šegulja i Topi 2000), na temelju karakteristi nih vrsta prepoznati širi sintaksoni – sveza *Secalinion mediterraneum* Br.-Bl. Tx. 1937. i red *Chenopodietalia* Br.-Bl. (1931) 1936. (Horvati 1963).

Sveza *Secalinion mediterraneum*, reda *Secalinetalia* Br.-Bl. 1952., razreda *Secalinetea* Br.-Bl. 1952. obuhva a korovne zajednice žitnih polja (strništa) primorja i otoka. Vrste, na ene u zatonskim uzorcima koje karakteriziraju ovu svezu su: *Agrostemma githago*, *Ajuga chamaepitys* i *Anthemis arvensis*.

Red *Chenopodietalia*, razreda *Chenopodietea* Br.-Bl 1952. obuhva a nitrofilne biljne zajednice korova na okopavinama (vinogradi, vrtovi) i ruderalne vegetacije na smetištima, ruševinama, torovima, rubovima putova, zapuštenim mjestima uz naselja i na sli nim površinama, koje obiluju organskim otpacima odnosno dušikovim spojevima. Vrste, na ene u zatonskim uzorcima koje se karakteristi no javljaju u zajednicama ovog reda su: *Anagallis arvensis*, *Atriplex patula*, *Chenopodium album*, *Cichorium intybus*, *Euphorbia helioscopia*, *Fumaria officinalis*, *Glaucium corniculatum*, *Medicago arabica*, *Polygonum aviculare*, *P. persicaria*, *Ranunculus repens* i *Rumex pulcher*, *Sambucus ebulus*, *Urtica urens* i *Verbena officinalis*.

Iako dolaze u različitim korovnim i ruderalnim zajednicama, mnoge od ovih biljaka imale su i ljekovita svojstva i koristile su se u medicini. Tako se za žutu ivicu (*Ajuga chamaepitys*) vjerovalo da lije i giht i reumatizam, te da ima diuretska i stimulatívna djelovanja (Kušan 1956).

Kultivirana/korovna biljka *Camelina sativa* uzgajala se zbog ulja, koje je bilo loše kvalitete, ali koristilo se za lampe (Bouby 1998).

Pjegava kukuta (*Conium maculatum*) sadrži vrlo otrovan spoj koniin koji djeluje na živani sustav i izaziva smrt paralizom mišića za disanje. Kukuta se u antičko doba koristila za smrtno kažnjavanje zločinaca, a vjeruje se da je i Sokrat umro otrovan sokom kukute. Iako vrlo otrovna, koristi se i u medicini, u malim dozama djeluje kao narkotik i analgetik (Kušan 1956).

Ljekovita dimnjača (*Fumaria officinalis*) sadrži spoj fumarin koji djeluje kao stimulator srca i živčanog sustava, pa se koristila kao antiseptik, laksativ i diuretik, te u liječenju kožnih lišajeva. U većim količinama, fumarin je otrovan (Kušan 1956).

Ptičji dvornik (*Polygonum aviculare*) upotrebljavao se kao univerzalni lijek, za liječenje dišnih organa, bubrega, probavnog trakta, raznih krvarenja i dr. (Kušan 1956).

Mala kopriiva (*Urtica urens*) koristila se za jelo, ali i kao antiseptik i diuretik, te u liječenju groznice, artritisa, anemije, probavnih smetnji i dr. (Kušan 1956).

Ljekoviti sporiš (*Verbena officinalis*) jedna je od vrlo cijenjenih biljaka antičkog doba. Vjerovalo se da, ako se biljka skuplja osobno na početku Siriusa i u vrijeme kad se vide i Sunce i Mjesec, da tada tjera groznicu, pozitivno djeluje na sklapanje prijateljstva i liječi sve moguće bolesti. Ljekoviti sporiš primjenjivao se u liječenju glavobolja, migrena, opće slabosti i kašlja (Kušan 1956).

3.3.4. Biljke vodenih i vlažnih staništa

Kao što navodi Ilakovac (1995/95a), u neposrednoj blizini antičke luke *Aenona* nalazi se prirodni izvor pitke vode – snažno vrelo Boljkovac, a vodovodom je tekuća voda u rimsko doba dovedena do samog grada *Aenona*. Korištena je i pitka voda iz obližnje *Rijetine*, osim za velikih kiša, kada je rijeka bila zamuljena.

Stoga ne iznenađujuće nalaz vodenih biljaka u uzorcima iz antičke luke u Zatonu kraj Nina (*Aenona*). Vrste *Typha angustifolia* i *Typha latifolia* karakteristične su za razred *Phragmitetea* Tx. et Preising 1942. koji podrazumijeva močvarne biljne zajednice trstika i visokih šaševa, razvijene uz rubove stajaćih i tekućih voda na kontinentalnom području sjeverne hemisfere (Horvatić 1963). U Hrvatskoj je taj razred zastupljen jedinim redom *Phragmitetalia* W. Koch 1926.

Vrsta *Myosoton aquaticum*, nalazna također u istraživanim arheološkim slojevima, javlja se na vrlo važnim staništima.

3.3.5. Elementi (polu) prirodne vegetacije

U ovu skupinu uključene su vrste koje pripadaju sredozemnoj vazdazelenoj vegetaciji i vrste koje se javljaju u livadnim zajednicama.

U uzorcima iz antičke luke u Zatonu našeno je nekoliko vrsta koje su karakteristične za sredozemnu vazdazelenu vegetaciju.

Vrste *Quercus ilex* i *Myrtus communis* karakteristične su za eumediteranske vazdazelene šume i njihov degradacijski stupanj makiju, koje pripadaju svezi *Quercion ilicis* Br.-Bl. (1931) 1036. (Horvati 1963).

Vrstu *Juniperus phoenicea* L., također našenu u uzorcima navedenog lokaliteta, Horvati (1963) navodi kao karakterističnu vrstu sveze *Cisto-Ericion* H-i (1958). To je zajednica grmolikih gariga, nastala snažnom degradacijom šume hrasta crnike i makije, odnosno sveze *Quercion ilicis*.

Pod utjecajem ekstremne degradacije nastale su iz vazdazelenih šuma i šikara zajednice suhih travnjaka i kamenjarskih pašnjaka koje pripadaju redu *Cymbopogo-Brachypodietalia* H-i (1956) (1958). Vrsta *Daucus carota* karakteristična je vrsta ovog reda, a često se pojavljuje i *Silene vulgaris*.

Razred *Molinio-Arrhenatheretea* obuhvaća biljne zajednice livada i pašnjaka visokog nivoa podzemne vode. Danas, a vjerojatno i u antička vremena, te livade koristile su se kao košarice i pašnjaci, pa su djelomično izložene zahvatima ovjeka, poput gnojenja. Tom razredu pripadaju vrste *Ranunculus arcis*, *Rumex acetosa* i *Prunella vulgaris*.

4. RASPRAVA

Arheobotani kom analizom biljnih makrofosila iz uzoraka sakupljenih uz rt Kremenja a u naselju Zaton kraj Nina, dobiveni su rezultati koji su poslužili rekonstrukciji paleookoliša anti ke luke u Zatonu, trgovine i prehrane rimskih moreplovaca u vremenu od I. do III. st. posl. Kr.

Analizirana su ukupno 52 uzorka sakupljena u sedimentu na dubini dva do etiri metra ispod morske razine, u razdoblju od 2005. do 2007. godine. Izolirano je sveukupno 2575 makrofosila, u obliku cijelih i fragmentiranih sjemenki, plodova i drugih biljnih ostataka, poput gran ica, trnova i listova. Od toga je determinirano 2403 makrofosila, dok 172 nije bilo mogu e determinirati. Tim rezultatima pridodani su rezultati istraživanja provedenih u razdoblju od 2002. do 2003. godine, od strane doc. dr. sc. Renate Šoštari pa je ukupan broj analiziranih makrofosila (kroz svih 5 godina istraživanja) 3561. Od tog ukupnog broja 62 taksona (3169 biljnih ostataka) determinirana su do razine vrste, 20 taksona (65 biljnih ostataka) do razine roda, 3 taksona (72 biljna ostatka) do razine porodice, 1 takson (7 biljnih ostataka) do razine reda i 31 takson (46 biljnih ostataka) koji je približno determiniran (cf.-takson) (prilog, tab. 6, 7, 8 i 9).

Uzorak najbogatiji razli itim taksonima je uzorak 6 iz 2007. godine (KV C1/3, SL 7), koji je sadržavao ak 21 razli it determinirani takson. Taj uzorak tako er je i najbogatiji brojem makrofosilnih ostataka, sadržavao je 171 determiniranih i 11 nedeterminiranih biljnih makrofosila (tab. 4 i 10), no valja uzeti u obzir da uzorci nisu uzimani ravnomjerno iz svih slojeva.

Na neki biljni ostaci većinom su sačuvani u dobrom stanju što je omogućilo da ih se najviše u dijelom determinira do nivoa vrste. Usko shvaćene vrste ili podvrste nisu se mogle sa sigurnošću u odrediti na temelju makrofosilnih ostataka.

Najznačajniji makrofosilni ostaci predloženi su fotografijama uz kratak opis pojedine vrste. Vrste kojima je determinacija otežana zbog sličnosti s ostacima neke druge vrste, detaljnije su opisane i objašnjeni su na temelju sigurne determinacije i razlikovanja.

Popis determiniranih vrsta, dobiven objedinjavanjem rezultata analize uzoraka svih godina istraživanja (2002.-2007. godine), pokazuje da se radi uglavnom o tzv. tanatocenozi. S obzirom na različitost porijekla materijala, korišteni su različiti kriteriji za svrstavanje pojedinih vrsta u skupine. Kultivirane i korisne zeljaste i drvenaste biljke izdvojene su na temelju literaturnih podataka o njihovoj prije svega prehrambenoj vrijednosti. Na temelju ekoloških karakteristika i fitocenološke pripadnosti pojedinih vrsta formirane su preostale skupine: korovne i ruderalne biljke, biljke vodenih i vlažnih staništa i elementi (polu)prirodne vegetacije.

Potonuli brod, i/ili drugi brodovi koji su pristajali u ovu luku, nosili su keramiku, staklo i druge materijale, što indicira vezu luke sa svim regijama rimskog mediteranskog svijeta, posebno Grčkom i Bliskim Istokom, ali i Afrikom i sjevernom Italijom. Iz toga se može pretpostaviti da neki biljni materijal ima veze s tim odredištima, odnosno da predstavlja dio brodskog tereta, koji se transportirao izmeću različitih odredišta, ali vjerojatno i dio svakodnevne prehrane mornara. Nažalost, smjer transporta nemoguće je odrediti – ne zna se da li je riječ o uvozu ili izvozu.

Budući da se radi o luci, ne treba zanemariti ni mogućnost da dio nekog materijala pripada otpacima koji se bacani s brodova, a vrlo je vjerojatno i dio biljnog materijala autohtonog podrijetla i predstavlja djelić lokalne vegetacije.

U uzorcima je na en vrlo mali broj ostataka žitarica, svega nekoliko pljevica prosa (*Panicum miliaceum*) na eno je u tri uzorka (tab. 6, 7 i 9) iz razdoblja 2005.-2007. i nekoliko u ranijim uzorcima. Pšeno lako propada u arheološkim slojevima zatonskog tipa pa je mogu e da se veliki dio makrofosilnih ostataka pšena nije uspio sa uvati.

Raspored ostataka prosa kroz slojeve (na eno u razli itim slojevima: 3, 4, 5, 6 i 7), visoki postotak korova žitnih polja u uzorcima (razred *Secalinetea*), te injenica da je proso uobi ajena rimska žitarica toplih podru ja, dopušta pretpostavku da su stanovnici grada *Aenona* uzgajali proso, bez obzira na mali broj sa uvanih biljnih ostataka. Tako er, mogu e je da je proso uvoženo iz drugih dijelova Rimskog Carstva, a na dnu mora se našlo potapanjem brodova s teretom. I u ovom slu aju ne smiju se zanemariti uvjeti konzerviranja, koji kada je proso (i žitarice op enito) u pitanju, imaju veliku ulogu. Zna ajan je nalaz i jedne, do nivoa roda determinirane, baze pljevice pšenice (*Triticum sp.*).

Skromni su i nalazi ostalih kultiviranih i korisnih zeljastih biljaka u uzorcima iz anti ke luke *Aenona*. Vrste *Daucus carota* i *Raphanus sativus* zastupljene su samo s po jednim makrofosilom, *Anethum graveolens* i *Physalis alkekengi* s oko 5 makrofosila, dok su vrste *Coriandrum sativum* te *Cucumis melo* i *Cucumis sativus* zastupljeni s više – do 25 makrofosila.

Zanimljiv je nalaz kultivirane/korovne biljke *Camelina sativa*. Ta biljka uzgajala se zbog ulja, koje je bilo loše kvalitete, ali koristilo se za lampe (Bouby 1998). Mogu e je da su otkrivene sjemenke bile pomiješane s uljem uljanih lampi, ali s obzirom da je to i korovna biljka, ne treba zanemariti mogu nost slu ajnog transporta sa žitaricama.

Posebno je zanimljiv nalaz sjemenke rotkve (*Raphanus sativus*). Najstariji pisani podaci i crtež ove vrste potje u iz Dioskoridesovog Codex-a (60. g. posl. Kr.). Rotkva je bila uzgajana u Egiptu, Italiji i Gr koj (Körber-Grohne 1987). Pretpostavlja se da je u rimsko doba

bila uzgajana u Nizozemskoj (Kroll 1999) i u rimskoj Germaniji (Schulze-Motel 1993), za što postoji dvojbeni materijalni nalaz (cf. determinacija). Sigurni podatak o prisutnosti rotkve u Srednjoj Europi potječe iz IX. stoljeća. Nalaz iz Zatona je dosad najstariji materijalni nalaz rotkve u Europi (datiran u II. stoljeće i posl. Kr.) i potvrda da se rotkva u rimskom razdoblju doista uzgajala u Europi, te da je imala mjesto u tadašnjoj trgovini.

Polenska analiza profila iz Boknja kog blata, u zadarskom zaleđu (Grüger 1996) pokazala je da su Rimljani u ovo područje donijeli intenzivno poljodjelstvo, pogotovo uzgoj maslina (*Olea europaea*) i vinove loze (*Vitis vinifera*). Rimljani su u ovo područje unijeli i orahe (*Juglans regia*) i pitomi kesten (*Castanea sativa*). I prije dolaska Rimljana, antropogeni utjecaj na prirodnu vegetaciju bio je značajan, ali većinom u obliku ispaše. Polenska krivulja masline i vinove loze seže u razdoblje i prije dolaska Rimljana, ali u manjoj mjeri, pa je vrlo vjerojatno da su se na tene kulture uzgajale u zaleđu u tadašnjeg grada *Aenona* i transportirale trgovačkim putovima dalje. To je posebno vrlo vjerojatno za kulturu maslina, jer je poznato da je maslinovo ulje s isto nojadranske obale imalo specifičan, oštar okus, pa se dodavalo talijanskom ulju da ga učini pikantnijim (Slapšak 1989). U uzorcima su također nađeni ostatci i ostalih navedenih kultura – vinove loze, orahe i pitomog kestena.

Najvažnije mjesto u poljoprivredi istraživanog područja imale su maslina, vinova loza i smokva (*Ficus carica*), čiji su makrofosilni ostatci nađeni u velikom broju u gotovo svakom uzorku. To ne iznenađuje budući da su to i najvažnije kulture mediteranskog područja općenito (Zohary i Hopf 1988).

Pri vrednovanju plodova smokve, treba uzeti u obzir da jedan skupni plod smokve može sadržavati i nekoliko stotina orašica i nađeni u uzorcima. Budući da se smokva javlja u gotovo svim uzorcima, može se slobodno zaključiti da je smokva bila vrlo važan poljoprivredni proizvod ovog područja.

Jedan od zanimljivijih nalaza je svakako vrsta *Cordia myxa* (asirijska šljiva). Vrlo rijedak nalaz arheoloških lokaliteta ovog područja, porijeklom iz istočne Azije, ova biljka danas je rasprostranjena širokim područjem od istočnog Mediterana do istočne Indije, ali također i tropskim dijelom Afrike, Azije i Australije. Nedavno je unesena i u Ameriku (<http://www.haryana-online.com/flora/lasura.htm>). S obzirom da je riječ o vrlo rijetkom nalazu, pretpostavka je da su plodovi te vrste, koji su se koristili za jelo, uvoženi iz drugih krajeva. Prema dostupnim izvorima, nalazi iz arheoloških slojeva poznati su uglavnom iz Egipta (<http://www.archaeobotany.de/database.html>), dok za ovaj dio Sredozemlja ne postoje nalazi.

Korovi i ruderalne biljke razreda *Chenopodieta* javljaju se u visokom postotku u uzorcima. Biljke ove skupine vjerojatno su rasle kao korovi u vinogradima, vrtovima i plantažama maslina i smokvi, te kao ruderalne biljke uz putove i lučke instalacije antičke luke. Na brodu, odnosno lokalitetu su ostatci ovih vrsta vjerojatno dospjeli kao primjesa na drugim kultiviranim biljkama od kojih većina pripada okopavinskim kulturama.

Žuta ivica (*Ajuga chamaepitys*) je karakteristična vrsta za žitarice na polju, pa je na brodu mogla dospjeti zajedno sa žitaricama, no javlja se i na suhozidima vinogradima, zapuštenim zemljištima i drugim termofilnim mjestima (sub)mediteranskog područja.

Abdovina (*Sambucus ebulus*) i pjegava kukuta (*Conium maculatum*) dolaze u nitrofilnim zajednicama zeljastih i drevnastih biljaka na obalama rijeka, rubovima šuma i zapuštenim mjestima (Horvat 1974), pa je moguće da ostatci ovih biljaka predstavljaju djelić vegetacije iz okolice luke i naselja ili njihovog zaleđa, koji je na lokalitetu dospio slučajno. Međutim, ne treba zanemariti činjenicu da plodovi ovih biljaka imaju i uporabnu vrijednost, pa su ipak možda bili dio tereta broda. Iz ploda abdovine dobivala se plava boja za bojanje kože i vlakana, a kukuta je, kako je već spomenuto, primjenjivana kao ljekovita, odnosno otrovna biljka (Glušević i sur. 2006).

Vrlo je zanimljiv nalaz vrste *Glaucium corniculatum*, koja recentno nije zabilježena za područje Hrvatske, već se javlja jugoistočno, u Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji. Riječ je o korovno-ruderalnoj vrsti, elementu vegetacije *Chenopodietea*, pa joj ekološki odgovara i širi areal od današnjeg. Nije sasvim jasno da li je ta vrsta praktički potisnuta iz hrvatske flore ili recentno nije zabilježena zbog nedostatnih florističkih istraživanja. Ta je vrsta zabilježena i u arheobotaničkim uzorcima iz sliene antičke luke na Velom Brijunu (Šoštarić i Küster 2001).

U uzorcima su nađeni i uskolisni/širokolisni rogoz (*Typha angustifolia/T. latifolia*). Budući da riječ o vrstama koje se vezane za močvarna staništa i da su plodovi rogoza anemohorni, moguće je da je plodove donio vjetar iz zaleđa u kojem je u antičko doba vjerojatno bilo dosta svježije (slatke) vode (Ilakovac 1995/96a).

Prema Horvatić (1963) i Horvat (1962) vrste *Quercus ilex* i *Myrtus communis* karakteristične su za eumediteranske vazdazelene šume i njihov degradacijski stupanj makiju, koje pripadaju svezi *Quercion ilicis*. Vrsta *Juniperus phoenicea*, također nađena u uzorcima navedenog lokaliteta, karakteristična je vrsta sveze *Cisto-Ericion*, zajednice grmolikih gariga, koja je nastala snažnom degradacijom šume hrasta crnike i makije. Vrste *Daucus carota* i *Silene vulgaris* este su u različitim zajednicama reda *Cymbopogo-Brachypodietalia*, tj. zajednicama suhih travnjaka i kamenjarskih pašnjaka nastalih degradacijom gariga (Horvatić 1963). Stoga se može zaključiti da su prirodnu vegetaciju zadarskog područja u antičko doba činile šume hrasta crnike koje su već tada antropogenim utjecajem degradirane u makiju, garig i pašnjake.

Vrste *Ranunculus arcis*, *Rumex acetosa* i *Prunella vulgaris* pripadaju razredu *Molinio-Arrhenatheretea* koji obuhvaća biljne zajednice livada koje se koriste kao košalice i pašnjaci.

5. ZAKLJUČCI

Tijekom 2002. godine, u nastavku hidroarheoloških istraživanja stare luke *Aenona*, otkriveni su ostatci trećeg liburnskog broda iz ove luke. U istraživanim slojevima uz potonuli brod nađeni su različiti tipovi, većinom keramičkog materijala koji ukazuje na povezanost ove luke s antičkim Mediteranom. Preliminarno datiranje keramike smješta nađeni materijal u razdoblje od kraja I. do III. st. posl. Kr.

U razdoblju od 2002. do 2007. godine, nastavljena su arheološka istraživanja spomenutog lokaliteta, a posebna pažnja posvetila se istraživanju biljnih ostataka. Budući da je riječ o luci u koju su pristajali brodovi iz različitih dijelova Mediterana, za pretpostaviti je da i nađeni biljni materijal ima šaroliko podrijetlo. Vjerojatno se djelomično radi o brodskom teretu, djelomično o ostacima svakodnevne prehrane mornara, a djelomično o vrstama koje pripadaju korovnim i autohtonim zajednicama obale.

Ukupno je u razdoblju od 2005. do 2007. godine izolirano 2575 makrofosila, kojima su u analizi pridodani biljni ostatci nađeni 2002. i 2003. godine (njih 986). Od 2575 većinom nekarboniziranih makrofosila, determinirano je 2403 makrofosilnih ostataka plodova, sjemenki i vegetativnih biljnih dijelova. Do razine vrste determinirana su 62 taksona, do razine roda 20, do razine porodice 3 taksona i do razine razreda 1 takson (*Bryateae*). Približno je determiniran 31 takson (cf.-taksoni).

- U sklopu ekološko-etnološke analize determinirane vrste makrofosila grupirane su u 5 skupina:
1. kultivirane i korisne zeljaste biljke
 2. kultivirane i korisne drvenaste biljke
 3. korovi i ruderalne biljke
 4. biljke vodenih i vlažnih staništa
 5. elementi (polu) prirodne vegetacije.

Rekonstrukcijom paleookolišta antičke luke *Aenona* u Zatonu zaključeno je da su u širem području uzgajane tipične mediteranske vrste poput masline (*Olea europaea*), vinove loze (*Vitis vinifera*), smokve (*Ficus carica*), pinijske (*Pinus pinea*) i oraha (*Juglans regia*), te niz drugih kultura poput trešnje/višnje (*Prunus avium/cerasus*), dinje (*Cucumis melo*), eventualno krastavca (*Cucumis sativus*), rotkve (*Raphanus sativus*) i drugih koje nisu ostale sačuvane u arheološkim slojevima, već se pojavljuju samo kao rijetki ili pojedinačni nalazi. Tim kulturama hranilo se lokalno stanovništvo, ali se i trgovalo s drugim krajevima. Moguće je da su se, u manjoj mjeri, uzgajale i žitarice, prije svega proso, ali zbog uvjeta lokaliteta, nisu sačuvani makrofosilni ostatci.

Dio determiniranih vrsta (*Ajuga chamaepitys*, *Euphorbia helioscopia*, *Fumaria officinalis*, *Polygonum aviculare*, *Urtica urens* i druge) predstavlja tragove slučajnih primjesa u kulturama, s obzirom da je riječ o korovnoj zajednici *Cheopodietea*, ili drugih antropogenih zajednica u okolini naselja. Prirodna vegetacija ovog područja u antičko doba bila je sredozemna vegetacija sive *Quercion ilicis*, koja je već tada antropogenim djelovanjem degradirana u makiju, garig i pašnjake.

Kao posebno zanimljivi, mogu se izdvojiti tri pojedina nalaza. Nalaz sjemenke rotkve (*Raphanus sativus*) iz Zatona najstarija je, do sada zabilježena, materijalna potvrda da se ona uzgajala u Europi u antičko doba. Prema dostupnim podacima, asirijska šljiva (*Cordia myxa*) do sada je bilježena u arheološkim slojevima uglavnom iz Egipta, što bi bio još jedan najstariji arheobotanički nalaz za područje Europe, no prije konačne potvrde, potrebno je izvršiti dodatna istraživanja. Korovna vrsta *Glaucium corniculatum* poznata je iz slikih - antičkih slojeva luke u uvali Verige na Velom Brijunu, ali nije recentno zabilježena na području Hrvatske, iako je prisutna u južnim dijelovima Balkanskog poluotoka.

6. LITERATURA

- Alfiveri , S. (1965): Geologija Jadrana. Matica Hrvatska, Split
- Batovi , Š. (1966): Stariji neolit u Dalmaciji. Arheološko društvo Jugoslavije, Beograd i Arheološki muzej Zadar, Zadar
- Behre, K.-E. (1991): The ecological interpretation of archaeobotanical data. – In: W. Van Zeist, K. Wasylikova, K.-E. Behre (eds.): Progres sin Old World Palaeoethnobotany: 81-108
- Beijernick W. (1947): Zadenatlas der nederlandsche flora: Ten behoeve van de botanie, palaeontologie, bodemcultuur en warenkennis. Backhuys & Meesters, Amsterdam
- Bertovi , S. (1975): Prilog poznavanju odnosa klime i vegetacije u Hrvatskoj. Prirodoslovna istraživanja, knjiga 41. Acta biologija VII/2, Zagreb
- Bouby, L. (1998): Two early finds of gold-of-pleasure (*Camelina* sp.) in middle Neolithic and Chalcolithic site sin wester France. *Antiquity* 72: 391 - 398
- Brusi , Z. (1968): Istraživanje anti ke luke kod Nina. *Diadora Sv. 4.* – Vol. 4: 203 - 210
- Cambi, N. (2002): *Antika*. Naklada Ljevak, Zagreb
- Cappers R.T.J., Bekker R.M., Jans J.E.A. (2006): *Digitale zadenatlas van Nederland / Digital Seed Atlas of the Netherlands*. Groningen Archaeological Studies Vol. 4, Barkhuis Publishing & Groningen University Library, Groningen
- Domac, R. (2002): *Flora hrvatske*. Školska knjiga, Zagreb

- Erhardt W., Götz, E., Bödeker, N., Seybold, S. (2000.): Zander: dictionary of plant names. Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart
- Friganovi , M. (1974): Geografija SR Hrvatske, knjiga 6: južno hrvatsko primorje. Školska knjiga, Zagreb
- Gluš evi , S. (2002): Hidroarheološko istraživanje i nalaz tre eg liburnskog broda u anti koj luci u Zatonu kod Zadra. Obavijesti HAD-a XXXIV/3: 76-86
- Gluš evi , S. (2004): Hydroarcheological excavations ant the discovery od the third sewn Liburnian ship seriliae in the Roman harobor of Zaton near Zadar. Archaeologia maritima mediterranea 1/2004: 41-52
- Gluš evi , S., Juriši , M., Šoštari , R., Vuj i Karlo, S. (2006): Evidence for the nutrition of sailors from the Roman harbour at zaton near Zadar. Archaeologia maritima mediterranea 3/2006: 147 - 161
- Grli , Lj. (1986): Enciklopedija samoniklog jestivog bilja. August Cesarec, Zagreb
- Grüger, E. (1996): Vegetational change. Archaeological and Ecological Studies in a Mediterranean Landscape: 33-46
- Horvat, I. (1962): Vegetacija planine zapadne Hrvatska. Zagreb
- Horvat, I., Glava , V., Ellenberg, H. (1974): Vegetation Südosteuropas. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart
- Horvati , S. (1963): Vegetacijska karta otoka Paga s op im pregledom vegetacijskih jedinica hrvatskog primorja. Prirodoslovna istraživanja, knjiga 33. Acta botanica IV, Zagreb
- Ilakovac, B. (1995/96a): Postanak i razvoj ninskih (Aenona) mostova. VAMZ, 3. s, XXVffl-XXIX: 73-95
- Ilakovac, B. (1995/96b): Urbanizacija anti ke Enone (Aenona) i rimsko pristanište „Kremenja a“. Radovi: Razdio povijesnih znanosti 35 (22): 83-100

- Ilakovac, B. (1998.): Liburnska i rimska Aenona (Nin). Radovi: Razdio povijesnih znanosti 37 (24): 1-14
- Kale, E. (1981): Povijest civilizacije. Školska knjiga, Zagreb
- Körber-Grohne, U. (1987): Nutzpflanzen in Deutschland. Kulturgeschichte und Biologie. Konrad Theiss Verlag, Stuttgart
- Kraljev, D. (1995): U okrilju sunca i mora: klimatska monografija Zadra. Zadiz, Zadar
- Kroll, H. (1977): Kirschfunde aus dem 13./14. bis 16. Jahrhundert aus der Lübecker Innenstadt. Ber. Deutsch. Bot. Ges. Bd. 91.: 181 – 185
- Kroll, H. (1999): Literature on archaeological remains of cultivated plants (1997/1998). Vegetation History and Archaeobotany 8: 129-163
- Kušan, F. (1956): Ljekovito i drugo korisno bilje. Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb
- Küster, H. (1988): Spätmittelalterliche Pflanzenreste aus einem Brunnen von Deggendorf (Niederbayern). Votr. Niederbay. Archäologentag. A 6 (1): 175 – 199
- Pavleti, Z. (1988): Prilog taksonomiji vrste *Daucus carota* L. (*Apiaceae*). Biosistematika 14 (1): 23-29
- Pavleti, Z., Škalamera, G. (1983): Taksonomska istraživanja ploda vrste roda *Daucus* L. (*Apiaceae*) u flori Hrvatske. Biosistematika 9 (2): 99-107
- Pearsal, D. M. (2000): Paleoethnobotany: a handbook of procedures. Academic press, San Diego
- Renfrew, J. M. (1973): Palaeoethnobotany: The prehistoric food plants of the Near East and Europe. Methuen & Co Ltd, London
- Salopek, D. (ur.) (2007): Povijest 4: Rimsko carstvo. Jutarnji list, Zagreb
- Schoch W.H., Pawlik B., Schweingruber, F. H. (1988): Botanical macro-remains. CIP, Zürich

- Schultze-Motel, J. (1993): Literature on archaeological remains of cultivated plants (1990/1991). *Vegetation History and archaeobotany* 8: 129 - 163
- Šegota, T., Filip i , A. (1991): Arheološki i geološki pokazatelji holocenskog položaja razine mora na isto oj obali Jadranskog mora. *Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti* 458 (25): 149 – 172
- Šegota, T., Filip i , A. (1996): *Klimatologija za geografe. Školska knjiga, Zagreb*
- Šegulja, N., Topi , J. (2000): *Vodi za terensku nastavu iz geobotanike i ekologije bilja, Zagreb*
- Šili , . (1983): *Atlas drve a i grmlja. Svjetlost, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo, Beograd*
- Slapšak, S. (ur.) (1989): *O kuvanju = De re coquinaria / Apicius. Latina et Graeca, Zagreb*
- Šoštari , R. (2005): The development of postglacial vegetation in coastal Croatia. *Acta bitanica Vroatia* 64 (2): 383 – 390
- Šoštari , R., Küster, H.-J. (2001): Roman plant remains from Veli Brijun (island of Brioni), Croatia. *Vegetation History and Archaeobotany* 10 (4): 227-233
- Zohary, D., Hopf, M. (1988): *Domestication of Plants in the Old World. Clarendon press, Oxford*
- http://database.prota.org/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll?AC=QBE_QUERY&BU=http://database.prota.org/search.htm&TN=PROTAB~1&QB0=AND&QF0=Species+Code&QI0=Cordia+myxa&RF=Webdisplay
- <http://hr.wikipedia.org/wiki/Nin>
- <http://www.amzd.hr/images/stories/zaton/slika3.jpg>
- <http://www.amzd.hr/images/stories/zaton/slika4.jpg>

- <http://www.archaeobotany.de/database.html>
- <http://www.haryana-online.com/flora/lasura.htm>
- http://www.mm-commerce.hr/assets/images/sv_petar/nin.jpg

7. PRILOZI

Tablica 3. Kvadranti, slojevi i koli ine uzoraka iz 2005. godine

BROJ UZORKA	KVADRANT	BROJ SLOJA	KOLI INA UZORKA (u litrama)
1	A1/2	SL 6	nema podatka
2	B1/1	SL 6	nema podatka
3	B1/2	SL 6	nema podatka
4	A1/2	SL 8	nema podatka
5	B1/4	SL 5	nema podatka
6	B1/3	SL 4	nema podatka
7	B1/3	SL 5	nema podatka
8	B2/1	SL 4	nema podatka
9	B1/2	SL 4	nema podatka
10	B1/1	SL 5	nema podatka
11	B1/1	SL 4	nema podatka
12	B1/2	SL 5	nema podatka
13	B1/1	SL 3	nema podatka
14	B1/1	SL 7	nema podatka
15	A1/1	SL 6	nema podatka
16	MAMUT MIX	MAMUT MIX	nema podatka
17	B2/4	SL 2	0,25
18	A1/2	SL 7	0,4
19	B1/3	SL 3	0,5
20	KOŠARICA	KOŠARICA	0,15

Tablica 4. Kvadranti, slojevi i koli ine uzoraka iz 2006. godine

BROJ UZORKA	KVADRANT	BROJ SLOJA	KOLI INA UZORKA (u litrama)
1	A0/1	SL 7	0,45
2	A0/1	SL 6	0,5
3	A0/1	SL 8	0,4
4	A0/1	SL 9	0,4
5	A0/3	SL 8	0,4
6	A0/3	SL 9	0,4
7	A1/1	SL 8	0,5
8	A1/1	SL 7	0,5
9	A1/1	SL 6	0,5
10	isto no uz A1/1	SL 5	0,8
11	B1/4	SL 7	0,4
12	B1/4	SL 6	0,25
13	B1/4	SL 5	0,5
14	A0/3	SL 7	0,3
15	A0/3	SL 6	0,4

Tablica 5. Kvadranti, slojevi i koli ine uzoraka iz 2007. godine

BROJ UZORKA	KVADRANT	BROJ SLOJA	KOLI INA UZORKA (u litrama)
1	B1/3	SL 6	0,25
2	B1/3	SL 7	0,35
3	B1/3	SL 8	0,3
4	B1/3	SL 5	0,25
5	B1/4	SL 6	0,25
6	C1/3	SL 7	0,3
7	C1/2-C1/4	SL 4	0,25
8	C1/1	SL 8	0,35
9	C1/2	SL 2	0,25
10	C1/2	SL 3	0,25
11	B1/4	SL 7	0,35
12	C1/4	SL 5	0,35
13	C1/4	SL 6	0,3
14	C1/4	SL 7	0,3
15	C1/4	SL 3	0,35
16	C1/2	SL 6	0,3
17	C1/2	SL 7	0,3

Tablica 6. Popis makrofosila po uzorcima iz 2005. godine 3. dio

SVOJTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<i>Prunus amygdalus</i> fragment ljuske				1												1					2
<i>Prunus amygdalus</i> fragment omota a																2					2
<i>Prunus avium/cerasus</i> fragment koštice													1								1
<i>Prunus avium/cerasus</i> koštica																2					2
<i>Prunus domestica ssp. domestica</i> koštica																1					1
<i>Prunus persica</i> koštica																3					3
<i>Ranunculus acris</i> oraš i				1																	1
<i>Ranunculus CF acris</i> oraš i														1		1					2
<i>Ranunculus repens</i> oraš i	1			3																	4
<i>Ranunculus CF repens</i> fragment oraš i a																1					1
<i>Rubus fruticosus</i> koštica	1		1	1		2			1		2	5						2			15
<i>Rumex acetosa</i> sjemenka						1															1
<i>Rumex obtusifolius</i> plod s plodnim listovima						1															1
<i>Rumex CF obtusifolius</i> fragment ovojnih listova						1															1
<i>Rumex obtusifolius/pulcher</i> sjemenka						1															1
<i>Silene CF vulgaris</i> sjemenka						2									1						3

Tablica 6. Popis makrofosila po uzorcima iz 2005. godine 5. dio

SVOJTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<i>Poaceae</i> pšeno	6				1							1						7			15
<i>Bryatae</i> "stabalce s listi ima"																			1		1
INDET indet	1	1	2	2		1					1	2	4			1					15
INDET aška	3										1										4
INDET fragmenti					6											4					10
INDET fragment sjemenke														2							2
INDET sjemenka s kljunom			1																		1
INDET gran ica																1					1
Zbroj makrofosila u uzorku	123	81	42	77	81	110	4	11	3	10	33	73	31	27	38	49	2	104	25	17	941

Tablica 7. Popis makrofosila po uzorcima iz 2006. godine 3. dio

SVOJTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<i>Rumex obtusifolius/pulcher</i> sjemenka		1														1
<i>Rumex pulcher</i> sjemenka											1		1			2
<i>Sambucus nigra</i> koštica			1													1
<i>Silene CF vulgaris</i> sjemenka	1															1
<i>Urtica urens</i> plod							1					1				2
<i>Vitis vinifera</i> koštica	14	5	9	9	3	9	11	17	29	3	17	17	5		2	150
<i>Vitis vinifera</i> mala suha bobica		3								1			1			5
<i>Vitis vinifera</i> plodna stapka	2	2	1	3	1	4		6	3	4	1		2			29
CF <i>Amaranthus sp.</i> plod							1									1
<i>Rosa/Rubus sp.</i> trn								1								1
<i>Rubus sp.</i> fragmet koštice							1		1	2		1				5
<i>Rumex sp.</i> plod								2								2
CF <i>Typha sp.</i> sjemenka								1								1
<i>Apiaceae</i> fragment merikarpa										1	1					2
<i>Apiaceae</i> merikarp	1		1													2
<i>Poaceae</i> pšeno	1		1	1	1		1	2		16						23

Tablica 7. Popis makrofosila po uzorcima iz 2006. godine 4. dio

SVOJTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<i>Bryatae</i> "stabalce s listi ima"	1	1													1	3
INDET indet				2						3	1			2		8
INDET aška					1											1
INDET fragment lista								1								1
Zbroj makrofosila u uzorku	54	33	27	52	34	76	29	55	64	97	54	39	30	7	12	663

Tablica 8. Popis makrofosila po uzorcima iz 2007. godine 3. dio

SVOJTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
CF <i>Quercus ilex</i> fragment lista												2						2
<i>Ranunculus acris</i> oraš i						1											1	2
<i>Ranunculus</i> CF <i>acris</i> oraš i																1		1
<i>Reseda phyteuma</i> sjemenka				1														1
<i>Rubus fruticosus</i> koštica	3	3	3		1	5		1			1	8		1	1		1	28
<i>Rumex obtusifolius</i> oraš i						1												1
<i>Rumex pulcher</i> plodni listovi								1										1
<i>Rumex pulcher</i> oraš i																1		1
<i>Typha angustifolia/latifolia</i> oraš i									1									1
<i>Vitis vinifera</i> koštica	14	37	11	9	12	53	2	4	2	7	26	7	6	2	7	15	10	224
<i>Vitis vinifera</i> mala suha bobica											1						2	3
<i>Vitis vinifera</i> plodna stapka	7	3	2	1		6	1		1		5	1					4	31
CF <i>Anthemis sp.</i> roška						1												1
<i>Galeopsis sp.</i> plod kalavac																1		1
<i>Medicago sp.</i> fragment mahune										1								1
<i>Pinus sp.</i> gran ica														2				2

Tablica 8. Popis makrofosila po uzorcima iz 2007. godine 4. dio

SVOJTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<i>Polygonum sp.</i> oraš i						3												3
<i>Rubus sp.</i> fragmet koštice								1									1	2
<i>Rumex sp.</i> plod		1																1
CF <i>Torilis sp.</i> merikarp							1											1
CF <i>Xanthium sp.</i> sjemenka					1													1
<i>Apiaceae</i> merikarp	1					1		2			1	1		1		2		9
CF <i>Apiaceae</i> merikarp							1									1	2	4
CF <i>Lamiaceae</i> plod												1						1
<i>Poaceae</i> pšeno											1	3	7				1	12
CF <i>Poaceae</i> CF pšeno																	1	1
<i>Bryatae</i> "stabalce s listi ima"	1	1															1	3
INDET CF koštica												1						1
INDET indet							1								3	1		5
INDET aška		1				1	1					1	3			3	1	11
INDET aška ili ovojni listovi glavi astog cvata												1						1
INDET fragment	2					5										1		8

Tablica 8. Popis makrofosila po uzorcima iz 2007. godine 5. dio

SVOJTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
INDET fragment drva											1	33	1	2			7	44
INDET fragment kore													1					1
INDET fragment ploda										1								1
INDET fragment sjemenke					1													1
INDET karbonizirani fragment																1		1
INDET gran ica	7	11		2	3	5									4	13	10	55
Zbroj makrofosila u uzorku	69	90	28	24	41	182	14	18	10	34	50	108	81	32	39	70	81	971

Tablica 9. Popis makrofosila po slojevima, razdoblje istraživanja od 2002. do 2007. godine

SVOJTA	SL1	SL2	SL3	SL4	SL5	SL6	SL7	SL8	SL9	mix/koš	
<i>Agrimonia eupatoria/procera</i> oraščić			1*								1*
<i>Agrostemma githago</i> sjemenka				1	1	2	1	1			6
CF <i>Agrostemma githago</i> sjemenka					1	1+1*					2+1*
<i>Ajuga chamaepitys</i> merikarp			1*	3*				1			1+4*
CF <i>Ajuga chamaepitys</i> fragment merikarpa								1			1
<i>Anagallis arvensis</i> sjemenka							1				1
<i>Anethum graveolens</i> plod kalavac				1	1	3					5
<i>Anthemis arvensis</i> roška							1				1
<i>Anthemis tinctoria</i> roška						2					2
<i>Atriplex patula</i> plod					1						1
<i>Artiplex prostrata</i> oraščić				1							1
CF <i>Brassica nigra</i> fragment teste						1					1
<i>Camelina sativa</i> sjemenka			2*			1*					3*
<i>Castanea sativa</i> fragment ljuske			1*					1			1+1*
CF <i>Castanea sativa</i> fragment kore ploda					1						1
<i>Chenopodium album</i> plod				3*	2+2*		2				4+5*

Tablica 9. Popis makrofosila po slojevima, razdoblje istraživanja od 2002. do 2007. godine 2. dio

SVOJTA	SL1	SL2	SL3	SL4	SL5	SL6	SL7	SL8	SL9	mix/koš	
<i>Chrysanthemum=Glebionis</i> CF <i>coronarium</i> roška							1				1
<i>Cichorium intybus</i> roška						1					1
<i>Cirsium arvense</i> roška							1				1
CF <i>Cistus salviifolius</i> fragment tobolca				1							1
<i>Conium maculatum</i> merikarp			1*								1*
<i>Cordia myxa</i> koštica					1						1
<i>Coriandrum sativum</i> plod		3				1	5			3	12
CF <i>Coriandrum sativum</i> fragment ploda							1				1
<i>Corylus avellana</i> fragment ljuske			1*			5	1	1		1	8+1*
CF <i>Corylus avellana</i> fragment ljuske					1						1
<i>Cucumis melo</i> sjemenka				1+2*	4	1*	1	2			8+3*
<i>Cucumis melo/sativus</i> fragment sjemenke			1+3*	2	8	3+2*	4	1	2		21+5*
<i>Daucus carota</i> merikarp						1*					1*
<i>Euphorbia helioscopia</i> sjemenka/fragment sjemenke		2*	2+4*	2+14*	3+1*	1	2				10+21*
<i>Ficus carica</i> koštunica	5*	2+6*	23+70*	27+68*	158+17*	243+60*	145+17*	62	73	21	754+243*
CF <i>Ficus carica</i> koštunica				1				1			2

Tablica 9. Popis makrofosila po slojevima, razdoblje istraživanja od 2002. do 2007. godine 3. dio

SVOJTA	SL1	SL2	SL3	SL4	SL5	SL6	SL7	SL8	SL9	mix/koš	
<i>Fumaria officinalis</i> polovica tobolca					2		1				3
<i>Fumaria officinalis</i> tobolac		1*	1	1+3*	1*	4+1*					6+6*
<i>Fumaria CF officinalis</i> polovica tobolca			1								1
CF <i>Fumaria officinalis</i> tobolac			1								1
<i>Glaucium corniculatum</i> sjemenka							1				1
<i>Juglans regia</i> fragment ljuske	2*	7*	10+51*	14+29*	9+15*	42+17*	68+13*	7	2		152+134*
<i>Juniperus phoenicea</i> grančica s listićima				1*							1*
CF <i>Linum usitatissimum</i> sjemenka						1					1
<i>Medicago arabica</i> grupa TIP 1 mahuna	1*		17+4*	3+3*	4+1*	19+7*	29	4			76+16*
<i>Medicago arabica</i> TIP 1/2 mahuna						1	1				2
<i>Medicago arabica</i> grupa TIP 2 mahuna			2				3	2	2		9
<i>Myosoton aquaticum</i> sjemenka							1				1
<i>Myrtus communis</i> sjemenka				1							1
<i>Olea europaea</i> sjemenka/fragment sjemenke	2*	2+7*	23+34*	48+46*	23+11*	74+4*	87+1*	14	18	2	291+105*
CF <i>Olea europea</i> sjemenka			1								1
<i>Orlaya grandiflora</i> merikarp									1		1

Tablica 9. Popis makrofosila po slojevima, razdoblje istraživanja od 2002. do 2007. godine 5.dio

SVOJTA	SL1	SL2	SL3	SL4	SL5	SL6	SL7	SL8	SL9	mix/koš	
<i>Prunus avium/cerasus</i> koštica	1*	1*		1*		2	2	1		2	7+3*
<i>Prunus cerasus</i> koštica			1*	1*							2*
<i>Prunus domestica ssp. domestica</i> koštica							1			1	2
<i>Prunus persica</i> koštica							1			3	4
<i>Quercus ilex</i> fragment lista							2				2
CF <i>Quercus ilex</i> fragment lista					2						2
<i>Ranunculus acris</i> oraščić							2	1	1		4
<i>Ranunculus</i> CF <i>acris</i> oraščić						1	1			1	3
<i>Ranunculus repens</i> oraščić				1*		1+2*	1+1*	4			6+4*
<i>Ranunculus</i> CF <i>repens</i> fragment oraščića										1	1
<i>Raphanus sativus</i> sjemenka			1*								1*
CF <i>Reichardia picroides</i> cvjetna os	1*		2*								3*
<i>Reseda phyteuma</i> sjemenka		1*	2*	4*	1	1+1*					2+8*
<i>Rubus fruticosus</i> koštica			1+1*	5+2*	13+1*	9+2*	17+2*	7	1		53+8*
<i>Rumex acetosa</i> sjemenka				1							1
<i>Rumex acetosella</i> sjemenka					1*						1*

Tablica 9. Popis makrofosila po slojevima, razdoblje istraživanja od 2002. do 2007. godine 6. dio

SVOJTA	SL1	SL2	SL3	SL4	SL5	SL6	SL7	SL8	SL9	mix/koš	
<i>Rumex obtusifolius</i> oraščić							1				1
<i>Rumex obtusifolius</i> plod s plodnim listovima				1		1					2
<i>Rumex CF obtusifolius</i> fragment ovojnih listova				1							1
<i>Rumex obtusifolius/pulcher</i> sjemenka				1+1*		1					2+1*
<i>Rumex pulcher</i> plodni listovi								1			1
<i>Rumex pulcher</i> sjemenka					1	1	1				3
<i>Sambucus ebulus</i> sjemenka		1*	2*	1*							4*
<i>Sambucus nigra</i> koštica								1			1
<i>Silene vulgaris</i> sjemenka		1*									1*
<i>Silene CF vulgaris</i> sjemenka				2		1	1				4
<i>Typha angustifolia/latifolia</i> oraščić		1	2*								1+2*
<i>Urtica urens</i> oraščić				1*		1		1			2+1*
<i>Verbena officinalis</i> sjemenka			1+1*								1+1*
<i>Vitis vinifera</i> fragment grančice					3						3
<i>Vitis vinifera</i> koštica	16*	3+12*	24+35*	30+54*	55+13*	155+33*	207+18*	71	18	11	574+181*
<i>Vitis vinifera</i> mala suha bobica				1*	5+1*	4+2*	8+1*			1	18+5*

Tablica 9. Popis makrofosila po slojevima, razdoblje istraživanja od 2002. do 2007. godine 7. dio

SVOJTA	SL1	SL2	SL3	SL4	SL5	SL6	SL7	SL8	SL9	mix/koš	
<i>Vitis vinifera</i> plodna stapka	1*	1	2+7*	11+9*	41+8*	27+8*	36+1*	10	7	4	139+34*
CF <i>Zannichellia palustris</i> koštunica								1			1
CF <i>Amaranthus</i> plod								1			1
CF <i>Anthemis sp.</i> roška							1				1
<i>Atriplex/Chenopodium</i> fragment ploda					1						1
<i>Bromus sp.</i> pšeno				1*							1*
<i>Citrus sp.</i> koštica			1	1				1			3
<i>Fumaria sp.</i> oraščić			6*								6*
<i>Galeopsis sp.</i> plod kalavac						1					1
<i>Juncus sp.</i> sjemenka			3*	4*							7*
<i>Malus/Pyrus sp.</i> sjemenka					1*						1*
CF <i>Malus/Sorbus</i> fragment sjemenke				1							1
<i>Malva sp.</i> merikarp				1*							1*
<i>Medicago sp.</i> fragment mahune			1								1
<i>Mentha sp.</i> oraščić	1*										1*
<i>Pinus sp.</i> grančica							2				2

Tablica 9. Popis makrofosila po slojevima, razdoblje istraživanja od 2002. do 2007. godine 8. dio

SVOJTA	SL1	SL2	SL3	SL4	SL5	SL6	SL7	SL8	SL9	mix/koš	
<i>Polygonum sp.</i> oraščić				1*		1*	3				3+2*
<i>Quercus sp.</i> fragment žira						1*					1*
<i>Ranunculus sp.</i> oraščić			1*								1*
<i>Rosa/Rubus sp.</i> trn			1*	1*			1				1+2*
<i>Rubus sp.</i> fragment koštice		1*	1	2+10*	4	2	1	2			12+11*
<i>Rumex sp.</i> plod							3				3
<i>Sambucus sp.</i> fragment koštice			1*	1							1+1*
<i>Thalictrum sp.</i> plod			1								1
CF <i>Torilis sp.</i> merikarp				1							1
<i>Triticum sp.</i> baza pljevice				1*							1*
CF <i>Typha</i> sjemenka							1				1
CF <i>Xanthium sp.</i> sjemenka						1					1
<i>Apiaceae</i> fragment ploda					2		1				3
<i>Apiaceae</i> merikarp			1*	1*	1	5	5	3			14+2*
CF <i>Apiaceae</i> merikarp				1		1	3				5
<i>Fabaceae</i> mahuna						1					1

Tablica 9. Popis makrofosila po slojevima, razdoblje istraživanja od 2002. do 2007. godine 9.dio

SVOJTA	SL1	SL2	SL3	SL4	SL5	SL6	SL7	SL8	SL9	mix/koš	
CF <i>Lamiaceae</i> plod					1						1
<i>Poaceae</i> pšeno			1*	1*	21	13	12	3	1		50+2*
<i>Bryatae</i> "stabalce s listićima"			1			3	3				7
INDET indet	3*	1*	7+7*	3+8*	5+2*	5+3*	3+5*	2	2	1	28+29*
INDET čaška				2	1	9	3	1			16
INDET čaška ili ovojni listovi					1						1
INDET fragmenti					6	3	5			4	18
INDET fragment drva					33	1	10				44
INDET fragment kore						1					1
INDET fragment lista							1				1
INDET fragment ploda			1								1
INDET fragment sjemenke						1	2				3
INDET grančica			4		2	23	26			1	56
INDET karbonizirani fragment						1					1
INDET CF koštica					1						1
INDET sjemenka s kljunom						1					1

Tablica 9. Popis makrofosila po slojevima, razdoblje istraživanja od 2002. do 2007. godine 10.dio

SVOJTA	SL1	SL2	SL3	SL4	SL5	SL6	SL7	SL8	SL9	mix/koš	
Zbroj makrofosila u uzorku	33*	12 + 60*	131 + 282*	170 + 315*	428 + 79*	693 + 157*	734 + 60*	213	128	66	2575 +986*

Tablica 10. Broj determiniranih taksona, biljnih ostataka i nedeterminiranih ostataka po uzorcima

GODINA UZORKOVANJA	BROJ UZORKA	BROJ	UKUPAN BROJ	UKUPAN BROJ
		DETERMINIRANIH TAKSONA	DETERMINIRANIH BILJNIH OSTATAKA	NEDETERMINIRANIH BILJNIH OSTATAKA
2005.	1	13	119	4
	2	7	80	1
	3	7	39	3
	4	15	75	2
	5	8	75	6
	6	20	109	1
	7	3	4	0
	8	3	11	0
	9	3	3	0
	10	5	10	0
	11	12	31	2
	12	16	71	2
	13	10	27	4
	14	8	25	2
	15	9	38	0
	16	13	43	6
	17	2	2	0
	18	12	104	0
	19	7	25	0
	20	4	17	0
2006.	1	12	54	0
	2	11	33	0
	3	11	27	0
	4	7	50	2
	5	6	33	1
	6	7	76	0
	7	12	29	0
	8	15	54	1
	9	9	64	0
	10	14	94	3
	11	7	53	1
	12	6	39	0
	13	7	30	0
	14	4	5	2
	15	5	12	0
2007.	1	11	60	9
	2	11	78	12
	3	6	28	0
	4	5	22	2
	5	10	37	4
	6	21	171	11
	7	6	12	2
	8	9	18	0
	9	5	10	0
	10	7	33	1
	11	10	49	1
	12	14	72	36
	13	11	76	5
	14	10	30	2
	15	9	32	7
	16	13	51	19
	17	13	63	18